

СВОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЙ, БЛИЗКИХ К ГАРМОНИЧЕСКИМ. II

А. П. Копылов

Аннотация: Продолжается изучение свойств отображений, близких к гармоническим (ε -квазигармонических отображений с малыми значениями параметра ε), начало которому положено в более ранних работах автора (см., например, [1–5]).

К числу результатов работы относятся теорема о связи между понятием ε -квазигармонического отображения и решениями систем Бельтрами, аналог свойства среднего арифметического гармонических функций для ε -квазигармонических отображений, теорема об устойчивости в формуле Пуассона для гармонических отображений в шаре и теорема о локальном сглаживании ε -квазигармонических отображений при малых значениях параметра ε с сохранением близости к гармоническим отображениям.

Ключевые слова: устойчивость классов гармонических отображений, квазигармонические отображения, свойство среднего арифметического, формула Пуассона, регуляризация.

Юрию Григорьевичу Решетняку посвящается

Введение. Настоящая работа посвящена решению следующей проблемы (проблемы устойчивости классов гармонических отображений): *если отображение $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, где U — открытое множество в вещественном арифметическом n -мерном евклидовом пространстве \mathbb{R}^n , близко (в том или ином смысле) к гармоническим отображениям, то можно ли ожидать, что f хоть в какой-либо мере наследует свойства последних?*

Ряд ответов утвердительного характера на этот вопрос дан в [1–5]. При этом близость рассматриваемого отображения f к гармоническим отображениям понималась в духе концепции ξ^1 -устойчивости в C^1 -норме классов отображений [3, 4]. Согласно результатам статьи [4] в асимптотическом смысле наличие такого рода близости эквивалентно выполнению следующего условия: f есть $W^2(U, \mathbb{R}^m)$ -решение дифференциального неравенства

$$|\Delta f(x)| \leq \varepsilon \left\{ n \sum_{j,s=1}^n |\partial_{js} f(x)|^2 \right\}^{1/2} \quad (1)$$

с малым значением параметра ε^1 (в (1) и далее $\partial_{js} = \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_s}$ — символ частной производной второго порядка и $\Delta = \sum_{j=1}^n \partial_{jj}$ — оператор Лапласа; как и в [1–

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Международной Ассоциации INTAS и государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации.

¹Здесь и ниже $W^l(U, \mathbb{R}^m) = W^{l,n,m}(U, \mathbb{R}^m) = \bigcup_{p>n} W_{p,\text{loc}}^l(U, \mathbb{R}^m)$, где $W_{p,\text{loc}}^l(U, \mathbb{R}^m)$ — пространство всех отображений $h : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, удовлетворяющих условию: для каждого огра-

5], мы будем далее называть решения неравенства (1) ε -квазигармоническими отображениями).

В работах [1–5] показано, что к числу свойств ε -квазигармонических отображений f относятся свойства, представленные, например, такими утверждениями, как теорема об устойчивости в C^1 -норме на компактных подмножествах области определения отображения f ; теорема об устойчивости в C -норме гармонических отображений в классе квазигармонических; теорема о том, что степень суммируемости обобщенных частных производных второго порядка $\partial_{j_s} f$ неограниченно возрастает, когда коэффициент квазигармоничности $K(f)$ отображения f стремится к нулю; теорема, в которой для любого $p > 1$ дается оценка близости производных $\partial_{j_s} f$ к производным $\partial_{j_s} g$ гармонических отображений g в L_p -норме; ряд теорем, представляющих собой аналоги для ε -квазигармонических отображений f и их производных 1-го порядка $\partial_j f = \frac{\partial f}{\partial x_j}$, $j = 1, 2, \dots, n$, классической теоремы Лиувилля о постоянстве ограниченной гармонической функции $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$; теоремы о замкнутости классов ε -квазигармонических отображений, $0 \leq \varepsilon < 1$, и о компактности семейств отображений из этих классов в топологии локально равномерной сходимости; теорема о полунепрерывности коэффициента квазигармоничности.

Заметим, что побудительной причиной в наших исследованиях устойчивости классов отображений явилось желание выяснить следующее: можно ли построить общие подходы к исследованию проблем устойчивости, которые регулярным образом были бы связаны с теорией устойчивости конформных отображений в классе квазиконформных (относительно основных положений последней см. [6]) и которые позволили бы с единичных позиций исследовать устойчивость важнейших в анализе классов отображений. Решая эту задачу, мы предложили концепцию ξ -устойчивости в C -норме классов отображений (см. [7] и библиографию там же) и в развитие ее — концепцию их ξ^1 -устойчивости в C^1 -норме [3, 4] (и, более общо, концепцию ξ^l -устойчивости в C^l -норме, $l = 0, 1, 2, \dots$ [8, 9]). Эти концепции позволили построить основы теории устойчивости таких классов, как классы многомерных голоморфных отображений (см. монографию [7, гл. 2] и библиографию к ней, а также статьи [10–14]) и классы гармонических отображений [1–5], пучки решений эллиптических систем линейных уравнений с частными производными [15–23, 1–5, 8, 9] (см. также [7, гл. 3]), классы отображений нескольких n -мерных переменных, конформных по каждому из них [24–26], и др. При этом отмеченные выше утверждения о свойствах ε -квазигармонических отображений получены в рамках исследований ξ^1 -устойчивости классов гармонических отображений.

Недавно появился новый стимул в проведении исследований ξ^l -устойчиво-

ниченного открытого множества V пространства \mathbb{R}^n , замыкание $\text{cl } V$ которого содержится в U , ограничение отображения h на множество V принадлежит пространству Соболева $W_p^l(V, \mathbb{R}^m)$ отображений $g : V \rightarrow \mathbb{R}^m$, обладающих всеми обобщенными (по Соболеву) частными производными l -го порядка, суммируемыми в V в степени p . Если \mathcal{A} — какое-либо из пространств Соболева отображений, заданных на (открытом множестве) $U \subset \mathbb{R}^n$, то всюду в настоящей работе \mathcal{A} -решением (решением из пространства \mathcal{A}) системы дифференциальных уравнений (неравенств) мы называем отображение $f \in \mathcal{A}$, удовлетворяющее этой системе почти всюду в U . Заметим также, что априорное условие принадлежности пространству $W^2(U, \mathbb{R}^m)$ в определении ε -квазигармонического отображения (при малых значениях ε) может быть существенно снижено. В самом деле, в силу теоремы 6 статьи [1] для каждого числа $p > 1$ существует число ε_p , $0 < \varepsilon_p < 1$, такое, что для того чтобы отображение f было ε -квазигармоническим с $\varepsilon < \varepsilon_p$, необходимо и достаточно, чтобы f являлось непрерывным решением класса $W_{p, \text{loc}}^2(U, \mathbb{R}^m)$ дифференциального неравенства (1) с этим же ε .

сти классов отображений и, в частности, исследований устойчивости классов гармонических отображений. Этим стимулом являются результаты статей [27, 28], согласно которым хорошо известные и важные результаты Л. Ниренберга и Ч. Морри о гёльдеровости старших производных C^2 -гладких решений эллиптического нелинейного уравнения с частными производными 2-го порядка [29] и эллиптических систем нелинейных уравнений того же порядка [30] распространяются на системы произвольного порядка и весьма общего вида (см. теоремы 1 и 1' статей [27, 28]). При этом как доказательство теоремы Ниренберга в [29], так и доказательство теорем 1 и 1' статьи [28] основываются на идеях из квазиконформного анализа.

Действительно, теорема Ниренберга выводится из теоремы о равномерной непрерывности по Гёльдеру класса отображений $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, U — область (открытое связное множество) в \mathbb{R}^n , которые он рассматривает как обобщения квазиконформных отображений на плоскости. Эти отображения являются решениями дифференциального неравенства вида

$$\sum_{i,j=1}^n (\partial_j h_i)^2 \leq k \sum_{i,j=1}^n (\partial_j h_i \partial_i h_j - \partial_i h_i \partial_j h_j) + k_1, \quad (2)$$

где k и k_1 — неотрицательные константы, причем

$$k < \frac{n-1}{n-2}. \quad (3)$$

Если $k_1 = 0$ и $n = 2$, то такого рода отображения суть квазиконформные отображения (точнее, решения систем Бельтрами, причем в случае $n = 2$ ограничение (3) на параметр k в (2) не накладывается).

Обратимся теперь к основному результату статьи [28] — теореме 1, согласно которой старшие частные производные эллиптических решений систем нелинейных уравнений в частных производных произвольного порядка удовлетворяют локально условию Гёльдера (по поводу определения эллиптичности см. [28]). Обсуждаемая теорема вытекает из теоремы 2 этой же работы о непрерывности по Гёльдеру частных производных $(l-1)$ -го порядка решений систем (5) уравнений с частными производными из [28], близких к эллиптическим системам линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Если для такой системы выполнено условие²⁾ $T(x; v_{l-1}) = 0$, $(x; v_{l-1}) \in U \times \mathbb{R}^{N_{l-1}-n}$, U — область в \mathbb{R}^n , то ее решения являются решениями дифференциального неравенства (60) в [28], которое в асимптотическом смысле эквивалентно неравенству³⁾

$$|Df(x)| \leq \varepsilon \left\{ \sum_{\mu_1, \dots, \mu_l=1}^n |\partial_{\mu_1 \dots \mu_l} f(x)|^2 \right\}^{1/2}, \quad (4)$$

где $f = (f_1, f_2, \dots, f_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ — отображение класса $W_{p, \text{loc}}^l(U, \mathbb{R}^m)$, удовлетворяющее (4) почти всюду в U , и $D = (D_1, D_2, \dots, D_k) = \sum_{|p|=l} a_p \partial^p$ — эллиптический линейный дифференциальный оператор l -го порядка с постоянными коэффициентами $(a_p = (a_p^{j\kappa})_{j=1, \dots, k}^{\kappa=1, \dots, m})$ — вещественная $(k \times m)$ -матрица, p —

²⁾Мы используем здесь обозначения и понятия из [28].

³⁾Обращаем внимание читателя на то, что если в (1) заменить $\varepsilon\sqrt{n}$ на ε , то в этой новой записи неравенство (1) обретает вид неравенств типа (4).

мультииндекс порядка $|p| = l$, суммирование осуществляется по всем таким мультииндексам и эллиптичность оператора D означает выполнение условия $\text{rank } \sigma_D(\zeta) = \text{rank} \left\{ \sum_{|p|=l} \zeta^p a_p \right\} = m$ для каждого $\zeta \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$). В свою очередь, результаты работ [3, 4, 8, 9, 22, 23], а также монографии [7] позволяют рассматривать W^l -решение неравенства (4) (при малом значении параметра ε) в определенном отношении как аналог квазиконформного отображения⁴⁾. Изучение свойств решений дифференциальных неравенств типа (4), роднящих эти решения с решениями эллиптических систем $Dg(x) = 0$ линейных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами, как раз и составляет предмет исследований ξ^{l-1} -устойчивости в C^{l-1} -норме пучков решений систем линейных дифференциальных уравнений [8, 9]. Следует отметить также, что доказательство упомянутой выше теоремы 2 статьи [28] основывается на результатах статей [31–33], которые естественным образом вкладываются в рамки исследований ξ^{l-1} -устойчивости классов отображений.

В настоящей работе, исходя из вышесказанного и имея в виду использование ее результатов в исследованиях, связанных с изучением свойств решений эллиптических систем дифференциальных уравнений с частными производными, мы продолжаем изучение свойств ε -квазигармонических отображений при малых значениях параметра ε .

В первом пункте статьи мы прослеживаем (прямую) связь между понятием ε -квазигармонического отображения (случай $n = 2, m = 1$) и решениями систем Бельтрами (5).

Во втором получаем аналог свойства среднего арифметического гармонических функций для ε -квазигармонических отображений при малых значениях параметра ε .

В третьем пункте мы доказываем теорему 3 об устойчивости в формуле Пуассона для гармонических отображений в шаре.

Наконец, используя результаты третьего пункта, в четвертом мы устанавливаем возможность локального сглаживания ε -квазигармонических отображений для малых ε с сохранением близости к гармоническим отображениям.

1. Связь между квазигармоническими (случай $n = 2, m = 1$) и квазиконформными отображениями. С точки зрения круга вопросов, связанных с изучением явлений устойчивости для гармонических отображений, понятие квазигармонического отображения соотносится с понятием гармонического примерно так же, как понятие квазиконформного отображения (и более

⁴⁾В этой связи отметим еще следующее утверждение.

Теорема А. Если $f : U \rightarrow \mathbb{C}, U \subset \mathbb{C}$, — непрерывное $W_{2,\text{loc}}^1(U, \mathbb{C})$ -решение дифференциального неравенства

$$|\partial_{\bar{z}} f(z)| \leq \varepsilon \{ |\partial_z f(z)|^2 + |\partial_{\bar{z}} f(z)|^2 \}^{1/2} \quad (5)$$

($\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y), x = \text{Re } z, y = \text{Im } z, i$ — мнимая единица; неравенство (5) — это неравенство (4) в комплексной записи в том случае, когда в (4) $n = 2, m = 2, k = 2, l = 1$ и D — оператор Коши — Римана), причем $0 \leq \varepsilon < \frac{1}{\sqrt{2}}$, то тогда f есть решение некоторой системы Бельтрами

$$\begin{cases} \partial_{\bar{z}} f(z) = \mu(z) \partial_z f(z), \\ M = \text{ess sup}_{z \in U} |\mu(z)| < 1, \end{cases} \quad (6)$$

где $M \leq \varepsilon / \sqrt{1 - \varepsilon^2}$. С другой стороны, если f — непрерывное $W_{2,\text{loc}}^1(U, \mathbb{C})$ -решение системы Бельтрами (6) с $M < 1$, то оно является также и решением неравенства (5) с $\varepsilon = M$.

Доказательство теоремы А не составляет труда, поэтому мы его опускаем.

общо — понятие отображения с ограниченным искажением по Решетняку [34]) связано с понятием конформного (в случае отображений на плоскости — голоморфного) отображения. Более того, между теорией устойчивости конформных отображений (см. [6] и библиографию там же) и теорией устойчивости гармонических отображений [1–5] существует самая прямая связь и по постановке задач, и по характеру результатов, и по методике исследований. Например, в том случае, когда $n = 2$ и $m = 1$, имеет место

Теорема 1. Пусть $0 \leq \varepsilon < \frac{1}{\sqrt{2}}$. Если $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, U — область в \mathbb{R}^2 , — ε -квазигармоническое отображение, то отображение

$$F = F_1 + F_2 = \partial_x f - i\partial_y f \quad (7)$$

есть решение некоторой системы Бельтрами (6) с $M \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}$. Далее, если непрерывная функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subset \mathbb{R}^2$, принадлежит классу $W_{2,\text{loc}}^1(U, \mathbb{R})$ и отображение F , определяемое посредством равенств (7), является решением системы Бельтрами (6), где $M = \varepsilon$, $0 \leq \varepsilon < 1$, то тогда f — ε -квазигармоническое отображение.

Теорема 1 вытекает непосредственно из теоремы А сноски 4 и следующего утверждения.

Лемма 1. Непрерывная функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, U — область в \mathbb{R}^2 , является ε -квазигармоническим отображением, $0 \leq \varepsilon < 1$, тогда и только тогда, когда отображение F , определяемое равенствами (7), есть непрерывное $W_{2,\text{loc}}^1(U, \mathbb{R}^2)$ -решение дифференциального неравенства (5).

Доказательство леммы 1 легко осуществить, поэтому мы его не приводим.

Отметим еще, что в определенном отношении система дифференциальных уравнений в частных производных из работы [5]⁵⁾

$$\Delta f(x) = Q(x)f''(x), \quad (11)$$

$f = (f_1, \dots, f_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, U — область в \mathbb{R}^n , $n \geq 2$, $Q(x)$ — $(m \times mn^2)$ -матрица с измеримыми коэффициентами, причем

$$\|Q\|_\infty = \text{ess sup}_{x \in U} \|Q(x)\| \leq \varepsilon\sqrt{n} \quad (12)$$

($\|Q(x)\|$ — операторная норма матрицы $Q(x)$), в теории устойчивости классов гармонических отображений играет роль, близкую к той роли, которую система Бельтрами играет в теории квазиконформных отображений на плоскости. В частности, теореме А соответствует

⁵⁾Здесь и ниже

$$f''(x) = (\partial_{11}f_1(x) \dots \partial_{1n}f_1(x) \dots \partial_{n1}f_1(x) \dots \partial_{nn}f_1(x) \dots \\ \dots \partial_{11}f_m(x) \dots \partial_{1n}f_m(x) \dots \partial_{n1}f_m(x) \dots \partial_{nn}f_m(x))^T, \quad (8)$$

$$f'(x) = (\partial_1 f_1(x) \dots \partial_n f_1(x) \dots \partial_1 f_m(x) \dots \partial_n f_m(x))^T, \quad (9)$$

$$f(x) = (f_1(x) \dots f_m(x))^T \quad (10)$$

$(\cdot)^T$ — операция транспонирования матриц; $f'(x)$ мы отождествляем также с производной (дифференциалом) отображения f в точке x).

Лемма 2 (см. лемму 1 в [5]). *Отображение $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ является ε -квазигармоническим, $0 \leq \varepsilon < 1$, в том и только том случае, когда оно есть W^2 -решение в U системы (11) уравнений с частными производными, для которой выполнено условие (12).*

2. Аналог свойства среднего арифметического гармонических функций для ε -квазигармонических отображений при малых значениях параметра ε .

Теорема 2. *Пусть $0 < \rho < 1$. Существует неотрицательная функция $\alpha_\rho = \alpha_{\rho,n,m} : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, удовлетворяющая условиям:*

- (i) $\alpha_\rho(\varepsilon) \rightarrow \alpha_\rho(0) = 0$ при $\varepsilon \searrow 0$;
- (ii) *если $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, где U — открытое множество в \mathbb{R}^n , есть ε -квазигармоническое отображение, то для каждой сферы $\sigma(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n, |y - x| = r\}$ такой, что шар $B(x, \rho^{-1}r) = \{y \in \mathbb{R}^n, |y - x| < \rho^{-1}r\}$ содержится в U , выполняется неравенство*

$$\left| f(x) - \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} f(y) ds_y \right| \leq 4\alpha_\rho(\varepsilon) r \operatorname{diam}\{f'(B(x, \rho^{-1}r))\}, \quad (13)$$

где $S_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$ — площадь единичной сферы в \mathbb{R}^n и $\operatorname{diam}\{f'(B(x, \rho^{-1}r))\} = \sup_{t_1, t_2 \in B(x, \rho^{-1}r)} \|f'(t_1) - f'(t_2)\|$ ($\|a\|$ — операторная норма линейного отображения $a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$);

- (iii) *если f — непрерывное отображение класса $W_{p,\operatorname{loc}}^2(U, \mathbb{R}^m)$, $p > n$, причем для каждой точки $x \in U$ найдется число $r_x > 0$ такое, что*

$$\left| f(x) - \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} f(y) ds_y \right| \leq \varepsilon r \operatorname{diam}\{f'(B(x, \rho^{-1}r))\} \quad (14)$$

всякий раз, когда $B(x, \rho^{-1}r) \subset U$ и $r < r_x$, то тогда f есть $\{\alpha_\rho(\varepsilon)\}$ -квазигармоническое отображение.

Доказательство. Предположим, что $0 < \rho < 1$. Тогда в силу теоремы 6 статьи [4] существует неотрицательная функция $\zeta_\rho = \zeta_{\rho,n,m} : [0, 1[\rightarrow [0, +\infty[$, обладающая свойствами: (а) $\zeta_\rho(\varepsilon) \rightarrow \zeta_\rho(0) = 0$, когда $\varepsilon \searrow 0$; (б) если $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, U — область в \mathbb{R}^n , является ε -квазигармоническим отображением ($0 \leq \varepsilon < 1$), то для каждого шара $B = B(x, r)$ такого, что $B(x, \rho^{-1}r) \subset U$, и для каждого числа $\gamma > 0$ существует гармоническое отображение $g : B \rightarrow \mathbb{R}^m$, удовлетворяющее неравенствам

$$|f(y) - g(y)|/2\rho r + \|f'(y) - g'(y)\| \leq [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] \operatorname{diam} f'(B(x, \rho^{-1}r)), \quad y \in B. \quad (15)$$

Учитывая, что из неравенств (15) вытекают, в свою очередь, неравенства

$$|f(y) - g(y)| \leq 2\rho r [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] \operatorname{diam} f'(B(x, \rho^{-1}r)), \quad y \in \operatorname{cl} B,$$

которым можно придать вид равенств

$$f(y) = g(y) + 2\rho r [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] u(y) \operatorname{diam} f'(B(x, \rho^{-1}r)), \quad |u(y)| < 1, \quad y \in \operatorname{cl} B(x, r),$$

мы посредством цепочки последовательных выкладок получаем следующие соотношения:

$$\begin{aligned} & \left| f(x) - \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} f(y) ds_y \right| \\ &= \left| f(x) - g(x) - 2\rho r [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] \{ \text{diam } f'(B(x, \rho^{-1}r)) \} \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} u(y) dy \right| \\ &\leq |f(x) - g(x)| + 2\rho r [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] \{ \text{diam } f'(B(x, \rho^{-1}r)) \} \\ &\leq 4\rho r [\zeta_\rho(\varepsilon) + \gamma] \text{diam } f'(B(x, \rho^{-1}r)). \quad (16) \end{aligned}$$

Соотношения (16), произвол в выборе числа γ и условие (а), которому удовлетворяет функция ζ_ρ , приводят нас к утверждению (ii) теоремы. При этом в качестве функции α_ρ в неравенстве (13) можно принять функцию $\varepsilon \mapsto \rho \zeta_\rho(\varepsilon)$.

Докажем теперь утверждение (iii). С этой целью рассмотрим непрерывное отображение $f \in W_{p, \text{loc}}^2(U, \mathbb{R}^m)$, $p > n$, удовлетворяющее соотношению (14) с $\varepsilon < 4^{-1} n^{-1/2} \rho$. В силу определения квазигармонического отображения нам достаточно доказать выполнение неравенства (1), в котором роль ε в данном случае будет играть величина $\alpha_\rho(\varepsilon) = 4n^{\frac{1}{2}} \rho^{-1} \varepsilon$, почти во всех точках множества U . Пусть x — точка множества U такая, что в этой точке f дважды дифференцируемо (заметим, что этим свойством обладают почти все точки U), и пусть V — достаточно малая окрестность точки x . Тогда если число r таково, что $B(x, \rho^{-1}r) \subset V$, то

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} f(y) ds_y &= \frac{1}{S_n r^{n-1}} \int_{|y-x|=r} [f(x) - f(y)] ds_y \\ &= \frac{1}{2S_n r^{n-1}} \left\{ \int_{|y-x|=r} \sum_{j=1}^n \partial_{jj} f(x) (y_j - x_j)^2 dy + \int_{|y-x|=r} o(|y-x|^2) dy \right\} \\ &= \frac{1}{2S_n r^{n-1}} \{ n^{-1} S_n r^{n+1} \Delta f(x) + S_n r^{n+1} o(r) \} = \frac{r^2}{2} \{ n^{-1} \Delta f(x) + o(r) \}. \quad (17) \end{aligned}$$

Далее,

$$\text{diam } f'(B(x, \rho^{-1}r)) = \sup_{t_1, t_2 \in B(x, \rho^{-1}r)} \|f'(t_1) - f'(t_2)\| \leq 2\rho^{-1}r \left\{ \sum_{s,k=1}^n |\partial_{sk} f(x)|^2 \right\}^{1/2}.$$

Следовательно, в силу соотношений (14) и (17) имеем

$$\frac{r^2}{2} |n^{-1} \Delta f(x) + o(r)| \leq \varepsilon r \text{diam } f'(B(x, \rho^{-1}r)) \leq 2\varepsilon \rho^{-1} r^2 \left\{ \sum_{s,k=1}^n |\partial_{sk} f(x)|^2 \right\}^{1/2}$$

и (тем самым)

$$|\Delta f(x) + o(r)| \leq 4n\varepsilon \rho^{-1} \left\{ \sum_{s,k=1}^n |\partial_{sk} f(x)|^2 \right\}^{1/2}. \quad (18)$$

Устремляя теперь в (18) r к нулю, мы приходим для отображения f к неравенству (1), где роль параметра ε играет сейчас величина $4n^{\frac{1}{2}} \rho^{-1} \varepsilon$. Теорема 2 доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. В доказательстве теоремы 2 мы строим функцию α_ρ не на всем промежутке $[0, +\infty[$, а на конечном его подпромежутке вида $[0, c[$. Очевидно, что продолжение этой функции на весь промежуток $[0, +\infty[$ не только не составляет трудностей, но в нем нет и необходимости в силу асимптотического характера рассматриваемых в теореме эффектов устойчивости.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. В ходе доказательства теоремы 2 мы получили явную оценку для функции α_ρ в утверждении (iii): если $\varepsilon < 4^{-1}n^{-\frac{1}{2}}\rho$, то в качестве α_ρ можно принять функцию $\varepsilon \mapsto 4n^{\frac{1}{2}}\rho^{-1}\varepsilon$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Обращаем внимание читателя на то, что в статье [35], в которой анонсированы основные результаты настоящей работы, в формулировке обсуждаемой сейчас теоремы допущена описка: в правой части неравенства, соответствующего неравенству (13) данной статьи, пропущен множитель r (см. теорему 5 в [35]).

3. Об устойчивости в формуле Пуассона для гармонических отображений в шаре. В данном пункте мы устанавливаем, что в формуле Пуассона для гармонических функций в шаре имеет место следующий эффект устойчивости: при малых значениях параметра ε для ε -квазигармонических отображений шара можно предъявить формулу решений внутренней задачи Дирихле, близкую к формуле Пуассона и превращающуюся в саму эту формулу в случае гармонических отображений. Заметим, что в силу леммы 2 достаточно убедиться в наличии обсуждаемого эффекта устойчивости для W_p^2 -решений систем (11), (12). В действительности же мы решаем более общую задачу, которая состоит в следующем.

Пусть n и m — натуральные числа, $n \geq 2$, $m \geq 1$, и

$$Df(x) = Y(x)f''(x) + Z(x)f'(x) + E(x)f(x) + G(x) = 0 \quad (19)$$

— система линейных дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка с измеримыми коэффициентами, областью определения которых является единичный шар $B = B(0, 1)$ пространства \mathbb{R}^n , $f = (f_1, \dots, f_m) : B \rightarrow \mathbb{R}^m$ — отображение в \mathbb{R}^m шара B . Заметим, что запись в (19) матричная: $Y(x)$, $Z(x)$, $E(x)$ и $G(x)$ — $(m \times mn^2)$ -, $(m \times mn)$ -, $(m \times m)$ - и $(m \times 1)$ -матрицы соответственно.

Предполагая далее, что дифференциальный оператор D близок к оператору Лапласа, в настоящем пункте для W_p^2 -решений системы (19) мы решаем задачу, поставленную в начале пункта для решений систем (11), (12).

Перейдем к точным формулировкам и подробному обсуждению результатов. С этой целью обозначим символами Φ , T , R и \mathcal{I} оператор со значениями в пространстве $\mathcal{A}(B, \mathbb{R}^m)$ вещественно аналитических отображений, областью определения которого является пространство $C(\sigma, \mathbb{R}^m)$ (всех) непрерывных отображений $\psi : \sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ в \mathbb{R}^m единичной сферы $\sigma = \sigma(0, 1)$ пространства \mathbb{R}^n , такой, что $\Phi\psi$, $\psi \in C(\sigma, \mathbb{R}^m)$, представляет собой интеграл Пуассона

$$(\Phi\psi)(x) = \frac{1}{S_n} \int_{\sigma} \frac{1 - |x|^2}{|y - x|^n} \psi(y) ds_y, \quad x \in B, \quad (20)$$

и (соответственно) интегральные операторы

$$(Th)(x) = \begin{cases} -\frac{1}{(n-2)S_n} \int_{|y|<1} \left[\frac{1}{|y-x|^{n-2}} - \frac{|y|^{n-2}}{|y-|y|^2x|^{n-2}} \right] h(y) dy, & n \geq 3, \\ -\frac{1}{2\pi} \int_{|y|<1} \left[\ln \frac{1}{|y-x|} - \ln \frac{|y|}{|y-|y|^2x|} \right] h(y) dy, & n = 2, \end{cases}$$

$$(R_j h)(x) = -\frac{1}{S_n} \int_{|y|<1} \left\{ \frac{y_j - x_j}{|y-x|^n} - |y|^n \frac{y_j - |y|^2 x_j}{|y - |y|^2 x|^n} \right\} h(y) dy, \quad j = 1, \dots, n,$$

$$(\widetilde{\mathcal{F}}h)(x) = \{(\widetilde{\mathcal{F}}_{j_s} h)(x), j, s = 1, \dots, n\},$$

где

$$(\widetilde{\mathcal{F}}_{ss} h)(x) = \frac{1}{n} h(x) + (\mathcal{F}_{ss} h)(x) = \frac{1}{n} h(x) - \frac{1}{S_n} \int_{|y|<1} \left[\frac{n(y_s - x_s)^2 - |y-x|^2}{|y-x|^{n+2}} - |y|^{n+2} \frac{n(y_s - |y|^2 x_s)^2 - |y - |y|^2 x|^2}{|y - |y|^2 x|^{n+2}} \right] h(y) dy$$

и

$$(\widetilde{\mathcal{F}}_{j_s} h)(x) = (\mathcal{F}_{j_s} h)(x) = -\frac{n}{S_n} \int_{|y|<1} \left[\frac{(y_j - x_j)(y_s - x_s)}{|y-x|^{n+2}} - |y|^{n+2} \frac{(y_j - |y|^2 x_j)(y_s - |y|^2 x_s)}{|y - |y|^2 x|^{n+2}} \right] h(y) dy,$$

$j \neq s$ ($x \in B$; $h \in L_p(B, \mathbb{R}^m)$, $p > 1$). Обращаем внимание читателя на то, что ядра операторов T , R и \mathcal{F} представляют собой соответственно функцию $\mathcal{G}(x, y)$ Грина «внутренней» задачи Дирихле для шара B в случае уравнения Лапласа и ее производные (по x) 1-го и 2-го порядков. При этом последний из этих операторов строится на основе интегралов, понимаемых в смысле главного значения по Коши, и является ограниченным линейным оператором банаховых пространств $L_p(B, \mathbb{R}^m)$ и $L_p(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{mn^2})$ (см. [5])⁶).

Теорема 3. *Предположим, что $n < p < +\infty$ и $Z \in L_p(B, \mathbb{R}^{m \times mn})$, $E \in L_p(B, \mathbb{R}^{m \times m})$ и $G \in L_p(B, \mathbb{R}^{m \times 1})$. Тогда существует число $\varepsilon_p = \varepsilon_{p,n,m} > 0$ такое, что если условие*

$$|Y(x)g''(x) - \Delta g(x)| = |Q(x)g''(x)| = \left\{ \sum_{k=1}^m \left[\sum_{j,s=1}^n \sum_{l=1}^m Q_{j,s,l}^k(x) \partial_{j_s} g_l(x) \right]^2 \right\}^{1/2} \leq \varepsilon \left\{ n \sum_{j,s=1}^n |\partial_{j_s} g(x)|^2 \right\}^{1/2}, \quad 0 \leq \varepsilon < \varepsilon_p, \quad (21)$$

выполняется почти всюду в B всякий раз, когда отображение g принадлежит пространству $W_{1,\text{loc}}^2(B, \mathbb{R}^m)$, то каждое $\{W_{2,\text{loc}}^2(B, \mathbb{R}^m) \cap C^1(B, \mathbb{R}^m)\}$ -решение f системы (19) является ее $W_{p,\text{loc}}^2(B, \mathbb{R}^m)$ -решением. Далее, допустим, кроме того, что p -норма

$$\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p = \sup_{h \in L_p(B, \mathbb{R}^m), \|h\|_{p,B}=1} \|(ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})h\|_{p,B}$$

⁶ Отметим, что в формулировке леммы 3 в [5] имеются следующие описки.

1. В 5-й и 6-й строках сверху на с. 347 вместо « $L_p(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ » следует читать « $L_p(B, \mathbb{R}^m)$ ».

2. Последнее предложение первого абзаца на с. 348 должно выглядеть так: «В свою очередь последнее (при $p > n$) вытекает из теоремы 1 монографии [4, § 6]».

Обращаем внимание читателя также на то, что в формулировке леммы 2 в [5], с которой лемма 3 (из [5]) находится в тесной связи, вместо «И пусть $f : \text{cl } B \rightarrow \mathbb{R}^m$ — отображение...» следует читать «И пусть $f : \text{cl } B \rightarrow \mathbb{R}^m$ — непрерывное отображение...»

$(\|h\|_{p,B} = \|h\|_{L_p(B,\mathbb{R}^m)} = \left\{ \int_{|x|<1} |h(x)|^p dx \right\}^{1/p})$ линейного интегрального оператора

ра⁷⁾ $ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}$ меньше 1. Тогда

(i) если $\psi : \sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ есть след (в смысле теории пространств Соболева) на сфере σ отображения пространства $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$, то формула⁸⁾

$$\begin{aligned} f(x) &= (\Phi\psi)(x) \\ &- (T([I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}(G + E(\Phi\psi) + Z(\Phi\psi)' + Q(\Phi\psi'')))(x) = (\Phi\psi)(x) \\ &- \sum_{\nu=0}^{\infty} (T((-[ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}(G + E(\Phi\psi) + Z(\Phi\psi)' + Q(\Phi\psi'')))(x), \quad (22) \end{aligned}$$

$x \in B$, определяет $\{W_p^2(B, \mathbb{R}^m) \cap C^1(B, \mathbb{R}^m)\}$ -решение системы (19), непрерывное в замыкании $\text{cl } B$ шара B и удовлетворяющее краевому условию $f|_{\sigma} = \psi$;

(ii) для каждого непрерывного решения $f : \text{cl } B \rightarrow \mathbb{R}^m$ класса $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ системы (19) имеет место формула (22), где $\psi = f|_{\sigma}$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. $L_p(B, \mathbb{R}^{\mu \times \nu})$ — лебегово пространство измеримых матричнозначных отображений шара B , суммируемых с p -й степенью; $C^1(B, \mathbb{R}^m)$ — пространство непрерывно дифференцируемых отображений в \mathbb{R}^m шара B . Следует отметить, что в силу теорем вложения [36] и теорем об (l, p) -продолжении [37] каждое отображение $f \in W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ при $p > n$ принадлежит классу $C^1(B, \mathbb{R}^m)$ и как само оно, так и его частные производные $\partial_j f$, $j = 1, \dots, n$, 1-го порядка продолжают по непрерывности в замыкание $\text{cl } B$ шара B .

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Отображение $Q(x) = \{Q_{j,s,l}^k(x)\}$, $x \in B$, из соотношений (21) определяется для почти всех $x \in B$ равенствами $Q_{j,s,l}^k(x) = Y_{s,s,l}^k(x) - 1$, если $j = s$, и $Y_{j,s,l}^k(x)$, если $j \neq s$, $j, s = 1, 2, \dots, n$; $k, l = 1, 2, \dots, m$ ($Y(x) = \{Y_{j,s,l}^k(x)\}$). Само условие (21) можно записать в следующей форме: $\|Q\|_{\infty} = \text{ess sup}_{x \in B} \|Q(x)\| \leq \varepsilon \sqrt{n}$ (ср. с (12)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 3. Существование числа $\varepsilon_p > 0$, удовлетворяющего первому из утверждений теоремы, вытекает из теоремы 2 работы [33].

Для доказательства утверждения (ii) применим лемму 2 статьи [5]. В силу этой леммы для $x \in B$ имеет место равенство

$$f(x) = (\Phi\psi)(x) + (T\Delta f)(x), \quad (23)$$

если $f \in W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$, $p > n$ (ψ — след отображения f на граничной сфере σ шара B). Предполагая, что $f : \text{cl } B \rightarrow \mathbb{R}^m$ — непрерывное $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ -решение, $p > n$, системы (19) (т. е. f непрерывно, а его ограничение $f|_B$ на шар B является $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ -решением этой системы), удовлетворяющей условию $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1$, мы с учетом (23) и уравнений системы приходим к соотношениям

$$f(x) = (\Phi\psi)(x) - (T(G + Ef + Zf' + Qf''))(x), \quad x \in B.$$

⁷⁾ $(ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})(h)$ есть отображение $x \mapsto E(x)(Th)(x) + Z(x)(Rh)(x) + Q(x)(\widetilde{\mathcal{F}}h)(x)$, $x \in B$, $h \in L_p(B, \mathbb{R}^m)$. Здесь $(Th)(x)$, $(Rh)(x)$ и $(\widetilde{\mathcal{F}}h)(x)$ подобно $f(x)$, $f'(x)$ и $f''(x)$ в (10), (9) и (8) рассматриваются как матрицы-столбцы ($(\widetilde{\mathcal{F}}h)(x)$ можно получить, заменяя в (8) $\partial_{js} f_l$ символами $(\widetilde{\mathcal{F}}_{js} h_l)(x)$; $(Rh)(x)$ — заменой символов $\partial_j f_l$ в (9) символами $(R_j h_l)(x)$; наконец, $(Th)(x)$ — заменой в (10) символов $f_l(x)$ символами $(Th_l)(x)$).

⁸⁾ I — единичный (тождественный) оператор пространства $L_p(B, \mathbb{R}^m)$, $[\cdot]^{-1}$ — операция взятия обратного оператора, Θ^{ν} — ν -я степень оператора Θ .

Продолжая эти рассуждения и используя при этом лемму 3 статьи [5], последовательно получаем (для $x \in B$)

$$\begin{aligned} f(x) &= (\Phi\psi)(x) - (T\gamma)(x) - (T([ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}]\Delta f))(x) \\ &= (\Phi\psi)(x) - (T\gamma)(x) + (T([ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}](G + Ef + Zf' + Qf'')))(x) \\ &= (\Phi\psi)(x) - (T((I - [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])\gamma))(x) + (T([ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}]^2\Delta f))(x) \\ &= \dots = (\Phi\psi)(x) - \sum_{\nu=0}^{\mu} (T((- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\gamma))(x) \\ &\quad + (T((- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\mu+1}\Delta f))(x), \end{aligned}$$

$\mu = 0, 1, 2, \dots$ Здесь (и ниже) $\gamma = G + E(\Phi\psi) + Z(\Phi\psi)' + Q(\Phi\psi)''$.

Учитывая теперь, что из выводимых ниже оценок (36) и (37) и из условия $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1$ вытекают соотношения

$$\begin{aligned} \sup_{x \in B} |T((- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\mu+1}\Delta f)(x)| \\ \leq M(p, n) \{ \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p \}^{\mu+1} \|\Delta f\|_{p, B} \rightarrow 0, \quad \mu \rightarrow +\infty \end{aligned} \quad (24)$$

(величина $M(p, n)$ определяется равенствами (28) и (29)), мы убеждаемся в сходимости ряда $\sum_{\nu=0}^{\infty} (T((- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\gamma))(x)$ к $f - \Phi\psi$ в C -норме. И так как ряд $\sum_{\nu=0}^{\infty} (- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}$ сходится в p -норме $\|\cdot\|_p$ (более точно, в силу условия $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1$ он сходится «нормально»: $\sum_{\nu=0}^{\infty} \|(- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\|_p \leq \sum_{\nu=0}^{\infty} \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p^{\nu} = (1 - \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p)^{-1}$), причем его сумма в этой норме является обратным оператором к оператору $I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})$, то утверждение (ii) доказано.

Нам осталось доказать утверждение (i) теоремы. С этой целью, предполагая, что $\psi : \sigma \rightarrow \mathbb{R}^m$ есть след на сфере σ некоторого отображения $F \in W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$, $p > n$, применим к F формулу (23):

$$F(x) = (\Phi\psi)(x) + (T\Delta F)(x), \quad x \in B. \quad (25)$$

Из формулы (25) вытекает, что отображение $\Phi\psi$ также принадлежит пространству⁹⁾ $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ и, следовательно, $\gamma \in L_p(B, \mathbb{R}^m)$. Принимая еще во внимание (отмеченную выше) нормальную сходимость ряда $\sum_{\nu=0}^{\infty} (- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}$ к оператору $[I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}$, мы легко убеждаемся в том, что при выполнении условия $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1$ ряд $\sum_{\nu=0}^{\infty} (- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\gamma$ сходится к отображению $[I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}\gamma$ в пространстве $L_p(B, \mathbb{R}^m)$ и тем самым ряд $\sum_{\nu=0}^{\infty} T((- [ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\gamma)$ сходится в $C(B, \mathbb{R}^m)$, причем его сумма есть

⁹⁾ $\|\Phi\psi\|_{W_p^2(B, \mathbb{R}^m)} = \{ (\|\Phi\psi\|_{p, B})^p + (\|(\Phi\psi)'\|_{p, B})^p + (\|(\Phi\psi)''\|_{p, B})^p \}^{1/p}$
 $\leq \|F\|_{W_p^2(B, \mathbb{R}^m)} + \{ (\|T\Delta F\|_{p, B})^p + (\|R\Delta F\|_{p, B})^p + (\|\widetilde{\mathcal{F}}\Delta F\|_{p, B})^p \}^{1/p} < +\infty.$

отображение $T([I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}\gamma)$, для этих рядов и последнего отображения имеют место равенства, указанные в (22), и ψ является граничным значением отображения (22) (доказательство этого утверждения основывается на соображениях, использованных при выводе соотношений (24)).

Покажем, что в условиях утверждения (i) отображение (22) является $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ -решением системы (19) (согласно замечанию 1 f принадлежит также классу $C^1(\text{cl } B, \mathbb{R}^m)$).

Действительно, из изложенного выше следует, что отображение

$$h(x) = ([I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}\gamma)(x), \quad x \in B,$$

принадлежит пространству $L_p(B, \mathbb{R}^m)$. Но тогда отображение Th (а вместе с ним и отображение f из (22)) принадлежит пространству $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ (см. лемму 3 работы [5]). Далее, учитывая гармоничность интеграла Пуассона $\Phi\psi$ и еще раз лемму 3 из [5] и отправляясь от (22), мы приходим (для почти всех $x \in B$) к равенству

$$\Delta f(x) = -h(x). \tag{26}$$

С другой стороны, также для почти всех $x \in B$

$$\begin{aligned} G(x) + E(x)f(x) + Z(x)f'(x) + Q(x)f''(x) \\ = \gamma(x) - ([ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}]([I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}\gamma))(x) \\ = \left(\sum_{\nu=0}^{\infty} (-[ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}])^{\nu}\gamma \right)(x) = ([I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}})]^{-1}\gamma)(x). \end{aligned} \tag{27}$$

Из соотношений (26) и (27) и принадлежности отображения f пространству $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ вытекает, что f является $W_p^2(B, \mathbb{R}^m)$ -решением системы (19). Доказательство теоремы 3 полностью завершено.

В связи с теоремой 3 возникает вопрос о явных количественных оценках рассматриваемых в ней эффектов устойчивости в формуле Пуассона для гармонических функций в шаре. Мы сейчас получим одну оценку такого типа. С этой целью рассмотрим следующие величины (при $p > n$; $n = 2, 3, \dots$; $m = 1, 2, \dots$):

$$M(p, n) = \frac{S_n^{-\frac{1}{p}}}{n-2} \left(\frac{p-1}{2p-n} \right)^{1-\frac{1}{p}} \left[2^{2-\frac{n}{p}} + 3^{2-\frac{n}{p}} \left(1 + \frac{2p-n}{n(p-1)} 6^{-\frac{2p-n}{p-1}} \right)^{1-\frac{1}{p}} \right], \tag{28}$$

если $n \geq 3$,

$$\begin{aligned} M(p, 2) = & \left[\int_{-\ln 2}^{+\infty} |\tau|^{\frac{p}{p-1}} e^{-2\tau} d\tau \right]^{1-\frac{1}{p}} \\ & + \left[16 \int_{\ln 2}^{+\infty} \tau^{\frac{p}{p-1}} e^{-2\tau} d\tau + \int_{\ln 2}^{\ln 3} \tau^{\frac{p}{p-1}} e^{2\tau} d\tau + \frac{1}{8} (\ln 2)^{\frac{p}{p-1}} \right]^{1-\frac{1}{p}}, \end{aligned} \tag{29}$$

$$N(p, n) = \frac{n^{\frac{1}{2}}}{S_n^{\frac{1}{p}}} \left(\frac{p-1}{p-n} \right)^{1-\frac{1}{p}} \left\{ 2^{1-\frac{n}{p}} + \left[3^{\frac{p-n}{p-1}} + \frac{p-n}{(n+1)p-n} 2^{-\frac{2p-n}{p-1}} \right]^{1-\frac{1}{p}} \right\}$$

и

$$\begin{aligned} C(p, n, m) = p(mn)^{\frac{1}{2}} \left\{ \left[\frac{1}{np} + 4A_{11} \exp \left(\frac{72}{A_{11}} (A_{11} + 2(A_{12})^2) \right) \right]^2 \right. \\ \left. + (n-1) \left[4A_{21} \exp \left(\frac{72}{A_{21}} (A_{21} + 2(A_{22})^2) \right) \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
 A_{11} &= (1 + 4^n) \left\{ \pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + (n-1) \left(4\pi + \ln \frac{27}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right\}^2 \\
 &\quad + 2^n \left\{ n^{\frac{n}{2}} + 4 \left[\pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + (n-1) \left(\ln \frac{9}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right] \right\}, \\
 A_{12} &= \frac{1}{2} \left\{ \pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + (n-1) \left(4\pi + \ln \frac{27}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right\}, \\
 A_{21} &= (1 + 4^n) \left\{ \pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + \frac{n}{2} \left(4\pi + \ln \frac{27}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right\}^2 \\
 &\quad + 2^n \left\{ n^{\frac{n}{2}} + 4 \left[\pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + \frac{n}{2} \left(\ln \frac{9}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right] \right\}, \\
 A_{22} &= \frac{1}{2} \left\{ \pi n \frac{2^{n-1} - 1}{n-1} + \frac{n}{2} \left(4\pi + \ln \frac{27}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^k - 1}{k} \right) \right\}.
 \end{aligned}$$

Используя величины $M(p, n)$, $N(p, n)$ и $C(p, n, m)$, упомянутую оценку мы представим таким утверждением.

Теорема 4. Если $p > n$, $n \geq 2$, $m \geq 1$ и

$$M(p, n) \|E\|_{p, B} + N(p, n) \|Z\|_{p, B} + C(p, n, m) \|Q\|_{\infty} < 1 \quad (30)$$

($\|E\|_{p, B} = \left\{ \int_{|x|<1} \|E(x)\|^p dx \right\}^{1/p}$, $\|Z\|_{p, B} = \left\{ \int_{|x|<1} \|Z(x)\|^p dx \right\}^{1/p}$, где $\|E(x)\|$ и $\|Z(x)\|$ — операторные нормы матриц $E(x)$ и $Z(x)$), то

$$\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно доказать, что $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p$ меньше левой части неравенства (30). Для этого мы сначала применим неравенство треугольника

$$\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p \leq \|ET\|_p + \|ZR\|_p + \|Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p,$$

а затем оценим каждое из слагаемых в его правой части в отдельности.

Оценивая $\|ET\|_p$, рассмотрим отображение $h \in L_p(B, \mathbb{R}^m)$ и затем оценим $L_p(B, \mathbb{R}^m)$ -норму отображения $(ET)h$. Имеем

$$\|(ET)h\|_{p, B} = \left\{ \int_{|x|<1} |E(x)(Th)(x)|^p dx \right\}^{1/p} \leq \|E\|_{p, B} \max_{|x|<1} |(Th)(x)|. \quad (31)$$

Далее возможны два случая: $n \geq 3$ и $n = 2$.

В силу определения оператора T в первом из этих случаев

$$|(Th)(x)| \leq \frac{1}{(n-2)S_n} \left[\left| \int_{|y|<1} \frac{h(y) dy}{|y-x|^{n-2}} \right| + \left| \int_{|y|<1} \frac{|y|^{n-2} h(y) dy}{|y-|y|^2 x|^{n-2}} \right| \right], \quad x \in B. \quad (32)$$

И так как

$$\left| \int_{|y|<1} \frac{h(y) dy}{|y-x|^{n-2}} \right| \leq \|h\|_{p,B} \| |\cdot-x|^{-(n-2)} \|_{\frac{p}{p-1},B}, \quad (33)$$

где

$$\| |\cdot-x|^{-(n-2)} \|_{\frac{p}{p-1},B} \leq \left\{ \int_{|y-x|<2} |y-x|^{-\frac{p(n-2)}{p-1}} dy \right\}^{1-\frac{1}{p}} = \left\{ S_n \frac{p-1}{2p-n} 2^{\frac{2p-n}{p-1}} \right\}^{1-\frac{1}{p}},$$

а

$$\left| \int_{|y|<1} \frac{|y|^{n-2} h(y) dy}{|y-|y|^2 x|^{n-2}} \right| \leq \|h\|_{p,B} \left\| \frac{|\cdot|^{n-2}}{|\cdot-|\cdot|^2 x|^{n-2}} \right\|_{\frac{p}{p-1},B}, \quad (34)$$

причем

$$\begin{aligned} \left\| \frac{|\cdot|^{n-2}}{|\cdot-|\cdot|^2 x|^{n-2}} \right\|_{\frac{p}{p-1},B} &= \left\{ \int_{|y|>1} \left(\frac{|y|}{|y-x|} \right)^{\frac{p(n-2)}{p-1}} \frac{dy}{|y|^{2n}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq \left\{ \int_{\substack{|y-x|<3, \\ |y|>1}} + \int_{|y|>2} \right\}^{1-\frac{1}{p}} < \left\{ \int_{|y-x|<3} |y-x|^{-\frac{p(n-2)}{p-1}} dy \right. \\ &\quad \left. + 2^{\frac{p(n-2)}{p-1}} \int_{|y|>2} \frac{dy}{|y|^{2n}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} = \left\{ S_n \left(\frac{p-1}{2p-n} 3^{\frac{2p-n}{p-1}} + \frac{1}{n} 2^{-\frac{2p-n}{p-1}} \right) \right\}^{1-\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

(здесь использовано очевидное неравенство

$$\frac{2}{3} < \frac{|y|}{|y-x|} < 2, \quad (35)$$

$|y| > 2, |x| < 1, n \geq 2$), то

$$|(Th)(x)| \leq M(p, n) \|h\|_{p,B}, \quad x \in B, \quad (36)$$

и, следовательно, с учетом (31) мы получаем неравенство

$$\|ET\|_p \leq M(p, n) \|E\|_{p,B}, \quad n \geq 3.$$

В случае же $n = 2$ при $x \in B$

$$|(Th)(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \left[\left| \int_{|y|<1} h(y) \ln \frac{1}{|y-x|} dy \right| + \left| \int_{|y|<1} h(y) \ln \frac{|y|}{|y-|y|^2 x|} dy \right| \right] = I_1 + I_2,$$

$$\begin{aligned} I_1 &\leq \frac{\|h\|_{p,B}}{2\pi} \left\| \ln \frac{1}{|\cdot-x|} \right\|_{\frac{p}{p-1},B} \leq \frac{\|h\|_{p,B}}{2\pi} \left\{ \int_{|y|<2} \left| \ln \frac{1}{|y|} \right|^{\frac{p}{p-1}} dy \right\}^{1-\frac{1}{p}} \\ &= (2\pi)^{-\frac{1}{p}} \|h\|_p \left\{ \int_{-\ln 2}^{+\infty} |\tau|^{\frac{p}{p-1}} e^{-2\tau} d\tau \right\}^{1-\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

$$I_2 \leq \frac{\|h\|_{p,B}}{2\pi} \left\| \ln \frac{|\cdot|}{|\cdot-|\cdot|^2 x|} \right\|_{\frac{p}{p-1},B},$$

$$\begin{aligned}
\left(\left\| \ln \frac{|\cdot|}{|\cdot - | \cdot |^2 x|} \right\|_{\frac{p}{p-1}, B} \right)^{\frac{p}{p-1}} &= \int_{|y|>1} \left| \ln \frac{|y|}{|y-x|} \right|^{\frac{p}{p-1}} \frac{dy}{|y|^4} \\
&\leq \int_{\substack{|y-x|<2, \\ |y|>1}} \left| \ln \frac{4}{|y-x|} \right|^{\frac{p}{p-1}} dy + \int_{\substack{2 \leq |y-x| \leq 3, \\ |y|>1}} (\ln |y-x|)^{\frac{p}{p-1}} dy + \int_{|y|>2} (\ln 2)^{\frac{p}{p-1}} \frac{dy}{|y|^4} \\
&= 32\pi \int_{\ln 2}^{+\infty} \tau^{\frac{p}{p-1}} e^{-2\tau} d\tau + 2\pi \int_{\ln 2}^{\ln 3} \tau^{\frac{p}{p-1}} e^{2\tau} d\tau + \frac{\pi}{4} (\ln 2)^{\frac{p}{p-1}}
\end{aligned}$$

(мы воспользовались здесь, как и выше, неравенством (35), а также тем, что $\left| \ln \frac{|y|}{|y-x|} \right| \leq \ln \frac{4}{|y-x|}$, если $|y-x| < 2$, $|y| > 1$, $|x| < 1$, и $\left| \ln \frac{|y|}{|y-x|} \right| \leq \ln |y-x|$, если $2 \leq |y-x| \leq 3$, $|x| < 1$). Тем самым и в этом случае

$$|(Th)(x)| \leq M(p, 2) \|h\|_{p, B}, \quad x \in B, \quad (37)$$

что влечет искомое неравенство

$$\|ET\|_p \leq M(p, 2) \|E\|_{p, B}.$$

Аналогичным образом доказывается неравенство

$$\|ZR\|_p \leq N(p, n) \|Z\|_{p, B}.$$

При этом неравенствам (31)–(34) соответствуют неравенства

$$\|(ZR)h\|_{p, B} \leq \|Z\|_{p, B} \max_{|x| \leq 1} |(Rh)(x)|,$$

$$|(Rh)(x)| = \left\{ \sum_{j=1}^n [(R_j h)(x)]^2 \right\}^{1/2} \leq \sqrt{n} \max_j \max_{|x| \leq 1} |(R_j h)(x)|,$$

$$|(R_j h)(x)| \leq \frac{1}{S_n} \left[\int_{|y|<1} \frac{|h(y)| dy}{|y-x|^{n-1}} + \int_{|y|<1} \frac{|y|^n |h(y)| dy}{|y-|y|^2 x|^{n-1}} \right],$$

$$\frac{1}{S_n} \int_{|y|<1} \frac{|h(y)| dy}{|y-x|^{n-1}} \leq \frac{\|h\|_{p, B}}{S_n} \left\{ \int_{|y-x|<2} \frac{dy}{|y-x|^{\frac{p(n-1)}{p-1}}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} = \left(\frac{p-1}{p-n} \right)^{1-\frac{1}{p}} \frac{\|h\|_{p, B}}{2^{\frac{n}{p}-1} S_n^{\frac{1}{p}}}$$

и

$$\begin{aligned}
\frac{1}{S_n} \int_{|y|<1} \frac{|y|^n |h(y)| dy}{|y-|y|^2 x|^{n-1}} &\leq \frac{\|h\|_{p, B}}{S_n} \left\{ \int_{|y|>1} \left[\frac{|y|^{n-2}}{|y-x|^{n-1}} \right]^{\frac{p}{p-1}} \frac{dy}{|y|^{2n}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} \\
&\leq \frac{\|h\|_{p, B}}{S_n} \left\{ \int_{\substack{|y-x| \leq 3, \\ |y|>1}} \frac{dy}{|y-x|^{\frac{p(n-1)}{p-1}}} + 2^{\frac{p(n-1)}{p-1}} \int_{|y|>2} \frac{dy}{|y|^{2n+\frac{p}{p-1}}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} \\
&= S_n^{-\frac{1}{p}} \left\{ \frac{p-1}{p-n} 3^{\frac{p-n}{p-1}} + \frac{p-1}{(n+1)p-n} 2^{-\frac{2p-n}{p-1}} \right\}^{1-\frac{1}{p}} \|h\|_{p, B}.
\end{aligned}$$

Оценим теперь $\|Q\widetilde{\mathcal{I}}\|_p$. С этой целью отметим прежде всего, что из условия (30) вытекает конечность величины $\|Q\|_\infty$. Поэтому для отображения $h \in L_p(B, \mathbb{R}^m)$ имеем

$$\begin{aligned} \|(Q\widetilde{\mathcal{I}})h\|_{p,B} &\leq \|Q\|_\infty \left[\sum_{l=1}^m \sum_{j,s=1}^n \|\widetilde{\mathcal{I}}_{js}^1 h_l\|_p^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|Q\|_\infty \left\{ \sum_{l=1}^m \left[\sum_{s=1}^n \left(\frac{\|h_l\|_{p,B}}{n} + \|\mathcal{I}_{ss} h_l\|_{p,B} \right)^2 + \sum_{j \neq s} \|\mathcal{I}_{js} h_l\|_p^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (38)$$

Таким образом, вопрос сводится к оцениванию p -нормы оператора \mathcal{I} .

Приступая к решению этой задачи, введем отображения $H(x) = h(x)$, $x \in B$, $H(x) = 0$ ($\in \mathbb{R}^m$), $x \in \mathbb{R}^n \setminus B$, и $\widetilde{H}(x) = 0$, $x \in B$, $\widetilde{H}(x) = |x|^{-(n+2)} h(x/|x|^2)$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus B$. Не составляет труда проверить (см. доказательство леммы 3 в [5]), что $\|\widetilde{H}_l\|_{p,\mathbb{R}^n} \leq \|H_l\|_{p,\mathbb{R}^n} = \|h_l\|_{p,B}$, $l = 1, 2, \dots$. Рассматривая далее оператор \mathcal{I} как оператор, действующий в пространстве $L_p(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ (мы сохраняем для этого оператора обозначение \mathcal{I}), представим его в виде разности двух операторов $\mathcal{I}^1 - \mathcal{I}^2$, где $\mathcal{I}^1 = \{\mathcal{I}_{js}^1, j, s = 1, \dots, n\}$,

$$\left. \begin{aligned} (\mathcal{I}_{ss}^1 H)(x) &= -\frac{1}{S_n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{n(y_s - x_s)^2 - |y - x|^2}{|y - x|^{n+2}} H(y) dy, \\ (\mathcal{I}_{js}^1 H)(x) &= -\frac{n}{S_n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(y_j - x_j)(y_s - x_s)}{|y - x|^{n+2}} H(y) dy \end{aligned} \right\} \quad (39)$$

и $\mathcal{I}^2 = \mathcal{I} - \mathcal{I}^1$. Учитывая условие $p > n$ и совершая замену переменного $y \mapsto y/|y|^2$, $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, мы можем аналогично тому, как это было сделано при выводе соотношений (8) в [5], убедиться, что $\mathcal{I}^2 H = \mathcal{I}^1 \widetilde{H}$. Последнее обстоятельство позволяет нам ограничиться оцениванием p -нормы оператора \mathcal{I}^1 .

Из определения (39) оператора \mathcal{I}^1 вытекает, что ядра сингулярных интегральных операторов в (39) удовлетворяют тем же условиям, что и ядро сингулярного интегрального оператора T из соотношений (55) работы [33] (т. е. условиям теорем 2–4 монографии [38, гл. II]). По этой причине мы воспользуемся методом оценивания p -норм последнего, содержащимся в доказательстве теоремы 1 статьи [33].

Следуя рассуждениям этого доказательства, приходим к неравенствам

$$\|\mathcal{I}_{js}^1 h_l\|_{p,B} \leq \|\mathcal{I}_{js}^1 H_l\|_{p,\mathbb{R}^n} \leq A_p^{js} \|H\|_{p,\mathbb{R}^n} = A_p^{js} \|h\|_{p,B}, \quad (40)$$

$j, s = 1, \dots, n$, где

$$A_p^{ss} \leq 2pA_{11} \exp \left\{ \frac{72}{A_{11}} [A_{11} + 2(A_{12})^2]^2 \right\} \quad (41)$$

и

$$A_p^{js} \leq 2pA_{21} \exp \left\{ \frac{72}{A_{21}} [A_{21} + 2(A_{22})^2]^2 \right\} \quad (j \neq s). \quad (42)$$

Заметим, что при этом мы воспользовались замечанием, содержащимся в сноске 4 статьи [33], а также тем обстоятельством, что ядра

$$K_{ss}(t) = \frac{\Omega_{ss}(t)}{|t|^n} = -\frac{nt_s^2 - |t|^2}{S_n |t|^{n+2}}, \quad K_{js}(t) = \frac{\Omega_{js}(t)}{|t|^n} = -\frac{nt_j t_s}{S_n |t|^{n+2}}$$

операторов \mathcal{J}_{ss}^1 и \mathcal{J}_{js}^1 , $s = 1, \dots, n$, $j \neq s$, удовлетворяют условиям

$$|\Omega_{ss}(t)| \leq \frac{n-1}{S_n}, \quad |\Omega_{js}(t)| \leq \frac{n}{2S_n} \quad (j \neq s),$$

$$\left[\sum_{i=1}^n |\partial_i \Omega_{js}(t)|^2 \right]^{1/2} \leq \frac{n}{S_n} \quad (j, s = 1, \dots, n), \quad (43)$$

если $|t| = 1$, и

$$\int_{|x| \geq 2|y|} \left| \frac{\Omega_{ss}(x-y)}{|x-y|^n} - \frac{\Omega_{ss}(x)}{|x|^n} \right| dx \leq \pi n \frac{2^{n-1}-1}{n-1} + (n-1) \left(\ln 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^{k-1}-1}{k} \right), \quad (44)$$

$$\int_{|x| \geq 2|y|} \left| \frac{\Omega_{js}(x-y)}{|x-y|^n} - \frac{\Omega_{js}(x)}{|x|^n} \right| dx \leq \pi n \frac{2^{n-1}-1}{n-1} + \frac{n}{2} \left(\ln 2 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2^{k-1}-1}{k} \right) \quad (45)$$

($j \neq s$), $y \neq 0$ (ср. (43)–(45) с соотношениями (27), (29) и (31) в [33]).

Принимая во внимание (38) и (40)–(42) и отмеченную выше связь между операторами \mathcal{J}^1 и \mathcal{J}^2 , мы легко получаем оценку

$$\|(Q\widetilde{\mathcal{J}})h\|_{p,B} \leq C(p, n, m) \|Q\|_{\infty} \|h\|_{p,B},$$

откуда следует неравенство

$$\|Q\widetilde{\mathcal{J}}\|_p \leq C(p, n, m) \|Q\|_{\infty}.$$

Теорема 4 доказана.

Теорему 3 естественно дополняет

Теорема 5. В условиях теоремы 3 для каждого $x \in \text{cl } B$ имеет место неравенство¹⁰⁾

$$|f(x) - (\Phi\psi)(x)| \leq \frac{M(p, n)}{1 - \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{J}}\|_p} \{ \|G\|_{p,B} + \|E\|_{p,B} \sup_{|x| < 1} |(\Phi\psi)(x)| + \|Z\|_{p,B} \sup_{|x| < 1} |(\Phi\psi)'(x)| + \|Q\|_{\infty} \|(\Phi\psi)''\|_{p,B} \}. \quad (46)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из условий теоремы 3 вытекает (см. ее доказательство), что как отображение $\gamma = G + E(\Phi\psi) + Z(\Phi\psi)' + Q(\Phi\psi)''$, так и отображение $h = [I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{J}})]^{-1}\gamma$ суммируемы в B с p -й степенью, причем

$$\|\gamma\|_{p,B} \leq \|G\|_{p,B} + \|E\|_{p,B} \sup_{|x| < 1} |(\Phi\psi)(x)| + \|Z\|_{p,B} \sup_{|x| < 1} |(\Phi\psi)'(x)| + \|Q\|_{\infty} \|(\Phi\psi)''\|_{p,B} \quad (47)$$

и

$$\|h\|_{p,B} \leq \| [I + (ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{J}})]^{-1} \|_p \|\gamma\|_{p,B} \leq \sum_{\nu=0}^{\infty} \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{J}}\|_p^{\nu} \|\gamma\|_{p,B} = (1 - \|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{J}}\|_p)^{-1} \|\gamma\|_{p,B}. \quad (48)$$

¹⁰⁾ Нормы $\|G\|_{p,B}$ и $\|(\Phi\psi)''\|_{p,B}$ отображений G и $(\Phi\psi)''$ определяются тем же способом, что и $\|E\|_{p,B}$ и $\|Z\|_{p,B}$.

Следовательно, в случае $|x| < 1$ неравенство (46) вытекает из соотношений (36), (37), (47) и (48).

В том же случае, когда $|x| = 1$, неравенство (46) превращается в равенство $f(x) = (\Phi\psi)(x)$. Теорема доказана.

Неравенство (46) представляет собой оценку устойчивости обсуждаемого нами типа в формуле Пуассона для гармонических отображений шара, т. е. оценку близости в C -норме отображения, определяемого формулой (22), к интегралу Пуассона (20). В частности, в силу (46) имеет место соотношение $\|f - \Phi\psi\|_C \rightarrow 0$, когда нормы $\|Q\|_\infty$, $\|Z\|_{p,B}$, $\|E\|_{p,B}$ и $\|G\|_{p,B}$ стремятся к нулю, причем если последние равны 0, то формула (22) превращается в формулу Пуассона для гармонических функций f .

Теоремы 3-5 непосредственно переносятся на случай произвольного шара $B(x_0, r)$. Формуле (22), например, в этом случае соответствует следующая формула:

$$f(x) = (\Phi_r\psi)(x) - \left(T_r \left(\left[I + \frac{ET_r + ZR_r + Q\widetilde{\mathcal{F}}_r}{r^2} \right]^{-1} \left(\frac{G + E(\Phi_r\psi) + Z(\Phi_r\psi)' + Q(\Phi_r\psi)''}{r^2} \right) \right) \right)(x),$$

$x \in B(x_0, r)$, а условие $\|ET + ZR + Q\widetilde{\mathcal{F}}\|_p < 1$ обретает вид $\|ET_r + ZR_r + Q\widetilde{\mathcal{F}}_r\|_p < r^2$ (операторы T_r , R_r , $\widetilde{\mathcal{F}}_r$ и Φ_r строятся на основе функции Грина «внутренней» задачи Дирихле для шара $B(x_0, r)$ способом, который мы использовали выше для построения операторов T , R , $\widetilde{\mathcal{F}}$ и Φ).

4. О локальном сглаживании ε -квазигармонических отображений.

В статье [39] Л. Берс показал, что каждое K -квазиконформное отображение на плоскости аппроксимируется в топологии локально равномерной сходимости гладкими K -квазиконформными отображениями. В этой связи и в связи с изложенным выше возникает следующий вопрос (проблема регуляризации для квазигармонических отображений). Можно ли ε -квазигармоническое отображение f приблизить в топологии локально равномерной сходимости последовательностью $\{f_\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}}$ гладких ε -квазигармонических отображений? Доказываемая ниже теорема 6 позволяет установить, что при малых значениях параметра ε такого рода аппроксимацию для ε -квазигармонических отображений можно осуществить на локальном уровне, т. е. в некоторой окрестности каждой точки области определения рассматриваемого отображения.

Теорема 6. Пусть $p > 1$. Существует положительное число $\varepsilon_p^* = \varepsilon_{p,n,m}^*$ такое, что если отображение $f : B \rightarrow \mathbb{R}^m$ есть непрерывное решение класса $W_{p,\text{loc}}^2(B, \mathbb{R}^m)$ ($B = B(0, 1)$, как и выше, — единичный шар в \mathbb{R}^n , $n \geq 2$) дифференциального неравенства (1) с $\varepsilon < \varepsilon_p^*$, то оно является ε -квазигармоническим отображением класса $W_{2n,\text{loc}}^2(B, \mathbb{R}^m)$. При этом найдется последовательность $\{f_\mu\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ бесконечно дифференцируемых ε -квазигармонических отображений $f_\mu : B \rightarrow \mathbb{R}^m$, сходящаяся к f локально равномерно в B .

Доказательство. В силу теорем 1 и 6 статьи [1] существует число $\varepsilon_p^0 = \varepsilon_{p,n,m}^0 > 0$ такое, что при $0 \leq \varepsilon < \varepsilon_p^0$ имеет место первое из утверждений теоремы.

Приступая к доказательству второго, мы в силу леммы 2 можем считать, что рассматриваемое отображение $f : B \rightarrow \mathbb{R}^m$ является решением системы вида (11), удовлетворяющей условию (12) с

$$\varepsilon < \varepsilon_p^* = \min\{\varepsilon_p^0, 1/\sqrt{n}, 1/C(2n, n, m)\} \quad (49)$$

($C(2n, n, m)$ — величина из неравенства (30)). Пусть $Q : B \rightarrow \mathbb{R}^{m \times mn^2}$ — отображение шара B в пространство $(m \times mn^2)$ -матриц, которое определяется системой (11) в обсуждаемом нами случае. В силу леммы 3.3.5 из [7, гл. 3] для этого отображения существует последовательность $\{Q^\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}}$ отображений $Q^\nu : B \rightarrow \mathbb{R}^{m \times mn^2}$ шара B в пространство $(m \times mn^2)$ -матриц такая, что

- (i) $Q^\nu \in C_0^\infty(B, \mathbb{R}^{m \times mn^2})$,
- (ii) $\|Q^\nu\|_\infty \leq \|Q\|_\infty < \varepsilon\sqrt{n}$, $\nu = 1, 2, \dots$,

и

- (iii) для любого $p \geq 1$

$$\|Q^\nu - Q\|_{p,B} = \left(\int_B \|Q^\nu(x) - Q(x)\|^p dx \right)^{1/p} \rightarrow 0$$

при $\nu \rightarrow \infty$. Отправляясь от этого факта, не составляет труда установить существование последовательности $\{Q^\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}}$ (вещественно) аналитических отображений, удовлетворяющей условиям (ii) и (iii). Зафиксируем ее далее и рассмотрим еще две последовательности $\{F_\mu\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ и $\{F_{\nu\mu}\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ отображений $F_\mu(x) = f(\frac{\mu-1}{\mu}x)$ и $F_{\nu\mu}(x) = (\Phi F_\mu^0)(x) - (T((I + Q_\mu^\nu \widetilde{\mathcal{F}})^{-1}(Q_\mu^\nu(\Phi F_\mu^0)'''))(x)$, $x \in B$, где $F_\mu^0 : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ — отображение единичной сферы $S = S(0, 1)$ пространства \mathbb{R}^n , $F_\mu^0(x) = f(\frac{\mu-1}{\mu}x)$, $x \in S$, ΦF_μ^0 — интеграл Пуассона (20), построенный на основе F_μ^0 , $Q_\mu^\nu(x) = Q^\nu(\frac{\mu-1}{\mu}x)$, $x \in B$, и оператор $I + Q_\mu^\nu \widetilde{\mathcal{F}}$ обратим в $\|\cdot\|_{2n}$ -норме (что вытекает из теоремы 3 и неравенств $\|Q_\mu^\nu \widetilde{\mathcal{F}}\|_{2n} \leq C(2n, n, m)\varepsilon < 1$, последнее из которых следует из (49)). Из теоремы 3, первого утверждения доказываемой теоремы и способа построения отображения $F_{\nu\mu}$ получим, что $F_{\nu\mu}$ является W_{2n}^2 -решением системы

$$\Delta F_{\nu\mu} = Q_\mu^\nu F_{\nu\mu}''$$

которая, как нетрудно проверить, при выполнении условия $\varepsilon\sqrt{n} < 1$ (в нашем случае оно следует из (49)) является эллиптической. Но тогда в силу гипоеллиптичности эллиптических линейных дифференциальных операторов [40] $F_{\nu\mu}$ бесконечно дифференцируемо (и даже вещественно аналитично, что вытекает из результатов статьи [41]). Следовательно, отображение $\widetilde{F}_{\nu\mu}(x) = F_{\nu\mu}(\frac{\mu}{\mu-1}x)$, $|x| < \frac{\mu-1}{\mu}$, есть C^∞ -гладкое W_{2n}^2 -решение системы

$$\Delta \widetilde{F}_{\nu\mu}(x) = Q^\nu(x) \widetilde{F}_{\nu\mu}''(x), \quad |x| < 1 - \frac{1}{\mu}.$$

Оценим разность $f - \widetilde{F}_{\nu\mu}$ в C -норме.

Воспользовавшись с этой целью вновь теоремой 3, прежде всего убеждаемся в том, что (при $|x| < 1 - \frac{1}{\mu}$)

$$f(x) - \widetilde{F}_{\nu\mu}(x) = F_\mu(y) - F_{\nu\mu}(y) = (T(P_\mu^\nu(\Phi F_\mu^0)'''))(y), \quad (50)$$

где $y = \frac{\mu x}{\mu-1}$ и $P_\mu^\nu = (I + Q_\mu^\nu \widetilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu - (I + Q_\mu \widetilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu$, $Q_\mu(y) = Q(\frac{\mu-1}{\mu}y)$, $|y| < 1$. Далее, для разности $\delta Q_\mu^\nu = Q_\mu^\nu - Q_\mu$, $\mu \geq 2$, имеем

$$\|\delta Q_\mu^\nu\|_{2n,B} = \left(\frac{\mu}{\mu-1} \right)^{1/2} \|Q^\nu - Q\|_{2n,B(0, \frac{\mu-1}{\mu})} \leq \sqrt{2} \|Q^\nu - Q\|_{2n,B} \rightarrow 0,$$

$\nu \rightarrow +\infty$. Полагая теперь ν столь большим, что

$$C(2n, n, m)(\varepsilon + \sqrt{2}\|Q^\nu - Q\|_{2n, B}) < 1,$$

и применяя математическую индукцию и соображения, аналогичные использованным в доказательстве теоремы 3, последовательно получаем (при $\mu \geq 2$)

$$\begin{aligned} (I + Q_\mu^\nu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu &= [I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}} + (\delta Q_\mu^\nu) \tilde{\mathcal{F}}]^{-1} Q_\mu^\nu = \{(I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})[I + (I \\ &+ Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}((\delta Q_\mu^\nu) \tilde{\mathcal{F}})]\}^{-1} Q_\mu^\nu = [I + (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}((\delta Q_\mu^\nu) \tilde{\mathcal{F}})]^{-1} (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu \\ &= \dots = \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} [-(I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}((\delta Q_\mu^\nu) \tilde{\mathcal{F}})]^j \right\} (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu = (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu \\ &+ \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} [-(I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}((\delta Q_\mu^\nu) \tilde{\mathcal{F}})]^j \right\} (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} Q_\mu^\nu + (I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1} \delta Q_\mu^\nu, \end{aligned}$$

откуда вытекает, что при этих же μ

$$\begin{aligned} &\|P_\mu^\nu\|_{2n} \\ &\leq \left\{ \varepsilon \sum_{j=1}^{\infty} (\|(I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}\|_{2n} \|\tilde{\mathcal{F}}\|_{2n} \|\delta Q_\mu^\nu\|_{2n, B})^j + \|\delta Q_\mu^\nu\|_{2n, B} \right\} \|(I + Q_\mu \tilde{\mathcal{F}})^{-1}\|_{2n} \\ &\leq \left\{ \varepsilon \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{2}C(2n, n, m)\|Q^\nu - Q\|_{2n, B}}{1 - C(2n, n, m)\varepsilon} \right)^j + \sqrt{2}\|Q^\nu - Q\|_{2n, B} \right\} \frac{1}{1 - C(2n, n, m)\varepsilon} \\ &= \frac{(\sqrt{2}\|Q^\nu - Q\|_{2n, B})(1 - \sqrt{2}C(2n, n, m)\|Q^\nu - Q\|_{2n, B})}{(1 - C(2n, n, m)\varepsilon)(1 - C(2n, n, m)(\varepsilon + \sqrt{2}\|Q^\nu - Q\|_{2n, B}))} \\ &= \varkappa(\|Q^\nu - Q\|_{2n, B}). \end{aligned}$$

Наконец, используя соотношения (36), (37) и (50), мы приходим к искомой оценке

$$\begin{aligned} \|f - \tilde{F}_{\nu\mu}\|_{C(B(0, 1 - \frac{1}{\mu}), \mathbb{R}^m)} &\leq M(2n, m)\|P_\mu^\nu\|_{2n}\|(\Phi F_\mu^0)''\|_{2n, B} \\ &\leq M(2n, m)\varkappa(\|Q^\nu - Q\|_{2n, B})\|(\Phi F_\mu^0)''\|_{2n, B} \quad (\rightarrow 0, \quad \nu \rightarrow \infty), \quad \mu \geq 2. \end{aligned}$$

Для завершения доказательства нам осталось воспользоваться теоремой Мальгранжа — Лакса о приближении (см., например, [42, гл. 3, § 3.10]). Действительно, пусть K_μ — это замкнутый шар $\text{cl } B(0, 1 - \frac{3}{2\mu})$, $\mu \geq 2$. Так как Q^ν — аналитическое отображение, в силу (49) система

$$\Delta F(x) = Q^\nu(x)F''(x), \quad x \in B, \quad (51)$$

эллиптическая и $\tilde{F}_{\nu\mu} — C^\infty$ -решение системы (51) в окрестности компакта K_μ , представляющей собой шар $B(0, 1 - \frac{1}{\mu})$, то по упомянутой теореме Мальгранжа — Лакса $\tilde{F}_{\nu\mu}$ можно равномерно на K_μ аппроксимировать C^∞ -решениями системы (51) в единичном шаре B . Дальнейшее построение искомой последовательности $\{f_\mu\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ очевидно. Теорема 6 полностью доказана.

Следствие. Существует положительное число $\varepsilon^{**} = \varepsilon_{n, m}^{**}$ такое, что если $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, U — область в \mathbb{R}^n , является ε -квазигармоническим отображением, $\varepsilon < \varepsilon^{**}$, то тогда каждая точка $x \in U$ обладает окрестностью $V_x \subset U$, для которой найдется последовательность $\{f_\mu : V_x \rightarrow \mathbb{R}^m\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ бесконечно дифференцируемых ε -квазигармонических отображений, сходящаяся равномерно в V_x к отображению $f|_{V_x}$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Копылов А. П. Свойства отображений, близких к гармоническим // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 4. С. 886–904.
2. Копылов А. П. О свойствах отображений, близких к гармоническим // Докл. РАН. 1999. Т. 364, № 2. С. 158–162.
3. Копылов А. П. Об основах теории устойчивости классов гармонических отображений // Докл. РАН. 1998. Т. 361, № 5. С. 591–594.
4. Копылов А. П. Устойчивость в C^1 -норме классов гармонических отображений // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 1. С. 49–66.
5. Копылов А. П. Об устойчивости классов гармонических отображений в C -норме // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 2. С. 343–353.
6. Решетняк Ю. Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе. Новосибирск: Наука, 1982.
7. Копылов А. П. Устойчивость в C -норме классов отображений. Новосибирск: Наука, 1990.
8. Копылов А. П. Об основах теории устойчивости в C^l -норме классов решений систем линейных уравнений с частными производными // Докл. РАН. 1999. Т. 365, № 5. С. 589–592.
9. Копылов А. П. Устойчивость в C^l -норме классов решений систем линейных уравнений с частными производными эллиптического типа // Сиб. мат. журн. 1999. Т. 40, № 2. С. 352–371.
10. Копылов А. П. Об устойчивости классов конформных отображений в дополнительных размерностях // Докл. РАН. 1997. Т. 357, № 1. С. 11–15.
11. Копылов А. П. К устойчивости классов конформных отображений. II // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 2. С. 326–343.
12. Копылов А. П. К устойчивости классов конформных отображений. III // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 4. С. 825–842.
13. Даирбеков Н. С. К вопросу об устойчивости класса голоморфных функций в замкнутой области // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 5. С. 1047–1050.
14. Копылов А. П. Об устойчивости в теоремах Коши и Мореры о голоморфных функциях // Докл. РАН. 2001. Т. 378, № 4. С. 447–449.
15. Безрукова О. Л. Устойчивость класса решений системы Моисила — Теодореско. Новосибирск, 1983. 50 с. (Препринт/АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики; № 46).
16. Даирбеков Н. С., Копылов А. П. ξ -устойчивость классов отображений и системы линейных уравнений с частными производными // Сиб. мат. журн. 1985. Т. 26, № 2. С. 73–90.
17. Тарханов Н. Н. Об устойчивости решений эллиптических систем // Функцион. анализ и его приложения. 1985. Т. 19, вып. 3. С. 92–93.
18. Безрукова О. Л., Даирбеков Н. С., Копылов А. П. Об отображениях, близких в C -норме к классам решений линейных эллиптических систем уравнений в частных производных // Тр. Ин-та математики АН СССР / Сиб. отд-ние. Новосибирск: ИМ СО РАН, 1987. С. 19–30. Т. 8. Исследования по геометрии и математическому анализу.
19. Даирбеков Н. С. О сглаживании отображений, близких к решениям эллиптических систем первого порядка // Сиб. мат. журн. 1987. Т. 28, № 3. С. 70–72.
20. Даирбеков Н. С. Свойства решений многомерных уравнений Бельтрами. Новосибирск, 1988. 35 с. (Препринт/АН СССР. Сиб. отд-ние. Институт математики; № 28).
21. Даирбеков Н. С. Об устранимых особенностях эллиптических систем первого порядка с нерегулярными коэффициентами // Сиб. мат. журн. 1993. Т. 34, № 1. С. 65–69.
22. Копылов А. П. Устойчивость в C^1 -норме пучков решений эллиптических систем линейных уравнений с частными производными второго порядка // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 6. С. 1304–1321.
23. Копылов А. П. Об устойчивости в C^1 -норме пучков решений эллиптических систем линейных уравнений с частными производными второго порядка // Докл. РАН. 1999. Т. 364, № 4. С. 449–452.
24. Даирбеков Н. С. Понятие квазирегулярных отображений нескольких n -мерных переменных // ДАН. 1992. Т. 324, № 3. С. 511–514.
25. Даирбеков Н. С. Квазирегулярные отображения нескольких n -мерных переменных // Сиб. мат. журн. 1993. Т. 34, № 4. С. 87–102.
26. Даирбеков Н. С. Устойчивость классов квазирегулярных отображений нескольких пространственных переменных // Сиб. мат. журн. 1995. Т. 36, № 1. С. 47–59.

27. Копылов А. П. Устойчивость классов отображений и непрерывность по Гёльдеру старших производных решений эллиптических систем нелинейных уравнений с частными производными произвольного порядка // Докл. РАН. 2001. Т. 379, № 4. С. 1–4.
28. Копылов А. П. Устойчивость классов отображений и гёльдеровость старших производных эллиптических решений систем нелинейных дифференциальных уравнений // Сиб. мат. журн. 2002. Т. 43, № 1. С. 90–107.
29. Nirenberg L. On a generalization of quasi-conformal mappings and its application to elliptic partial differential equations // Contributions to the theory of partial differential equations. Princeton: Princeton Univ. Press, 1954. P. 95–100. (Ann. Math. Stud.; v. 33).
30. Morrey C. V., Jr. Second order elliptic systems of differential equations // Contributions to the theory of partial differential equations. Princeton: Princeton Univ. Press, 1954. P. 101–159. (Ann. Math. Stud.; v. 33)
31. Копылов А. П. О W_q^1 -регулярности решений систем уравнений с частными производными, локально близких к эллиптическим системам линейных уравнений с постоянными коэффициентами // Докл. РАН. 1999. Т. 368, № 3. С. 303–306.
32. Копылов А. П. О регулярности решений систем уравнений с частными производными, локально близких к эллиптическим системам линейных уравнений с постоянными коэффициентами. I // Сиб. мат. журн. 1999. Т. 40, № 4. С. 861–879.
33. Копылов А. П. О регулярности решений систем уравнений с частными производными, локально близких к эллиптическим системам линейных уравнений с постоянными коэффициентами. II // Сиб. мат. журн. 2000. Т. 41, № 1. С. 98–117.
34. Решетняк Ю. Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. Новосибирск: Наука, 1982.
35. Копылов А. П. Об устойчивости в формуле Пуассона для гармонических функций // Докл. РАН. 2001. Т. 376, № 6. С. 733–737.
36. Соболев С. Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1962.
37. Adams R. A. Sobolev spaces. New York; San Francisco; London: Acad. Press, Inc., 1975.
38. Стейн И. Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. М.: Мир, 1973.
39. Bers L. On a theorem of Mori and the definition of quasiconformality // Trans. Amer. Math. Soc. 1957. V. 84, N 1. P. 78–84.
40. Шварц Л. Комплексные аналитические многообразия. Эллиптические уравнения с частными производными. М.: Мир, 1964.
41. Morrey C. V., Jr, Nirenberg L. On the analyticity of the solutions of linear elliptic systems of partial differential equations // Comm. Pure Appl. Math. 1957. V. 10. P. 271–290.
42. Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях. М.: Мир, 1971.

Статья поступила 13 августа 2001 г.

*Копылов Анатолий Павлович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
kopylov@math.nsc.ru*