

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ
МАКСИМУМА ДЛЯ МНОГООБРАЗИЙ
НАД ЛОКАЛЬНЫМИ АЛГЕБРАМИ

Т. И. Гайсин

Аннотация: Рассматриваются многообразия над локальной алгеброй A . Изучаются базовые функции канонического слоения, являющиеся вещественными частями A -дифференцируемых функций. Доказано, что такие функции постоянны. Найден вид A -дифференцируемых функций на некоторых многообразиях над локальными алгебрами, в том числе компактных. Получены оценка на размерность некоторых пространств 1-форм и аналоги указанных выше результатов для проектируемых отображений слоений.

Ключевые слова: многообразия над алгебрами, слоения, проектируемые отображения, базовые формы.

Мы используем результаты теории многообразий над алгебрами, изложенные в [1–3]. Все многообразия и отображения предполагаются класса C^∞ .

Кратко опишем известные объекты [1], с которыми будем работать. Пусть A — локальная алгебра над полем вещественных чисел [1]. Примером локальной алгебры над полем вещественных чисел может служить $R[n, S]$ — алгебра полиномов от n переменных с вещественными коэффициентами. Целое положительное число S называют *высотой алгебры* $R[n, S]$. Алгебра $R[n, S]$ наделяется стандартной операцией сложения. Операция умножения в $R[n, S]$ от стандартной отличается только одним условием: мономы степени выше S равны нулю, т. е. $x_1^{s_1} \cdot \dots \cdot x_n^{s_n} = 0$ ($s_1 + s_2 + \dots + s_n > S$). Линейные комбинации всевозможных произведений элементов x_1, \dots, x_n образуют $Rd(R[n, S])$ — максимальный идеал алгебры $R[n, S]$, называемый *радикалом* алгебры. Число n называется *шириной* алгебры $R[n, S]$. Элементы x_1, \dots, x_n образуют псевдобазис радикала алгебры $R[n, S]$. *Псевдобазисом* в радикале $Rd(A)$ локальной алгебры A называется набор элементов $a_k \in Rd(A)$ такой, что он порождает $Rd(A)$ как идеал в A , но любой его поднабор уже не порождает $Rd(A)$. Условие $A \cong R \oplus Rd(A)$ существенно. Известно, что если I — идеал в $R[n, S]$, то фактор-алгебра $R[n, S]/I$ будет локальной алгеброй. Верно и обратное: любая локальная алгебра A изоморфна некой алгебре вида $R[n, S]/I$ [1].

Гладкой над A или *A -дифференцируемой* функцией $G : A \rightarrow A$ называют гладкую функцию $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \cong A$, для которой касательное отображение $dG|_x : T_x \mathbb{R}^n \rightarrow T_{G(x)} A$, где $T_x \mathbb{R}^n \cong T_x A \cong A$, в любой точке $x \in \mathbb{R}^n$ будет A -линейно.

После выбора вещественного базиса $\{e_i\}$ в алгебре A можем записать разложение: $x \in A$, $x = x^i \cdot e_i$, $e_i \cdot e_j = \lambda_{ij}^k e_k$, где $\lambda_{ij}^k \in \mathbb{R}$, $G(x) = g^i(x) \cdot e_i$. Функция $G : A \rightarrow A$ будет A -дифференцируемой тогда и только тогда, когда выполняются условия Шеффера: $\partial_j g^s \cdot \lambda_{sk}^i = \lambda_{jk}^s \cdot \partial_s g^i$ [1]. Гладкая функция $G : A^m \rightarrow A$

многих переменных со значениями в A называется A -дифференцируемой, если она A -дифференцируема по каждому аргументу в отдельности [1].

Пусть M — гладкое многообразие, $\dim_R M = n \cdot m$, $\dim_R A = n$, $\{(U_\alpha, h_\alpha : U_\alpha \rightarrow R^{n \cdot m})_{\alpha \in \Delta}\}$ — максимальный атлас на M .

Введем на $\mathbb{R}^{n \cdot m}$ структуру свободного модуля A^m . Если функции склейки двух пересекающихся карт

$$h_{\beta\alpha} = h_\beta \circ h_\alpha^{-1} : h_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow h_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

A -дифференцируемы, то назовем их *согласованными*. Непересекающиеся карты также будем называть *согласованными*. Совокупность, состоящая из согласованных друг с другом карт, образующая покрытие M , называется A -атласом. Атлас называется *максимальным*, если он не лежит ни в каком большем атласе. Таким образом, мы получим некую совокупность максимальных A -атласов на M , возможно, пустую. Данные A -атласы, если они существуют, определяют на M (неизоморфные при тождественном отображении на M) структуры многообразия над алгеброй A .

Многообразие M с максимальным A -атласом называется *дифференцируемым над алгеброй A* многообразием.

Для каждой точки $x \in M$ касательное пространство $T_x M$ дифференцируемого над алгеброй A многообразия M наделено естественной структурой A -модуля $T_x A^m \cong A^m$. Структура A -модуля в слоях касательного расслоения $T_x M$ индуцируется структурами $T_{h(x)} A^m \cong A^m$ из карт A -атласа, которые в силу определения (A -дифференцируемость функций склейки карт A -атласа) инвариантны.

Поскольку $A \cong Rd(A) \oplus R$, имеем $Rd(A) \oplus \dots \oplus Rd(A) \subset A \oplus \dots \oplus A$. Если $F : A \oplus \dots \oplus A \rightarrow A \oplus \dots \oplus A$ есть A -дифференцируемое отображение, то из определения следует, что

$$dF : Rd(A) \oplus \dots \oplus Rd(A) \rightarrow Rd(A) \oplus \dots \oplus Rd(A)$$

(см., например, [2, 3]). Поэтому на M есть распределение, соответствующее $Rd(A) \oplus \dots \oplus Rd(A)$. Оно интегрируемо, тем самым на M определено слоение, называемое *каноническим*, или *естественным*.

Как известно [1], A -дифференцируемые функции $G : A^m \rightarrow A$, $\dim_R A = n$, имеют вид $G = e_i \cdot G^i$, $i = 0, \dots, n-1$, где e_i — вещественный базис локальной алгебры A , G^i в некотором специальном вещественном базисе (который мы будем называть стандартным) имеют вид

$$G_C(X^1, \dots, X^m) = g(x^1, \dots, x^m) + \sum_{|p|=1}^S \frac{1}{p!} \cdot \frac{D^p g}{dx^p} \cdot (X-x)^p, \quad (1)$$

где $p = (p_1, p_2, \dots, p_m)$, $p! = p_1! \cdot p_2! \cdot \dots \cdot p_m!$, $|p| = p_1 + p_2 + \dots + p_m$,

$$(X-x)^p = (X^1 - x^1)^{p_1} \cdot (X^2 - x^2)^{p_2} \cdot \dots \cdot (X^m - x^m)^{p_m},$$

$$\frac{D^p g}{dx^p} = \frac{\partial^{|p|} g}{(\partial x^1)^{p_1} (\partial x^2)^{p_2}, \dots, (\partial x^m)^{p_m}},$$

$$X^j - x^j = e_i \cdot x^{j,i}, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad x^j = x^{j,0},$$

$$e_0 = 1 \in A, \quad (e_k)^{(S+1)} = 0, \quad k = 1, \dots, n-1, \quad S \in \mathbb{N},$$

т. е. все e_k принадлежат радикалу $Rd(A)$, $Rd(A)^S \neq 0$, $Rd(A)^{S+1} = 0$, S — высота A , и существует псевдобазис e_l , $l = 1, \dots, r$, $r \leq n - 1$, $e_k = e_1^{s_1} \cdot \dots \cdot e_r^{s_r}$, r — ширина A [1–3] (здесь и далее все степени, в которые возводятся элементы из A , — целые неотрицательные числа).

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Необходимо отметить, что стандартный базис выбирается согласованно со структурой радикала $Rd(A)$, а именно [1]

$$\begin{aligned} i_2 &= r + 1, \dots, k_2; \quad k_2 \leq n - 1; \quad e_{i_2} \in Rd(A)^2; \quad k_0 = 0; \\ i_j &= k_{j-1} + 1, \dots, k_j; \quad k_j \leq n - 1; \quad e_{i_j} \in Rd(A)^j, \quad j = 1, \dots, S; \quad k_1 = r; \\ i_1 &= 1, \dots, k_1; \quad k_S = n - 1; \quad k_j - k_{j-1} = \dim_R\{Rd(A)^j / Rd(A)^{j+1}\}. \end{aligned}$$

Стандартный базис обладает следующим свойством (которым мы в дальнейшем пользуемся). Произведение любых двух элементов стандартного базиса $e_{i_{j_1}} \neq e_0$ и $e_{i'_{j_2}} \neq e_0$ (в наших обозначениях $e_{i_{j_1}} \cdot e_{i'_{j_2}} \in Rd(A)^{j_1+j_2}$) разлагается по стандартному базису $e_{i_{j_1}} \cdot e_{i'_{j_2}} = \lambda_{i_{j_1} i'_{j_2}}^l e_l$ (где $\lambda_{i_{j_1} i'_{j_2}}^l \in \mathbb{R}$ и $l = 1, \dots, n - 1$), и если $k_{j_1-1} < i_{j_1} \leq k_{j_1}$, а $k_{j_2-1} < i'_{j_2} \leq k_{j_2}$, то для $l \leq k_{j_1+j_2-1}$ всегда выполняется

$$\lambda_{i_{j_1} i'_{j_2}}^l = 0.$$

Далее проводим стандартное известное рассуждение, чтобы доказать указанное свойство. По определению $Rd(A)^S$ есть совокупность линейных над R комбинаций элементов из $Rd(A)$ вида $a_1 \cdot \dots \cdot a_S = a$. Любой элемент a_l (здесь $l = 1, \dots, S$) из радикала представим в виде $a_l = \mu_{s_1, \dots, s_r} e_1^{s_1} \cdot \dots \cdot e_r^{s_r}$, $\mu_{s_1, \dots, s_r} \in \mathbb{R}$ (см. [1, с. 20]). Тогда из определений получаем, что любое $a = a_1 \cdot \dots \cdot a_S$ разлагается с вещественными коэффициентами по элементам вида $e_1^{s_1} \cdot \dots \cdot e_r^{s_r}$, у которых $s_1 + s_2 + \dots + s_r = S$. Значит, мы можем выбрать базис пространства $Rd(A)^S$ из элементов вида $e_{i_S} = e_1^{s_1} \cdot \dots \cdot e_r^{s_r}$, у которых $s_1 + s_2 + \dots + s_r = S$, занумеровав их в обратном порядке начиная с $n - 1$. Далее, $Rd(A)^S \subset Rd(A)^{S-1}$. Рассуждая, как раньше, получим, что любой элемент из $Rd(A)^{S-1}$ разлагается с вещественными коэффициентами по произведениям элементов псевдобазиса степеней $S - 1$ и S . Ясно, что мы можем дополнить базис $\{e_{i_S}\}$ подпространства $Rd(A)^S$ до базиса пространства $Rd(A)^{S-1}$ элементами вида $e_{i_{S-1}} = e_1^{s_1} \cdot \dots \cdot e_r^{s_r}$, у которых $s_1 + s_2 + \dots + s_r = S - 1$. Таким образом, мы можем подняться до базиса пространства $Rd(A)^2$. Теперь нам нужно учесть, что фиксированный вектор псевдобазиса e_{i_1} не может быть выражен через элементы уже выбранного базиса пространства $Rd(A)^2$, объединенного с оставшимися отличными от e_{i_1} векторами псевдобазиса. Иначе получаем противоречие с $Rd(A)^{S+1} = 0$ или противоречие с определением псевдобазиса [1]. Имеет место следующее очевидное утверждение [1].

Предложение. Пусть размерность локальной алгебры $\dim_R A$ равна n , тогда стандартный базис алгебры A обладает следующими свойствами: $e_0 = 1 \in A$, $(e_1)^{(S+1)} = 0$, $(e_k)^{(S+1)} = 0$ и $k = 2, \dots, n - 1$; e_k — вещественный базис идеала.

Теорема 1. Пусть M — многообразие над локальной алгеброй A , $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, $G : M \mapsto A$ — A -дифференцируемая функция (в алгебре A выбран стандартный базис). Пусть L — слой естественного слоения на M , порожденного структурой алгебры A , такой, что \bar{L} компактно, где \bar{L} — замыкание слоя L .

Тогда для такого слоя L естественного слоения на M , порожденного структурой алгебры A , существует слой K такой, что $K \subset \bar{L}$ и g — вещественная часть G — имеет нулевой дифференциал $d(g)|_K = 0$ на слое K .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По определению идеала имеем $e_1 \cdot e_k = e_i \cdot v_k^i$, где $i, k = 2, \dots, n-1$; $v_k^i \in R$. Очевидно, что из $(e_1)^{S+1} = 0$ следует $e_1 \cdot e_1 = e_i \cdot v^i$, $i = 2, \dots, n-1$. Тогда из локального вида A -дифференцируемых функций (1) получаем

$$G(X^1, \dots, X^m) = G^0(X^1, \dots, X^m) + e_i \cdot G^i = g + e_i \cdot g^i,$$

здесь имеется в виду, что G^0 и все G^i локально имеют вид (1), $i = 1, \dots, n-1$, g — вещественная часть G^0 , а g^i и g — разложение G по базису. В общем случае локально в карте U из A -дифференцируемого атласа

$$g^1 = \frac{\partial g}{\partial x^j} \cdot x^{j,1} + b(x^1, \dots, x^m), \quad j = 1, \dots, m.$$

Ясно, что для $i_1 = 1, \dots, k_1$ (см. замечание 1)

$$g^{i_1} = \frac{\partial g}{\partial x^j} \cdot x^{j,i_1} + b(x^1, \dots, x^m), \quad j = 1, \dots, m.$$

Необходимо отметить (это существенно для доказательства), что g — базовая функция канонического слоения на M , слагаемое $b(x^1, \dots, x^m)$ зависит от системы координат, но так же, как и g , зависит только от трансверсальных координат $\{x^1, \dots, x^m\}$ канонического слоения на M [1–4]. В индуцированной топологии \bar{L} — компактное множество. Ясно, что g^1 на \bar{L} достигает минимума в точке x . Точку x содержит некоторый слой K . Из теории слоений известно, что $x \in K \subset \bar{L}$ [4]. В карте из A -дифференцируемого атласа, содержащей x , точка x имеет координаты $\{x^1, \dots, x^m, 0, \dots, 0\}$. Если $d(g)|_K \neq 0$, то найдется набор $x^{j,1}$ такой, что

$$\{x^1, \dots, x^m, x^{1,1}, \dots, x^{m,1}, 0, \dots, 0\}$$

задает координаты некоторой точки \tilde{x} из U , $\tilde{x} \in K$ и $g^1(x) > g^1(\tilde{x})$, что невозможно, значит, $d(g)|_K = 0$. \square

Из теоремы 1 следует, что $g^1|_{\bar{L}}$ достигает минимума и максимума на \bar{L}/L .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Пусть B — многообразие со слоением Φ . Будем говорить, что слоение Φ *замыкаемо*, если \bar{L} компактно для каждого слоя L слоения Φ , где \bar{L} — замыкание слоя L .

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Если слоение компактно, то оно замыкаемо, если многообразие компактно, то любое слоение на нем замыкаемо.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. (1) Компактное многообразие над локальной алгеброй A , удовлетворяет условиям нижеследующих теорем.

(2) Если M — многообразие над локальной алгеброй A и естественное слоение (называемое каноническим) на M , порожденное структурой алгебры A , компактно (или каноническое слоение на M компактно), то M удовлетворяет условиям нижеследующих теорем.

Теорема 2. Пусть M — связное многообразие над локальной алгеброй A , $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, и каноническое слоение на M замыкаемо, $G : M \mapsto A$ — A -дифференцируемая функция, где в алгебре A выбран стандартный базис. Тогда

- 1) на M вещественная часть g A -дифференцируемой функции G постоянна,
- 2) компонента A -дифференцируемой функции при e_1 постоянна на слоях канонического слоения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из теоремы 1 следует, что все значения базовой функции g критические. Из теоремы Сарда (множество критических значений имеет меру нуль) получаем наше утверждение. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Назовем *крайним элементом* стандартного базиса алгебры A элемент $\tilde{e}_k = e_{i_0}$ такой, что $\tilde{e}_k \cdot e_l = 0$, где $l = 1, \dots, n-1$ или $\tilde{e}_k \cdot Rd(A) = 0$. Другие, т. е. не крайние элементы, обозначим через \tilde{e}_j .

Для любых двух элементов e_j и e_i базиса алгебры A определены числа $\lambda_{ji}^k \in R$ такие, что $e_j \cdot e_i = \lambda_{ji}^k e_k$ [1].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Назовем стандартный базис $\{e_i\}$ локальной алгебры A V -базисом, если он удовлетворяет следующему условию.

Для любого не крайнего элемента \tilde{e}_{j_0} базиса $\{e_i\}$ алгебры A существует элемент $\tilde{e}_{i_0} \neq e_0 = 1 \in A$ (i_0 здесь фиксировано) базиса такой, что $\lambda_{j_0 i_0}^{k_0} \neq 0$ для некоторого k_0 и для всех $j \neq j_0$ выполнено $\lambda_{j i_0}^{k_0} = 0$ (здесь k_0 и i_0 фиксированы).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Будем говорить, что локальная алгебра A есть V -алгебра, если она допускает V -базис.

Ясно, что V -алгебры существуют (см. [1, с. 20]).

Следствие 1. Пусть M — многообразие над V -алгеброй A и каноническое слоение на M замыкаемо, $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, где в алгебре A выбран V -базис.

Тогда A -дифференцируемые функции $G : M \rightarrow A$ имеют вид

$$G = a + f^k \cdot \tilde{e}_k,$$

где $a \in A$, а f^k — базовые функции канонического слоения на M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Произвольная A -дифференцируемая функция локально имеет вид

$$G(X^1, \dots, X^m) = G^0(X^1, \dots, X^m) + e_i \cdot G^i = \tilde{e}_j \cdot G^j + \tilde{e}_k \cdot G^k = g + e_i \cdot g^i,$$

здесь подразумевается, что G^0 и все G^i локально имеют вид (1), $i = 1, \dots, n-1$, g — вещественная часть G^0 , а g^i и g — разложение G по базису. Из теоремы 2 следует, что $G^0 = a \in A$, т. е. $g = \text{const}$. Пусть теперь \tilde{e}_{i_1} — не крайний элемент псевдобазиса, $i_1 = 1, \dots, k_1$ (см. замечание 1). Покажем, что $g^{i_1} = \text{const}$ (g^{i_1} — глобально определенная на M базовая функция канонического слоения). Существующая локально G^{i_1} имеет вид (1), и $G^{i_1} = g^{i_1} + e_i \cdot \hat{g}^i$, $i = 1, \dots, n-1$. Элемент \tilde{e}_{i_1} удовлетворяет условиям определения 3 (существует \tilde{e}_{i_0} из определения 3). Из формулы (1) следует, что

$$\hat{g}^{i_0} = \frac{\partial g^{i_1}}{\partial x^j} \cdot x^{j, i_0} + \dots + b(x^1, \dots, x^m), \quad j = 1, \dots, m,$$

и функция $\hat{g}^{i_0} - \frac{\partial g^{i_1}}{\partial x^j} \cdot x^{j, i_0}$ не зависит от переменных x^{j, i_0} , что вытекает из свойств базиса (замечание 1). Переменные x^{j, i_0} в первой степени, не умноженные на другие переменные, входят только в вещественнозначную функцию \hat{g}^{i_0} , определяемую A -дифференцируемой функцией вида (1). Теперь g^{k_0} из разложения G

по базису (номер k_0 из определения 3) локально имеет вид $g^{k_0} = \lambda_{i_1 i_0}^{k_0} \cdot \hat{g}^{i_0} + (\dots)$ (i_0 фиксировано), функция $g^{k_0} - \lambda_{i_1 i_0}^{k_0} \cdot \hat{g}^{i_0}$ (i_0 фиксировано) не зависит от переменных x^{j, i_0} . Иначе должны существовать элементы алгебры A вида $e_i \cdot e_{i_0}$ или $e_i \cdot e_{i_0} \cdot e_l$ (здесь $1 \leq i, i \neq i_1, 1 \leq l$), имеющие после разложения по V -базису ненулевой вещественный коэффициент при e_{k_0} . Первое невозможно непосредственно по определению V -базиса. Второе невозможно, поскольку элемент $e_i \cdot e_l$ имеет после разложения по V -базису нулевой вещественный коэффициент при e_{i_1} , что следует из свойства стандартного базиса (см. замечание 1).

Теперь, рассуждая относительно g^{k_0} так же, как в теоремах 1 и 2, получим, что $g^{i_1} = \text{const}$. Далее, рассуждая по индукции, а именно переходя к номерам $i_2, i_2 = k_1 + 1, \dots, k_2$ (см. замечание 1) и т. д., получим доказательство нашего утверждения. \square

Пусть M — многообразие над A [1], Ω — пространство дифференциальных форм на M , $\Omega_A \subset \Omega_{A\text{-lin}} \subset A \otimes \Omega$, $\Omega_{A\text{-lin}}$ — пространство A -линейных форм [2], Ω_A — пространство A -дифференцируемых форм [3], т. е. A -линейных и таких, что внешний дифференциал от любого представителя Ω_A снова A -линеен. Получаем следующую короткую точную последовательность комплексов:

$$0 \rightarrow \Omega_A \rightarrow A \otimes \Omega \rightarrow \frac{A \otimes \Omega}{\Omega_A} \rightarrow 0.$$

Назовем первый слева комплекс (Ω_A, d) *комплексом A -дифференцируемых форм*. Перейдем к длинной точной последовательности групп когомологий:

$$0 \rightarrow H_A^0 \rightarrow A \otimes H^0 \rightarrow H_{/A}^0 \rightarrow H_A^1 \rightarrow A \otimes H^1 \rightarrow \dots,$$

где группы без индекса внизу суть группы комплекса де Рама, а H_A^* — группы когомологий комплекса (Ω_A, d) , $H_{/A}^*$ — группы когомологий фактор-комплекса $(\Omega_{/A}, d)$.

Лемма 1. *Первая группа H_A^1 комплекса (Ω_A, d) вкладывается в первую группу когомологий комплекса де Рама $A \otimes H^1$:*

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow H_A^1 \rightarrow A \otimes H^1 \rightarrow \dots$$

Рассмотрим форму $\omega \in \Omega_A$, $\omega = e_i \cdot \omega^i = \check{e}_j \cdot \check{\omega}^j + \tilde{e}_k \cdot \tilde{\omega}^k$, где $\omega^i \in \Omega$ или, что то же самое, $\check{\omega}^j \in \Omega$, $\tilde{\omega}^k \in \Omega$, $\ker\{d\}$ — ядро внешнего дифференциала, $(\ker\{d\} \cap \Omega_A^j)$ — пространство замкнутых A -дифференцируемых форм, Ω^s — пространство дифференциальных s -форм.

Обозначим (для каждого j_0) через $\check{\Omega}_{AR}^{s, j_0} \subset \Omega^s$ некоторое подпространство в пространстве Ω^s , удовлетворяющее следующему условию:

$$\check{\Omega}_{AR}^{s, j_0} = \{\check{\omega}^{j_0} \in \Omega^s \mid \exists \omega \in \Omega_A, \omega = \check{e}_{j_1} \cdot \check{\omega}^{j_1} + \check{e}_{j_0} \cdot \check{\omega}^{j_0} + \check{e}_{j_2} \cdot \check{\omega}^{j_2} + \tilde{e}_k \cdot \tilde{\omega}^k\}.$$

Обозначим (для каждого j_0) через $Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j_0} \subset \Omega^s$ некоторое подпространство в пространстве Ω^s , удовлетворяющее следующему условию:

$$Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j_0} = \{\check{\omega}^{j_0} \in \Omega^s \mid \exists \omega \in (\Omega_A \cap \ker\{d\}), \omega = \check{e}_{j_1} \cdot \check{\omega}^{j_1} + \check{e}_{j_0} \cdot \check{\omega}^{j_0} + \check{e}_{j_2} \cdot \check{\omega}^{j_2} + \tilde{e}_k \cdot \tilde{\omega}^k\}.$$

Обозначим через $Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j} \subset \check{e}_j \otimes Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j}$ некоторое подпространство в пространстве $\check{e}_j \otimes Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j}$, удовлетворяющее следующему условию:

$$Z\check{\Omega}_{AR}^s = \{\check{\omega} \in \check{e}_j \otimes Z\check{\Omega}_{AR}^{s, j} \mid \exists \omega \in (\Omega_A \cap \ker\{d\}), \omega = \check{\omega} + \tilde{e}_k \cdot \tilde{\omega}^k\}.$$

Теорема 3. Пусть M — многообразие над локальной алгеброй A , $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, и каноническое слоение на M замыкаемо. В алгебре A выбран стандартный базис. Тогда пространства $Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,0}$ вкладываются в пространство $A \otimes H^1(M)$:

$$0 \rightarrow Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,0} \rightarrow A \otimes H^1 \rightarrow \dots$$

Мы не доказываем теорему 3 — ее доказательство аналогично обоснованию следствия 2, см. ниже.

Следствие 2. Пусть M — многообразие над V -алгеброй A , $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, и каноническое слоение на M замыкаемо. В алгебре A выбран V -базис. Тогда

1) пространство $Z\check{\Omega}_{A_R}^1$ вкладывается в пространство $A \otimes H^1(M)$:

$$0 \rightarrow Z\check{\Omega}_{A_R}^1 \rightarrow A \otimes H^1 \rightarrow \dots;$$

2) пространства $Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,j}$ вкладываются в пространство $A \otimes H^1(M)$:

$$0 \rightarrow Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,j} \rightarrow A \otimes H^1 \rightarrow \dots;$$

3) пространства $Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,j}$ вкладываются в $Z\check{\Omega}_{A_R}^1$:

$$0 \rightarrow Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,j} \rightarrow Z\check{\Omega}_{A_R}^1 \rightarrow \dots$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Возьмем 1-формы $\omega, \varsigma \in [\omega] \in H_A^1$ так, что $\omega \in \Omega_A$, $\omega = e_i \cdot \omega^i = \check{e}_j \cdot \check{\omega}^j + \check{e}_k \cdot \check{\omega}^k$; $\varsigma \in \Omega_A$, $\varsigma = e_i \cdot \varsigma^i = \check{e}_j \cdot \check{\varsigma}^j + \check{e}_k \cdot \check{\varsigma}^k$. Поскольку из следствия 1 известно, что $\check{\Omega}_{A_R}^{0,j} \cong R \Rightarrow \check{\omega}^j = \check{\varsigma}^j$, доказательство завершается ссылкой на лемму 1. \square

Следствие 3. Пусть M — многообразие над V -алгеброй A , $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, каноническое слоение на M замыкаемо, в алгебре A выбран V -базис и $\dim\{H^1(M)\} < \infty$. Тогда пространство $Z\check{\Omega}_{A_R}^1$ будет конечномерно и

$$\dim_R\{Z\check{\Omega}_{A_R}^{1,j}\} \leq \dim_R\{Z\check{\Omega}_{A_R}^1\} \leq \dim_R\{A \otimes H^1(M)\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО вытекает из следствия 2. \square

В нижеприведенных следствиях каноническое слоение на N — расслоение, h — натуральное число.

Известно, что $A \cong Rd(A) \oplus R$, $A^h \cong Rd(A)^h \oplus R^h$ [1].

Следствие 4. Пусть M — многообразие над локальной алгеброй A и каноническое слоение на M замыкаемо, $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, и пусть $\pi : N \rightarrow B$ — локально тривиальное расслоение с типовым слоем $Rd(A)^h$, где $\dim_R B = h$. Предположим, что существует атлас этого расслоения $\phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times Rd(A)^h \subset R^h \oplus Rd(A)^h \cong A^h$, задающий на N структуру многообразия над алгеброй A . Тогда для любого дифференцируемого над A отображения $F : M \rightarrow N$ выполняется $\pi \circ F : M \rightarrow B$.

Мы не проводим доказательство следствия 4, ибо оно аналогично доказательству следствия 5 (см. ниже).

Следствие 5. Пусть M — многообразие над V -алгеброй A и каноническое слоение на M замыкаемо, $\dim_R A = n$, $\dim_A M = m$, и пусть $\pi : N \rightarrow B$ — локально тривиальное расслоение с типовым слоем $Rd(A)^h$, где $\dim_R B = h$. Предположим, что существует атлас этого расслоения $\phi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times Rd(A)^h \subset R^h \oplus Rd(A)^h \cong A^h$, задающий на N структуру многообразия над алгеброй A . Тогда для любого дифференцируемого над A отображения $F : M \rightarrow N$ выполняется

$$\pi \circ F : M \mapsto \text{pt} \in B$$

и в локальных координатах F имеет вид

$$F = \bigoplus_{i=1}^h (a_i + f^{i,k} \cdot \tilde{e}_{i,k}),$$

где $a_i \in A$, а функции $f^{i,k}$ зависят только от трансверсальных координат канонического слоения на M .

Доказательство. Пусть $y \in \text{Im}(F) \subset N$ и $y \in \pi^{-1}(U_\beta) \subset N$, $\phi_\beta : \pi^{-1}(U_\beta) \rightarrow U_\beta \times Rd(A)^h \subset R^h \oplus Rd(A)^h \cong A^h$.

Существуют $U_\gamma \subset U_\delta \subset U_\beta$, $g : U_\beta \rightarrow R^h$ такие, что $y \in U_\gamma$, $g : |_{U_\gamma} \rightarrow R^h$ — диффеоморфизм по равенству координат, $g : |_{U_\beta \setminus U_\delta} \rightarrow R^h$ — отображение, переводящее все точки в нулевой вектор из R^h . Тогда из формулы (1) следует существование A -дифференцируемого отображения $G : U_\beta \times Rd(A)^h \rightarrow A^h$ такого, что g является вещественной частью G , $G|_{U_\gamma \times Rd(A)^h}$ — A -диффеоморфизм по равенству координат, $G|_{U_\beta \times Rd(A)^h \setminus U_\delta \times Rd(A)^h}$ — A -дифференцируемое отображение, переводящее все точки в нулевой вектор из A^h . Ясно, что G продолжается на все N нулем. Теперь $G \circ F : M \rightarrow A^h$. Используя следствие 1, получаем наше утверждение.

Замечание 4. Пусть $\langle \tilde{e}_{i,k} \rangle$ — линейная оболочка базисных векторов $\tilde{e}_{i,k}$, $\langle \tilde{e}_{i,k} \rangle$ — подпространство в $Rd(A)^h$. В обозначениях следствия 5 в $\pi : N \rightarrow B$ существует векторное подрасслоение $\pi|_{N_1} : N_1 \rightarrow B$ со слоем $\langle \tilde{e}_{i,k} \rangle$, $i : N_1 \rightarrow N$ — вложение, F — A -дифференцируемое отображение из следствия 5, F — морфизм слоений. Существует $F_1 : M \rightarrow N_1$ такое, что в локальных координатах выполняется следующее равенство: $i \circ F_1 = \bigoplus_{i=1}^h (0_i + f^{i,k} \cdot \tilde{e}_{i,k})$.

Пример. Пусть (в обозначениях следствия 5) $N \cong TB$ — касательное расслоение многообразия B , TB рассматривается как многообразие над алгеброй дуальных чисел $R(\epsilon)$ [1], $M \cong T^2$ — двумерный тор, наделенный структурой многообразия над алгеброй дуальных чисел $R(\epsilon)$ [5, 6]. Тогда мы находимся в условиях следствия 5.

Далее рассматриваются проектируемые отображения на некоторых слоениях.

Пусть M — многообразие со структурой слоения произвольной коразмерности [4], (Ω, d) — комплекс дифференциальных форм на M . Отображение называется *проектируемым*, если оно постоянно на слоях слоения. Форма $\omega \in \Omega$ называется *базовой*, если для любого слоя L слоения имеют место равенства

$$\forall v \in T_x L \quad i_v \omega(x) = 0, \quad i_v(d(\omega))(x) = 0.$$

В карте, адаптированной к структуре слоения, базовая форма имеет следующий вид:

$$\omega_{i_1, \dots, i_k}(x^1, \dots, x^q) \cdot dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k},$$

где q — коразмерность слоения, $i_1, \dots, i_k = 1, \dots, q$, x^{i_1}, \dots, x^{i_k} — трансверсальные координаты.

Пусть $\Omega_B \subset \Omega$ — подкомплекс базовых форм [1]. Получаем следующую короткую точную последовательность комплексов:

$$0 \rightarrow \Omega_B \rightarrow \Omega \rightarrow \frac{\Omega}{\Omega_B} \rightarrow 0.$$

Перейдем к длинной точной последовательности групп когомологий:

$$0 \rightarrow H_B^0 \rightarrow H^0 \rightarrow H_{/B}^0 \rightarrow H_B^1 \xrightarrow{i} H^1 \rightarrow \dots, \quad (2)$$

где группы без индекса внизу суть группы когомологий комплекса де Рама, H_B^* — группы когомологий комплекса (Ω_B, d) , $H_{/B}^*$ — группы когомологий фактор-комплекса $(\frac{\Omega}{\Omega_B}, d)$. Легко доказать следующее утверждение.

Лемма 2. *В длинной точной последовательности (2) $i : H_B^1 \rightarrow H^1$ есть мономорфизм.*

Для дальнейшего нам понадобится понятие намотки слоя на слой. В следующей лемме 3 мы в удобной нам форме излагаем известные факты [4].

Лемма 3. *Пусть M — произвольное многообразие со слоением, $p \in L$, и пусть в некоторой адаптированной к слоению карте (U, x^A) , $p \in U$, найдется нестационарная последовательность локальных слоев $Q_i \subset L' \cap U$ слоя L' , сходящаяся к некоторому локальному слою $Q_p \subset L \cap U$ слоя L , проходящему через точку p . Тогда для любой другой точки $\tilde{p} \in L$ и адаптированной к слоению карты (\tilde{U}, \tilde{x}^A) , $\tilde{p} \in \tilde{U}$, найдется нестационарная последовательность локальных слоев $\tilde{Q}_i \subset L' \cap \tilde{U}$ слоя L' , сходящаяся к некоторому локальному слою $\tilde{Q}_{\tilde{p}} \subset L \cap \tilde{U}$ слоя L , проходящему через точку \tilde{p} .*

Если пара глобальных слоев $L', L \subset M$ удовлетворяет условиям предыдущей леммы 3, то будем говорить, что слой L' *наматывается* на слой L .

Лемма 4. *Пусть M — многообразие со структурой слоения коразмерности q , $g : M \rightarrow R^q$ — проектируемое отображение. Если слой L' наматывается на слой L , то значение g на L' равно значению g на L и дифференциал отображения g на слое L удовлетворяет условию $\text{rank}\{d(g)|_L\} < q$.*

Доказательство. Пусть $p \in L$. Из условия леммы 4 следует, что существует последовательность точек a_i , лежащая в слое L' и сходящаяся к p , а это, в свою очередь, влечет, что в адаптированной к слоению карте локальные слои слоя $L' \supset Q_{a_i} \rightarrow L_p \subset L$ сходятся к локальному слою слоя L . Из непрерывности g вытекает, что $g(a_i) = g(p)$.

Пусть x_i^j — трансверсальные координаты точек a_i , x_0^j — трансверсальные координаты точки p , $j = 1, \dots, q$, тогда $x_i^j \rightarrow x_0^j$. Если в точке x_0^j ранг матрицы Якоби максимален, т. е. $\text{rank}\{d(g)\} = q$, то по теореме об обратной функции существует окрестность V точки x_0^j , на которой g является диффеоморфизмом на $g(V)$, что невозможно, ибо из $g(x_i^j) = g(x_0^j)$ следует, что не существует открытой окрестности точки x_0^j , на которой g инъективно.

Теорема 4. *Пусть структура слоения коразмерности q на связном многообразии M замыкаема. Если множество компактных слоев слоения не более*

чем счетно (в частности, компактных слоев нет), то все проектируемые отображения $g : M \rightarrow R^q$ имеют образ меры нуль и $\text{rank}\{d(g)\} < q$ в каждой точке из M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. M_1 — множество, состоящее из точек, содержащихся в компактных слоях. Ясно, что, поскольку g постоянно на слоях, множество $g(M_1)$ счетно и, значит, имеет меру нуль. Пусть

$$M_2 = M \setminus M_1, \quad M_3 = \{p \in M \mid \text{rank}\{d(g)\}|_p < q\}.$$

Покажем, что $M_2 \subset M_3$. Действительно, из некомпактности L и компактности \bar{L} следует, что существует последовательность $\{p_i \in L\}$ такая, что $p_i \rightarrow p \notin L$, $p \in L' \subset \bar{L}$. Из леммы 4 имеем $\text{rank}\{d(g)|_p\} < q$, следовательно, $\text{rank}\{d(g)|_{L'}\} < q$. Получаем, что все значения $g(M_2)$ будут критическими. Из теоремы Сарда вытекает, что $g(M) = g(M_2) \cup g(M_1)$ имеет меру нуль.

Следствие 6. Пусть структура слоения коразмерности q на связном многообразии M замыкаема, N — многообразие. Если множество компактных слоев слоения на M не более чем счетно (в частности, компактных слоев нет), то все проектируемые отображения $g : M \rightarrow N$ имеют $\text{rank}\{d(g)\} < q$ в каждой точке из M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\dim N = m$, из теоремы Уитни следует существование вложения многообразия $G : N \rightarrow R^{2 \cdot m + 1}$, $\text{rank}\{d(G)\} = m$. Тогда $\text{rank}\{d(G \circ g)\} < q$, иначе получим противоречие с теоремой 4, откуда $\text{rank}\{d(g)\} < q$.

Следствие 7. Пусть структура слоения коразмерности q на связном многообразии M замыкаема, множество компактных слоев слоения не более чем счетно (в частности, компактных слоев нет), $G : M \rightarrow N$ — погружение многообразия M в произвольное расслоение $\pi : N \rightarrow B$, являющееся морфизмом слоений. Тогда $\text{rank}\{d(\pi \circ G)\} < q$ в каждой точке из M .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $G : M \rightarrow N$ — морфизм слоений, $\pi : N \rightarrow B$ — проекция, тогда $\pi \circ G : M \rightarrow B$ — постоянное на слоях отображение. Из предыдущего следует, что $\text{rank}\{d(\pi \circ G)\} < q$.

Следствие 8. Пусть структура слоения коразмерности 1 на связном многообразии M замыкаема, множество компактных слоев слоения не более чем счетно (в частности, компактных слоев нет). Тогда все базовые функции на M постоянны. Кроме того, Ω_B^1 вкладывается в $H^1(M)$:

$$0 \rightarrow \Omega_B^1 \rightarrow H^1(M).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из леммы 2 следует, что Ω_B^1 — пространство вещественнозначных базовых форм — вкладывается в $H^1(M)$, ибо $\Omega_B^2 = 0 \forall \omega \in \Omega_B^1 \Rightarrow [\omega] \in H_B^1, \Omega_B^0 \cong R$ (теорема 4) $\Rightarrow \forall \omega_1, \omega_2 \in [\omega] \Rightarrow \omega_1 = \omega_2$. \square

ЛИТЕРАТУРА

1. Вишневский В. В., Широков А. П., Шурыгин В. В. Пространства над алгебрами. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1985.
2. Шурыгин В. В. Расслоения струй как многообразия над алгебрами // Пробл. геометрии. М.: ВИНТИ, 1987. Т. 19. С. 3–22. (Итоги науки и техники).
3. Шурыгин В. В. Многообразия над алгебрами и их применение в геометрии расслоений струй // Успехи мат. наук. 1993. Т. 48, № 2. С. 75–106.

4. Тамура И. Топология слоений. М.: Мир, 1979.
5. Малахальцев М. А. Структуры многообразия над алгеброй дуальных чисел на торе // Тр. геом. семинара. Казань, 1994. С. 47–62.
6. Гайсин Т. И. $R(\epsilon)$ -дифференцируемые функции на торе // Тр. по геометрии и анализу. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2003. С. 221–230.

Статья поступила 27 апреля 2004 г., окончательный вариант — 24 августа 2004 г.

Гайсин Тагир Ильшатович

*НИИ механики и математики им. Н. Г. Чеботарёва Казанского гос. университета,
ул. Университетская, 17, Казань 420008*

Tagir.Gaisin@ksu.ru