

ДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Г. А. Чумаков

Аннотация: Дан качественный анализ системы двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, возникающих при моделировании автоколебаний скорости гетерогенной каталитической реакции. Рассмотрена кинетическая модель, которая учитывает влияние реакционной среды на катализатор. А именно, в дифференциальных уравнениях введена экспоненциальная зависимость с показателем μ константы скорости реакции от покрытия поверхности кислородом. В зависимости от параметра μ исследованы как необходимые, так и достаточные условия существования периодических решений в рассматриваемой динамической системе. Сформулированы достаточные условия стабилизации всех решений к стационарным состояниям и изучено глобальное поведение устойчивых многообразий седловых особых точек.

Ключевые слова: нелинейная динамика, обыкновенное дифференциальное уравнение, периодическое решение, кинетическая модель.

§ 1. Введение

Рассмотрим систему двух нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, которая соответствует простейшей кинетической модели автоколебаний скорости гетерогенной каталитической реакции окисления водорода на металлических катализаторах [1]:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= K_1(1 - x_1 - x_2)^2 - K_{-1}x_1^2 - 2k_{30}e^{-\mu x_2}x_1^2x_2 \equiv f_1(x_1, x_2), \\ \frac{dx_2}{dt} &= K_2(1 - x_1 - x_2)^2 - K_{-2}x_2^2 - k_{30}e^{-\mu x_2}x_1^2x_2 \equiv f_2(x_1, x_2),\end{aligned}\tag{1}$$

в области $G = \{\vec{x} = (x_1, x_2) \in R_+^2 : x_1 + x_2 \leq 1\}$. Здесь x_1, x_2 — поверхностные концентрации адсорбированного водорода и кислорода соответственно, K_1, K_2 пропорциональны константам скоростей адсорбции водорода и кислорода, а K_{-1} и K_{-2} — константы скоростей десорбции этих веществ с поверхности катализатора, k_{30} — константа скорости взаимодействия адсорбированных веществ, μ — неотрицательный действительный параметр, $\vec{f} = (f_1, f_2)$.

Данная работа является продолжением статьи [1], в которой представлена более полная модель и изучены ее общие свойства. Полная математическая модель описывает изменения поверхностных концентраций и состава газовой фазы, а также учитывает происходящие в системе процессы растворения водорода и кислорода в приповерхностный слой катализатора в предположении, что градиенты растворенных веществ малы. В работе [1] показана справедливость принципа квазистационарности, что позволяет исключить быстрые переменные,

не меняя существенно общих свойств модели, и получить асимптотическую модель (1).

Настоящая работа посвящена исследованию кинетической модели (1). Нас интересуют как необходимые, так и достаточные условия существования периодических решений в системе (1) в зависимости от параметра μ . Для получения этих условий мы используем аналитико-топологические методы, которые позволяют доказать наличие или отсутствие предельных циклов в конкретной системе с некоторыми вполне определенными параметрами. Мы сформулируем достаточные условия стабилизации всех решений к стационарным состояниям и отсутствия в области G замкнутых гомоклинических контуров, состоящих из стационарных точек и целых траекторий системы, а также изучим глобальное поведение устойчивых многообразий седловых особых точек.

Изучая общие свойства решений системы (1), мы докажем, что

1) решения с начальными данными из G существуют для всех $t > 0$, положительны и ограничены, а именно если $\vec{x}(0) \in G$, то $\vec{x}(t) \in G$ для всех $t > 0$;

2) в области G существует хотя бы одна особая точка, индекс каждой особой точки не превосходит по модулю 1 и число особых точек с ненулевым индексом всегда нечетное;

3) если параметр μ удовлетворяет одному из неравенств

$$\mu \leq 9, \tag{i}$$

$$\mu \leq 2 + 2K_1/K_2, \tag{ii}$$

$$\mu \leq \frac{k_{30}}{k_{30} - e(\sqrt{K_1 K_{-1}} + K_{-1})}, \tag{iii}$$

то система (1) не имеет периодических решений;

4) если

$$k_{30} \leq e(\sqrt{K_1 K_{-1}} + K_{-1}) \tag{iv}$$

или $K_{-2} = 0$, то система (1) не имеет периодических решений ни при каких значениях параметра μ ;

5) если $K_{-1} \neq 0$ и выполняется неравенство

$$\mu \leq \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + 8K_{-2}/K_{-1}}), \tag{v}$$

то состояние равновесия системы (1) является единственным в G ; если, кроме того, особая точка неустойчива, то система (1) имеет устойчивый предельный цикл;

6) если при $K_{-1} \neq 0$ выполняется неравенство (v) и верно одно из условий (i)–(iv), то состояние равновесия асимптотически устойчиво в целом;

7) если $K_{-1} = 0$, то система (1) имеет периодические решения при некоторых значениях параметра μ .

§ 2. Число состояний равновесия, их индекс и тип

Состояния равновесия системы (1) являются точками пересечения главных изоклин

$$f_1(x_1, x_2) = 0, \tag{2}$$

$$f_2(x_1, x_2) = 0. \tag{3}$$

Для определения всех решений системы (2), (3) введем функцию

$$K_2(x_2) = \frac{K_{-2}x_2^2 + k_{30}e^{-\mu x_2}x_1^2(x_2)x_2}{[1 - x_1(x_2) - x_2]^2}, \quad (4)$$

где $x_1(x_2)$ определяется уравнением (2) в области G и имеет явный вид

$$x_1(x_2) = \frac{\sqrt{K_1}(1 - x_2)}{\sqrt{K_1} + \sqrt{2k_{30}e^{-\mu x_2}x_2 + K_{-1}}}. \quad (5)$$

График функции (5) пересекает границу ∂G области G при $x_2 = 0$ и $x_2 = 1$:

$$x_1(0) = \sqrt{K_1}/(\sqrt{K_1} + \sqrt{K_{-1}}), \quad x_1(1) = 0. \quad (6)$$

Подставляя (6) в (4), получим

$$K_2(x_2) = 0 \quad \text{при } x_2 = 0, \quad (7)$$

$$K_2(x_2) \rightarrow +\infty \quad \text{при } x_2 \rightarrow 1. \quad (8)$$

Так как функция $K_2(x_2)$ непрерывна по x_2 на интервале $(0, 1)$, то из (7), (8) следует, что для любого $K_2 > 0$ в G существует по крайней мере одно состояние равновесия системы (1).

Покажем, что число состояний равновесия системы (1) конечно. Для этого заметим, что в области $G^\varepsilon = \{\vec{x} \in G : 1 - \varepsilon < x_1 + x_2 < 1, \varepsilon > 0\}$ система (2), (3) не имеет решений при достаточно малом ε . Далее, функция $K_2(x_2)$ является аналитической для $(x_1(x_2), x_2) \in G \setminus G^\varepsilon$ и, следовательно, принимает заданное значение K_2 конечное число раз при изменении x_2 в интервале $0 \leq x_2 \leq 1$. Это означает, что число состояний равновесия системы (1) конечно.

Используя теорию индекса Пуанкаре, можно получить сведения о числе особых точек системы (1) в G .

Индекс особой точки. Пусть C — простая замкнутая кривая, v — заданное на ней векторное поле, а d — некоторая прямая на плоскости (x_1, x_2) . Предположим, что существует только конечное число точек M_k ($k = 1, 2, \dots, n$) кривой C , в которых вектор $v(M)$ направлен параллельно прямой d . Предположим, что кривая C обходит точку M в положительном направлении, и пусть p есть число точек M_k , при прохождении через которые вектор $v(M)$ проходит через направление прямой d , двигаясь против часовой стрелки. Пусть, далее, q — число точек M_k , в которых вектор $v(M)$ проходит направление прямой d , двигаясь по часовой стрелке. Точки M_k , в которых вектор $v(M)$ достигает направления d , двигаясь, скажем, по часовой стрелке, а потом начинает двигаться в обратном направлении (или наоборот), мы не будем принимать во внимание. Тогда индекс кривой C равен $(p - q)/2$.

Индексом (или *индексом Пуанкаре*) *изолированной особой точки* O векторного поля v , соответствующего динамической системе, называется индекс любой замкнутой кривой C , содержащей внутри себя точку O , причем такой, что ни внутри C , ни на ней самой нет других особых точек поля v .

Лемма 1. Сумма индексов особых точек системы (1), расположенных в G , равна +1.

Доказательство. При обходе границы ∂G области G в положительном направлении вектор \vec{f} проходит направление прямой $x_1 = 0$ в двух точках: $M_1 = (0, 1)$ и $M_2 = (\sqrt{K_1}/(\sqrt{K_1} + \sqrt{K_{-1}}), 0)$, двигаясь против часовой стрелки, т. е. $p = 2$, $q = 0$. Следовательно, индекс кривой ∂G равен 1. Индекс же замкнутой кривой равен сумме индексов особых точек, расположенных внутри этой кривой. Лемма доказана.

Лемма 2. Пусть ∂G_α — граница области $G_\alpha = \{\vec{x} \in G : x_2 \geq \alpha, 0 \leq \alpha < 1\}$. Индекс кривой ∂G_α равен нулю, если $\alpha \geq \alpha_0$, и равен нулю или единице, если $\alpha < \alpha_0$, где $\alpha_0 = \sqrt{K_2}/(\sqrt{K_2} + \sqrt{K_{-2}})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Система (1) не имеет особых точек в G_{α_0} , так как $f_2(\vec{x}) < 0$ для $\vec{x} \in G_{\alpha_0}$ и на границе ∂G_{α_0} функция $f_2(\vec{x})$ обращается в нуль в единственной точке $(0, \alpha_0)$, в которой $f_1 > 0$. Следовательно, индекс кривой ∂G_α при $\alpha \geq \alpha_0$ равен нулю.

Для $\alpha < \alpha_0$ при обходе ∂G_α в положительном направлении вектор \vec{f} проходит направление прямой $x_1 = 0$ в двух точках: $N_1 = (0, 1)$ и $N_2 = (x_1(\alpha), \alpha)$, причем в N_1 — двигаясь против часовой стрелки, а в N_2 вектор \vec{f} может проходить направление прямой $x_1 = 0$, двигаясь как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке. Следовательно, индекс кривой ∂G_α будет равен либо единице, либо нулю. Лемма доказана.

Сформулируем два утверждения, вытекающие из леммы 2.

Следствие. Система (1) не может иметь в области G особой точки с индексом, по модулю большим единицы.

Принцип нечетности. Если \vec{x}_s — особая точка системы (1) с индексом, равным -1 , то имеется по крайней мере еще две особые точки с индексом $+1$, причем особые точки с индексами, равными $+1$ или -1 , при убывании координаты x_2 чередуются следующим образом: $+1, -1, +1, \dots$. Таким образом, число стационарных точек с ненулевым индексом всегда нечетное, и число особых точек типа узла (фокуса) всегда на единицу больше числа седел.

§ 3. Достаточные условия единственности состояния равновесия

Линеаризуем систему (1) вблизи состояния равновесия $\vec{x}_s = (x_{1S}, x_{2S})$:

$$\dot{\vec{x}} = A(\vec{x} - \vec{x}_s), \tag{9}$$

где элементы a_{ij} матрицы A определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} a_{ij} &= \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\vec{x}=\vec{x}_s} \quad (i, j = 1, 2), \\ a_{11} &= -2K_1(1 - x_{1S} - x_{2S}) - 2K_{-1}x_{1S} - 4k_{30}x_{1S}x_{2S}e^{-\mu x_{2S}}, \\ a_{12} &= -2K_1(1 - x_{1S} - x_{2S}) + 2k_{30}x_{1S}^2(\mu x_{2S} - 1)e^{-\mu x_{2S}}, \\ a_{21} &= -2K_2(1 - x_{1S} - x_{2S}) - 2k_{30}x_{1S}x_{2S}e^{-\mu x_{2S}}, \\ a_{22} &= -2K_2(1 - x_{1S} - x_{2S}) - 2K_{-2}x_{2S} + k_{30}x_{1S}^2(\mu x_{2S} - 1)e^{-\mu x_{2S}}. \end{aligned} \tag{10}$$

Характеристическое уравнение запишем в виде

$$\lambda^2 - \sigma\lambda + \Delta = 0, \tag{11}$$

где

$$\sigma = a_{11} + a_{22}, \quad \Delta = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}. \tag{12}$$

Состояние равновесия с индексом, равным $+1$, будет неустойчивым, если

$$\Delta > 0, \quad \sigma > 0. \tag{13}$$

Выразим K_1 и K_2 из уравнений (2), (3):

$$K_1 = \frac{K_{-1}x_{1S}^2 + 2k_{30}x_{1S}^2x_{2S}e^{-\mu x_{2S}}}{(1-x_{1S}-x_{2S})^2}, \quad K_2 = \frac{K_{-2}x_{2S}^2 + k_{30}x_{1S}^2x_{2S}e^{-\mu x_{2S}}}{(1-x_{1S}-x_{2S})^2}. \quad (14)$$

С учетом (14) после громоздких, но несложных преобразований условия (13) приводятся к следующему виду:

$$x_{1S}\{K_{-1}[2K_{-2}x_{2S} + k_{30}x_{1S}^2(1-x_{2S})(1-\mu x_{2S})e^{-\mu x_{2S}}] + 2k_{30}K_{-2}x_{2S}^2(2+\mu x_{1S}x_{2S}-x_{1S})e^{-\mu x_{2S}}\} > 0, \quad (15)$$

$$2K_{-1}x_{1S}(x_{2S}-1) + 2K_{-2}x_{2S}(x_{1S}-1) + k_{30}x_{1S}e^{-\mu x_{2S}} \times [2x_{2S}(2x_{2S}-x_{1S}-2) + x_{1S}(1-x_{1S}-x_{2S})(\mu x_{2S}-1)] > 0. \quad (16)$$

Теорема 1. При $K_{-1} \neq 0$ и

$$\mu \leq \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + 8K_{-2}/K_{-1}}) \quad (17)$$

состояние равновесия системы (1) единственно в G и индекс его равен +1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем сначала, что если условие (15) выполняется для всех $\vec{x} \in G$, то в области G существует единственная особая точка и ее индекс равен +1. Предположим обратное, что в G имеется $m > 1$ особых точек. Тогда сумма индексов этих особых точек равна $+m$, так как индекс особой точки \vec{x}_s векторного поля \vec{f} определяется равенством

$$\text{ind}(\vec{x}_s, \vec{f}) = \text{sign } \Delta(\vec{x}_s),$$

если $\Delta(\vec{x}_s) \neq 0$ [2]. С другой стороны, из леммы 1 следует, что сумма индексов особых точек системы (1), расположенных в G , равна +1. Мы пришли к противоречию. Таким образом, утверждение о единственности особой точки при выполнении (15) доказано.

Покажем теперь, что при выполнении неравенства (17) условие (15) имеет место для всех $\vec{x}_s \in G$. При $\mu < 1$ это очевидно. Далее, (15) выполняется всюду в G , если

$$(1-\mu x_2)[K_{-1}x_1^2(1-x_2) - 2K_{-2}x_2^2x_1] + 4K_{-2}x_2^2 \geq 0 \quad (18)$$

для всех $\vec{x} \in G$. Нетрудно видеть, что при $x_2 \leq 1/\mu$ условие (15) выполнено для всех $x_1 \in [0, 1]$. Следовательно, в (18) можно рассматривать только точки, для которых $x_2 > 1/\mu$. Поэтому неравенство (18) выполняется, если

$$K_{-1}x_1(1-x_2) \leq 2K_{-2}x_2^2. \quad (19)$$

Поскольку $0 \leq x_1 \leq 1$, получим, что если

$$\psi(x_2) \equiv 2K_{-2}x_2^2 - K_{-1}(1-x_2) \geq 0,$$

то неравенство (19) будет выполнено. Функция $\psi(x_2)$ монотонно возрастающая на интервале $[1/\mu, 1]$. Следовательно, если $\psi(1/\mu) \geq 0$, то (19) будет справедливо. Корни уравнения $\psi(1/\mu) = 0$ имеют вид

$$\left(\frac{1}{\mu}\right)_1 = \frac{-K_{-1} - \sqrt{K_{-1}^2 + 8K_{-1}K_{-2}}}{4K_{-2}}, \quad \left(\frac{1}{\mu}\right)_2 = \frac{2K_{-1}}{K_{-1} + \sqrt{K_{-1}^2 + 8K_{-1}K_{-2}}}.$$

Следовательно, если

$$\mu \leq \frac{K_{-1} + \sqrt{K_{-1}^2 + 8K_{-1}K_{-2}}}{2K_{-1}},$$

то неравенство (19) будет выполнено. Теорема 1 доказана.

**§ 4. Признаки существования
и отсутствия замкнутых траекторий**

Напомним необходимые определения и результаты из [3, 4], которые будем использовать в дальнейшем для получения аналитических критериев существования устойчивых предельных циклов системы (1).

Понятие о предельном цикле. Мы хотим установить, имеет ли рассматриваемая система обыкновенных дифференциальных уравнений периодические решения (режимы автоколебаний). Прежде чем определить предельный цикл, мы познакомимся еще с двумя понятиями. Точка p называется ω -предельной точкой для решения $\vec{x}(t)$, если существует последовательность $t_0 < t_1 < \dots$ такая, что $t_n \rightarrow \infty$ и $\vec{x}(t_n) \rightarrow p$ при $n \rightarrow \infty$. Соответственно точка q называется α -предельной точкой для $\vec{x}(t)$, если существует последовательность $t_0 > t_1 > \dots$ такая, что $t_n \rightarrow -\infty$ и $\vec{x}(t_n) \rightarrow q$ при $n \rightarrow \infty$. Замкнутая траектория называется предельным циклом, если она является ω -предельным или α -предельным множеством для некоторой не совпадающей с ней траектории. Образно говоря, предельный цикл характеризуется тем, что существует траектория, которая «наматывается» на него при $t \rightarrow +\infty$ или $t \rightarrow -\infty$.

Предельный цикл называется *изолированным*, если в некоторой его окрестности нет других замкнутых траекторий. Изолированный предельный цикл называют: *устойчивым*, если он является ω -предельным множеством для любой траектории $x(t, x_0)$ с достаточно близким к циклу начальным значением x_0 ; *неустойчивым*, если для всех таких x_0 цикл является α -предельным множеством траектории $x(t, x_0)$; *полуустойчивым*, если как угодно близко к нему существуют точки x_1 и x_2 такие, что цикл является α -предельным множеством для $x(t, x_1)$ и ω -предельным для $x(t, x_2)$.

Одним из первых вопросов, встающих при изучении проблемы существования или отсутствия замкнутых траекторий, является вопрос о том, существуют ли целые области, заполненные замкнутыми траекториями, или замкнутые траектории изолированы, т. е. являются предельными циклами. Имеет место следующая

Лемма 3 [3]. *Если L_0 — замкнутая траектория динамической системы аналитического класса, то либо она изолированная, либо все траектории в ее окрестности замкнуты.*

Так как система (1) принадлежит аналитическому классу, то на фазовой плоскости (x_1, x_2) системы (1) не может существовать замкнутой траектории, в любой окрестности которой есть как замкнутые, так и незамкнутые траектории. В частности, не может существовать бесчисленного множества предельных циклов, накапливающихся к замкнутой траектории (с одной или обеих ее сторон). Также не может существовать такой замкнутой траектории, с внешней (внутренней) стороны которой все достаточно близкие траектории замкнуты, а с внутренней (соответственно внешней) стороны все достаточно близкие траектории незамкнуты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Состояние равновесия \vec{x}_s системы (1) называется *простым*, если точка \vec{x}_s является точкой пересечения изоклин (2), (3), т. е. общей точкой, в которой кривые (2), (3) не имеют особенностей и касательные к этим кривым различны.

На основании леммы можно показать, что если у динамической системы аналитического класса существует кольцеобразная область, заполненная за-

мкнутыми траекториями, то граница этой области состоит из траекторий, стремящихся к состояниям равновесия, и из состояний равновесия. Если все состояния равновесия рассматриваемой динамической системы простые, то траектории, входящие в границу кольцеобразной области и отличные от состояний равновесия, могут быть только сепаратрисами седел.

Следовательно, если система (1) имеет единственное простое состояние равновесия, то в области G может существовать лишь конечное число замкнутых траекторий.

Цикл однократного пересечения. Будем говорить, что простая замкнутая кривая C , лежащая в области G (эта кривая может и не быть гладкой), есть *цикл однократного пересечения* для траекторий системы (1), если а) на кривой C не лежит ни одного состояния равновесия; б) у всякой траектории, проходящей при $t = t_0$ через какую-нибудь точку кривой C , точки, соответствующие достаточно близким к t_0 значениям $t > t_0$ ($t < t_0$), лежат внутри C , а точки, соответствующие достаточно близким к t_0 значениям $t < t_0$ ($t > t_0$), — вне цикла. Другими словами, если мы обозначим через D_0 область, ограниченную циклом однократного пересечения C , то любая точка $\vec{x}_0 \in C$ является точкой входа (выхода) для множества D_0 по отношению к системе (1).

Рассмотрение циклов однократного пересечения, а также индексов состояния равновесия позволяет в ряде случаев сделать определенное заключение относительно существования замкнутых траекторий или предельных циклов. Приведем один из признаков существования устойчивых предельных циклов, основанный на рассмотрении циклов однократного пересечения.

Теорема 2 [3]. Пусть C — цикл однократного пересечения, а D_0 — ограниченная им область, содержащаяся в области определения правых частей рассматриваемой динамической системы.

Если выполняются следующие условия:

- 1) все траектории, пересекающие C , при возрастании t входят в D_0 ;
- 2) в области D_0 имеется единственное состояние равновесия, являющееся неустойчивым узлом или фокусом;
- 3) в области D_0 имеется лишь конечное число замкнутых траекторий системы,

то число расположенных в D_0 устойчивых предельных циклов на единицу больше числа неустойчивых. Следовательно, существует по крайней мере один устойчивый предельный цикл.

Используем теорему 2 для получения аналитических критериев существования устойчивых предельных циклов системы (1).

Теорема 3. Пусть выполняется условие (17) единственности состояния равновесия и для особой точки выполняется условие (16). Тогда система (1) имеет устойчивый предельный цикл в области G .

Доказательство. Проверим выполнение условий 1–3 теоремы 2. Условие 1 удовлетворяется, так как в качестве цикла однократного пересечения можно взять границу ∂G области G . Условие 2 также выполнено, так как из теоремы 1 следует, что при выполнении неравенства (17) положение равновесия является единственным в G и индекс его равен +1. Далее, если для этой особой точки справедливо неравенство (16), то она является либо неустойчивым узлом, либо неустойчивым фокусом. Условие 3 следует из леммы 3, как уже

отмечалось выше. Таким образом, все условия теоремы 2 выполняются. Следовательно, в G существует устойчивый предельный цикл, что и требовалось доказать.

Приведем теперь несколько признаков отсутствия замкнутых траекторий, вытекающих из свойств индексов Пуанкаре. Сформулируем их в виде теоремы.

Теорема 4 [4]. Пусть D_0 — односвязная область, принадлежащая области определения динамической системы. Тогда

1. Если в области D_0 нет состояний равновесия системы, то нет и замкнутых траекторий, целиком лежащих в D_0 .

2. Если в области D_0 имеется конечное число состояний равновесия, причем для каждого состояния равновесия O с положительным индексом существует стремящаяся к O траектория, имеющая точки вне D_0 , то в D_0 нет замкнутых траекторий.

Приведем еще один критерий, на основании которого можно судить об отсутствии замкнутых траекторий и замкнутых контуров, состоящих из траекторий.

Критерий Дюлака. Пусть D_0 — односвязная область, входящая в область определения системы (1). Если существует определенная в D_0 функция $V(\vec{x})$ первого класса такая, что выражение

$$d(\vec{x}) = \frac{\partial}{\partial x_1}(Bf_1) + \frac{\partial}{\partial x_2}(Bf_2) \tag{20}$$

знакопостоянно, то в области D_0 не существует простых замкнутых кривых, состоящих из траекторий системы (1).

На основе критерия Дюлака докажем следующую теорему.

Теорема 5. Если выполняется неравенство

$$\mu \leq 9 \tag{21}$$

или

$$\mu < 2 \left(1 + \frac{K_1}{K_2} \right), \tag{22}$$

то в области G не существует простых замкнутых кривых, состоящих из траекторий системы (1).

Доказательство. Пусть $V(\vec{x}) = 1$. Тогда выражение (20) для системы (1) будет иметь вид

$$d(\vec{x}) = -2[(K_1 + K_2)(1 - x_1 - x_2) + K_{-1}x_1 + K_{-2}x_2] - k_{30}e^{-\mu x_2}x_2[x_1 + x_2(4 - \mu x_1)]$$

и будет знакопостоянно в G , если выполняется условие $x_1 + x_2(4 - \mu x_1) \geq 0$ или

$$\min_{x_1, x_2 \in G} \left(\frac{1}{x_2} + \frac{4}{x_1} \right) \geq \mu.$$

В области G справедливо неравенство $x_1 + x_2 \leq 1$, поэтому если функция

$$h(x_2) \equiv \frac{1}{x_2} + \frac{4}{1 - x_2}$$

удовлетворяет условию $h(x_2) \geq \mu$ для всех $x_2 \in [0, 1]$, то требуемое неравенство будет выполнено для всех $\vec{x} \in G$. В точках экстремума $h'(x_2) = 0$ и, следовательно, $3x_2^2 + 2x_2 - 1 = 0$, откуда получаем координаты этих точек $(x_2)_1 = -1$ и

$(x_2)_2 = 1/3$. Таким образом, минимум функции $h(x_2)$ достигается при $x_2 = 1/3$ и равен $h(1/3) = 9$. Следовательно, при $\mu \leq 9$ выражение $d(\vec{x})$ будет знакопостоянным в G .

Далее, возьмем $B(\vec{x}) = e^{\mu x_2}$. Тогда выражение (20) примет вид

$$d(\vec{x}) = e^{\mu x_2} [\mu K_2(1 - x_1 - x_2)^2 - 2(K_1 + K_2)(1 - x_1 - x_2) - 2K_{-1}x_1 - \mu K_{-1}x_2^2 - 2K_{-2}x_2] - k_{30}x_1(x_1 + 4x_2)$$

и будет знакопостоянно в области G , если выполнено условие (22). Теорема доказана.

В дальнейшем нам потребуется следующее определение.

Ретракция [5]. Если U — топологическое пространство и V — подмножество в U , то непрерывное отображение $\pi : U \rightarrow V$, определенное на всем U , называется *ретракцией* U на V , если сужение π на V является тождественным отображением, т. е. $\pi(u) \in V$ для всех $u \in U$ и $\pi(v) = v$ для всех $v \in V$. Если ретракция U на V существует, то V называется *ретрактом*.

Лемма 4. Пусть \vec{x}^0 — внутренняя точка области G , т. е. $\vec{x}^0 \in G^0 = G \setminus \partial G$, и $K = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 < x_1^0, x_2 < x_2^0\}$ — открытое подмножество G с границей ∂K . Обозначим через K_{se} множество точек строгого выхода из области K . Пусть $S = \partial G \cap \partial K$. Через ∂S обозначим границу множества S , а именно $\partial S = \{(x_1^0, 0), (0, x_2^0)\}$. Пусть $f_1(\vec{x}) > 0$ и $f_2(\vec{x}) > 0$ в области K , причем $\Gamma_1 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 = x_1^0, x_2 < x_2^0\}$ и $\Gamma_2 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 < x_1^0, x_2 = x_2^0\}$ состоят из точек строгого выхода из области K , т. е. $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset K_{se}$. Тогда существует по крайней мере одна точка $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, для которой график решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ либо лежит в области K для всех $t > 0$ и $\lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{x}(t) = \vec{x}^0$, либо пересекает впервые $\partial K \cap G$ в точке \vec{x}^0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что эта лемма не верна. Тогда для $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$ существует такое число $t_1 = t_1(\vec{x}_0)$, что $t_1 > 0$, решение $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ определено при $0 \leq t \leq t_1$ и $\vec{x}(t) \in K$ при $0 < t < t_1$, а $\vec{x}(t_1) \in K_{se}$. Определим отображение $\pi_0 : S \rightarrow \overline{K_{se}} \setminus \vec{x}^0$ следующим образом: $\pi_0(\vec{x}_0) = \vec{x}(t_1)$, если $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, и $\pi_0(\vec{x}_0) = \vec{x}_0$, если $\vec{x}_0 \in \partial S$. Поскольку решение системы (1) непрерывно зависит от начальных условий и множество K_e точек выхода из области K совпадает с K_{se} , отображение π_0 непрерывно. Чтобы доказать это, рассмотрим решение $\vec{x}(t) = \eta(t, \vec{x}_0)$ системы (1), для которого $\eta(0, \vec{x}_0) = \vec{x}_0$. Функция $\eta(t, \vec{x}_0)$ непрерывна. Предположим, что $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$ и точка \vec{y}_0 близка к \vec{x}_0 . Тогда $\eta(t, \vec{y}_0)$ существует на отрезке $[0, t_1(\vec{x}_0) + \varepsilon]$ при некотором $\varepsilon > 0$ и $\eta(t, \vec{y}_0) \in K$ при $0 < t < t_1(\vec{x}_0) - \varepsilon$, причем $\eta(t, \vec{y}_0) \notin \overline{K}$, если $t = t_1(\vec{x}_0) + \varepsilon$. Значит, $|t_1(\vec{y}_0) - t_1(\vec{x}_0)| < \varepsilon$, и поэтому $\eta(t_1(\vec{y}_0), \vec{x}_0)$ непрерывно зависит от \vec{y}_0 , т. е. π_0 непрерывно по \vec{x}_0 . Аналогичное рассуждение можно провести в случае, когда $\vec{x} \in \partial S$.

Определим отображение $\pi : \overline{K_{se}} \setminus \vec{x}_0 \rightarrow \partial S$ следующим образом:

$$\pi(\vec{x}) = \begin{cases} (x_1^0, 0), & \text{если } \vec{x} \in \Gamma_1 \setminus \vec{x}_0, \\ (0, x_2^0), & \text{если } \vec{x} \in \Gamma_2 \setminus \vec{x}_0. \end{cases}$$

Поскольку отображение π непрерывно, суперпозиция отображений $\pi \circ \pi_0$ является ретракцией S на ∂S . С другой стороны, S гомеоморфно одномерному шару радиуса r , и, значит, ∂S не является ретрактом S . Пришли к противоречию. Следовательно, существует по крайней мере одна точка $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, для которой

график решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ либо пересекает впервые $\partial K \cap G$ в точке \vec{x}^0 , либо лежит в K для всех $t > 0$. Поскольку $f_1(\vec{x}) > 0$ и $f_2(\vec{x}) > 0$ в области K , во втором случае компоненты $x_i(t)$ ($i = 1, 2$) решения $\vec{x}(t)$ являются монотонно возрастающими ограниченными функциями. Следовательно, существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} \vec{x}(t) = \vec{x}^1$. Покажем, что имеет место равенство $\vec{x}^1 = \vec{x}^0$. Действительно, \vec{x}^1 является состоянием равновесия системы (1) [4], а так как состояние равновесия в \bar{K} может находиться только в точке \vec{x}^0 , то $\vec{x}^1 = \vec{x}^0$ и \vec{x}^0 является особой точкой системы (1). Лемма 4 доказана.

Иногда вид главной изоклины (5) позволяет непосредственно сделать заключение о глобальной динамике системы (1). Мы укажем один такой случай.

Теорема 6. Пусть функция $x_1(x_2)$ определяется уравнением главной изоклины (2), имеет явный вид (5) и удовлетворяет условию $\frac{d}{dx_2}[x_1(x_2)] < 0$ для всех $x_2 \in [0, 1]$. Тогда в области G нет замкнутых траекторий системы (1) и каждое состояние равновесия имеет по крайней мере одномерное устойчивое многообразие, которое приходит в стационарную точку с границы области G .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть \vec{x}_s — произвольное состояние равновесия системы (1). Рассмотрим область $K = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 < x_{1S}, x_2 < x_{2S}\}$. Опишем множество K_{se} точек строгого выхода из K . Поскольку изоклина (2) является графиком монотонно убывающей функции переменной x_2 , то $f_1(\vec{x}) > 0$ для $\vec{x} \in \bar{K} \setminus \vec{x}_s$. Следовательно, множество $\Gamma_1 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 = x_{1S}, x_2 < x_{2S}\}$ состоит из точек строгого выхода из K , т. е. $\Gamma_1 \subset K_{se}$. Далее, в силу монотонности f_1 и f_2 как функций x_1 на множестве $\Gamma_2 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 < x_{1S}, x_2 = x_{2S}\}$ справедливо неравенство $f_2(\vec{x}) > 0$. Значит, $\Gamma_2 \subset K_{se}$. Пусть $S = \partial G \cap \partial K$. Через ∂S обозначим границу множества S . Очевидно, что $\partial S = \{(x_{1S}, 0), (0, x_{2S})\}$ и на ∂S справедливы неравенства $f_1(\vec{x}) > 0$ и $f_2(\vec{x}) > 0$. Теперь, проводя те же рассуждения, что при доказательстве леммы 4, можно показать, что существует точка $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, для которой график решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ лежит в области K для всех $t > 0$ и $\lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{x}(t) = \vec{x}_s$. Отсюда и из теоремы 4 следует, что в области G нет замкнутых траекторий системы (1) и в каждую стационарную точку приходит по крайней мере две траектории с границы области G , а именно: одна с границы $x_1 = 0$, а другая с границы $x_1 + x_2 = 1$. Теорема доказана.

Применим теорему 6 для выделения области параметров, при которых система (1) не имеет замкнутых траекторий.

Теорема 7. Пусть выполняется одно из условий

$$k_{30} \leq e(\sqrt{K_1 K_{-1}} + K_{-1}) \tag{23}$$

или

$$\mu \leq \frac{k_{30}}{k_{30} - e(\sqrt{K_1 K_{-1}} + K_{-1})}. \tag{24}$$

Тогда система (1) не имеет периодических решений.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим производную от функции $x_1(x_2)$, определенной в (5):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_2}[x_1(x_2)] = & -\frac{\sqrt{K_1}}{\sqrt{K_1} + \sqrt{K_{-1}} + 2k_{30}e^{-\mu x_2} x_2} \\ & - \frac{\sqrt{K_1}(1-x_2)}{(\sqrt{K_1} + \sqrt{K_{-1}} + 2k_{30}e^{-\mu x_2} x_2)^2} \cdot \frac{k_{30}(1-\mu x_2)e^{-\mu x_2}}{\sqrt{K_{-1}} + 2k_{30}e^{-\mu x_2} x_2}. \end{aligned}$$

Если потребовать, чтобы неравенство

$$\sqrt{K_1(K_{-1} + 2k_{30}e^{-\mu x_2 x_2})} + K_{-1} + k_{30}e^{-\mu x_2} [1 + x_2 - \mu x_2(1 - x_2)] > 0 \quad (25)$$

было справедливо для всех $x_2 \in [0, 1]$, то из теоремы 6 будет следовать, что в области G нет замкнутых траекторий системы (1).

Нетрудно видеть, что при $\mu \leq 4$ или $x_2 \leq 1/\mu$ неравенство (25) выполнено. Следовательно, (25) выполняется для всех $x_2 \in [0, 1]$, если имеет место неравенство

$$\sqrt{K_1(K_{-1} + 2k_{30}e^{-\mu})} + K_{-1} + 2k_{30}e^{-\mu} - k_{30}e^{-\mu x_2} \mu x_2(1 - x_2) > 0.$$

Рассмотрим функцию $\varphi(x_2) = e^{-\mu x_2} x_2(1 - x_2)$. Отметим, что на интервале $[1/\mu, 1]$ она монотонна. Действительно, в точках экстремума

$$\varphi'(x_2) = (\mu x_2^2 - (\mu + 2)x_2 + 1) e^{-\mu x_2} = 0,$$

откуда получаем координаты этих точек:

$$x_2^{(1)} = \frac{\mu + 2 + \sqrt{\mu^2 + 4}}{2\mu}, \quad x_2^{(2)} = \frac{2}{\mu + 2 + \sqrt{\mu^2 + 4}}.$$

Поскольку $x_2^{(2)} < 1/(\mu + 1)$ и $x_2^{(1)} > 1 + 1/\mu$, то $\varphi(x_2)$ на интервале $[1/\mu, 1]$ является монотонно убывающей функцией и, следовательно, принимает максимальное значение при $x_2 = 1/\mu$. Тогда в точке максимума имеем $\mu \cdot \varphi(1/\mu) = (\mu - 1)/(\mu e)$. Таким образом, неравенство (25) выполняется для всех $x_2 \in [0, 1]$, если

$$\sqrt{K_1(K_{-1} + 2k_{30}e^{-\mu})} + K_{-1} + 2k_{30}e^{-\mu} > \frac{k_{30}}{e} \left(1 - \frac{1}{\mu}\right). \quad (26)$$

Отсюда следует, что если выполнено одно из условий (23) или (24), то неравенство (26) будет выполнено. Теорема доказана.

Асимптотическая устойчивость в целом. Далее будем предполагать, что точка $\vec{x}_s \in G$ является положением равновесия и $f(\vec{x}_s) = 0$.

Пусть \vec{x}_s — локально асимптотически устойчивое положение равновесия системы (1). Областью притяжения точки $\vec{x} = \vec{x}_s$ называется множество точек $\vec{x}_0 \in G$ таких, что решение системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ существует при всех $t \geq 0$ и $\vec{x}(t) \rightarrow \vec{x}_s$ при $t \rightarrow +\infty$.

Положение равновесия \vec{x}_s называется *асимптотически устойчивым в целом*, если всякое решение $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) \in G$ может быть продолжено на полупрямую $t \geq 0$ и $|\vec{x}(t) - \vec{x}_s| \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. В отличие от понятия асимптотической устойчивости здесь не предполагается, что начальное значение $\vec{x}(0)$ близко к решению \vec{x}_s .

Теорема 8. Пусть имеет место неравенство (17), и пусть выполняется одно из условий (21)–(24). Тогда положение равновесия \vec{x}_s системы (1) является асимптотически устойчивым в целом.

Доказательство. Поскольку выполняется условие (17), особая точка \vec{x}_s единственна в G . Нетрудно видеть, что если выполняются условия теоремы 7, то \vec{x}_s — локально асимптотически устойчивое решение системы (1). Так как область притяжения точки \vec{x}_s является открытым множеством, то существует такое $\varepsilon > 0$, что шар $U_\varepsilon = \{\vec{x} \in G : |\vec{x} - \vec{x}_s| \leq \varepsilon\}$ лежит в области притяжения. Обозначим через G^* открытое множество $G^0 \setminus U_\varepsilon$, которое получается из G^0 после удаления шара U_ε . Тогда $\vec{f}'(\vec{x}) \neq 0$ на G^* .

Предположим, что теорема 8 неверна. Тогда существует точка $\vec{x}_0 \in G^*$, принадлежащая границе области притяжения точки \vec{x}_s . Пусть $\vec{x} = \vec{x}_0(t)$ — решение системы (1), удовлетворяющее условию $\vec{x}_0(0) = \vec{x}_0$. Тогда выполняется неравенство $r(\vec{x}_0(t), \vec{x}_s) > \varepsilon$, где $r(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ — расстояние между точками \vec{x}_1, \vec{x}_2 . Следовательно, можно применить теорему Пуанкаре — Бендиксона [5], из которой следует, что ω -предельное множество траектории $\vec{x}(t)$ состоит из точек периодического решения системы (1). С другой стороны, из теорем 5, 6 вытекает, что если выполняются неравенства (21)–(24), то система (1) не имеет периодических решений. Полученное противоречие завершает доказательство теоремы.

§ 5. Свойства модели с необратимыми стадиями

Для нас также будут интересными частные случаи системы (1), в которых не учитываются обратные реакции, т. е. $K_{-1} = 0$ или $K_{-2} = 0$. Мы докажем, что в случае $K_{-2} = 0$ в фазовом пространстве не существует замкнутых траекторий, а если $K_{-1} = 0$ и система (1) имеет состояние равновесия внутри области G , то при некоторых условиях существует устойчивый предельный цикл.

Рассмотрим случай $K_{-1} = 0$, т. е. стадия адсорбции водорода необратима. В этом случае $\vec{x} = (1, 0)$ является состоянием равновесия системы (1). Для $0 < \alpha < 1$ рассмотрим множество $g_\alpha = \{\vec{x} \in G^0 : x_2 > \alpha\}$ с границей ∂g_α . Так же, как в лемме 2, можно показать, что если на ∂g_α нет особых точек системы (1), то индекс кривой ∂g_α равен нулю или единице. Поскольку неравенство (15) имеет место для всех $\vec{x} \in G$, то индекс любой особой точки, расположенной в области G , равен +1. Отсюда и из того, что индекс кривой ∂g_α не превышает единицы, следует, что если в области G существует особая точка системы (1), то она единственна в G и индекс ее равен +1.

Теорема 9. *Предположим, что $K_{-1} = 0$.*

1. *Если $\vec{x}_s = (1, 0)$ — единственное состояние равновесия системы (1) в G , то особая точка \vec{x}_s является асимптотически устойчивой в целом.*

2. *Пусть \vec{x}_s — состояние равновесия системы (1), лежащее в открытой области G^0 , для которого выполняется условие (16). Тогда в G^0 существует по крайней мере один устойчивый предельный цикл.*

Доказательство. Посмотрим, как располагаются изоклины (2) и (3) в области G . Кривая (2) в данном случае определяется равенством

$$x_1 = \frac{\sqrt{K_1}(1 - x_2)}{\sqrt{K_1} + \sqrt{2k_{30}e^{-\mu x_2}x_2}}. \tag{27}$$

Уравнение главной изоклины (3) запишем в виде

$$x_1 = q(x_2), \tag{28}$$

где функция $q(x_2)$ принадлежит аналитическому классу на множестве $x_2 \in [0, \alpha_0]$ при $\alpha_0 = \sqrt{K_2}/(\sqrt{K_2} + \sqrt{K_{-2}})$. Выполнены следующие соотношения: $q(0) = 1, q(\alpha_0) = 0$ и $0 < q(x_2) < 1 - x_2$ при $x_2 \in (0, \alpha_0)$.

Пусть $\vec{x}_s = (1, 0)$ является единственной особой точкой системы (1) в G , тогда главные изоклины (27) и (28) разделяют область G^0 на три области: $G_1 = \{\vec{x} \in G^0 : f_1(\vec{x}) < 0, f_2(\vec{x}) < 0\}$, $G_2 = \{\vec{x} \in G^0 : f_1(\vec{x}) > 0, f_2(\vec{x}) < 0\}$ и $G_3 = \{\vec{x} \in G^0 : f_1(\vec{x}) > 0, f_2(\vec{x}) > 0\}$. Следовательно, кривая (28) в области G^0 является кривой без контакта для динамической системы (1). Поэтому ни одна траектория системы (1) не выходит из области $G_4 = \{\vec{x} \in G^0 : f_2(\vec{x}) < 0\}$.

Нетрудно видеть, что в области G_4 отрезки $x_2 = c$ являются отрезками без контакта с траекториями системы (1). Отсюда следует, что (1) не имеет целых траекторий в области G_4 и, в частности, предельных циклов. В самом деле, траектория, проходящая при некотором $t = t_0$ через произвольную точку отрезка $x_2 = c$ в области G_4 , не может возвращаться с ростом t на этот отрезок, а может только приближаться к точке $\vec{x}_s = (1, 0)$. Таким образом, все решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными из области G_4 стремятся к состоянию равновесия \vec{x}_s , причем компонента $x_2(t)$ монотонно стремится к нулю.

Покажем теперь, что и в области G нет целых траекторий системы (1). Предположим, что такая траектория L существует. Тогда существует точка $\vec{y} = (y_1, y_2) \in L$ такая, что $\vec{y} \in \overline{G_3} \cap G^0$. Рассмотрим множество $K = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 < y_1, x_2 < y_2\}$. Поскольку в области $D = K \cap G_3$ функции f_1 и f_2 положительны, множество D_{se} точек строгого выхода из области D по отношению к системе (1) состоит из части границы ∂D области D , лежащей в области G^0 , т. е. $D_{se} = \partial D \cap G^0$. Пусть $S = \partial D \cap \partial G$. Через ∂S обозначим границу множества S , тогда $\partial S = \{(y_1, 0), (0, y_2)\}$. Далее, в область D траектории системы (1) могут войти только через множество $S \setminus \partial S$. На границе ∂S имеем $f_1(\vec{x}) > 0, f_2(\vec{x}) > 0$. Теперь, проводя те же рассуждения, что и при доказательстве леммы 4, можно показать, что существует точка $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, для которой график решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ пересекает впервые $\partial D \cap G^0$ в точке \vec{y} . Существование такого решения противоречит тому, что траектория L при $t \rightarrow -\infty$ содержится в G^0 . Таким образом, утверждение, что в области G не может существовать целой траектории, доказано. Отсюда следует, в частности, что в области G не может существовать гомоклинического контура, состоящего из состояния равновесия $\vec{x}_s = (1, 0)$ и траектории, стремящейся к \vec{x}_s как при $t \rightarrow -\infty$, так и при $t \rightarrow +\infty$.

Чтобы закончить доказательство, рассмотрим произвольное решение $\vec{x}(t)$ системы (1) в области G . Множество ω -предельных точек траектории $\vec{x}(t)$ замкнуто, связно и состоит из целых траекторий [4]. Поскольку в области G нет целых траекторий системы (1) и существует единственная особая точка на границе ∂G , множество ω -предельных точек траектории $\vec{x}(t)$ состоит из одной особой точки $\vec{x}_s = (1, 0)$. Таким образом, первая часть теоремы 9 доказана.

Предположим теперь, что кроме граничной точки $(1, 0)$ существует еще особая точка \vec{x}_s системы (1) внутри области G , т. е. $\vec{x}_s \in G^0$. Из проведенных выше рассуждений следует, что \vec{x}_s является единственной особой точкой в области G^0 и ее индекс равен +1. Построим цикл однократного пересечения, содержащий внутри себя \vec{x}_s . Для этого возьмем точку \vec{y} на кривой (27) такую, что $y_1 > x_{1S}, y_2 < x_{2S}$ и $0 < y_2 < 1/\mu$, и проведем лучи $\gamma_1 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 = y_1, x_2 \geq y_2\}$ и $\gamma_2 = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 \leq y_1, x_2 = y_2\}$. Кроме того, точку \vec{y} выберем так, чтобы луч γ_1 не пересекал больше кривой (27). Это возможно, так как функция (27) монотонно убывает при возрастании x_2 от 0 до $1/\mu$. Граница области, ограниченной лучами γ_1, γ_2 и прямыми $x_1 = 0, x_1 + x_2 = 1$, является циклом однократного пересечения. Поскольку все условия теоремы 2 выполняются, в области G существует предельный цикл. Теорема 9 доказана.

Следствие. Пусть $K_{-1} = 0$ и $K_1 \geq 2K_2$. Тогда система (1) имеет единственную особую точку $\vec{x}_s = (1, 0)$, которая асимптотически устойчива в целом.

Доказательство. Поскольку в области G при $x_2 \neq 0$ выполняется неравенство $\dot{x}_1 - 2\dot{x}_2 > 0$, особая точка \vec{x}_s единственна в G . Из теоремы 9 следует, что она асимптотически устойчива в целом, что и требовалось доказать.

Пусть теперь $K_{-2} = 0$, т. е. стадия адсорбции кислорода необратима. Тогда точка $\vec{x} = (0, 1)$ является состоянием равновесия системы (1). Запишем уравнения главных изоклин (2), (3) следующим образом:

$$K_2(1 - x_1 - x_2)^2 = k_{30}e^{-\mu x_2}x_1^2x_2, \quad (K_1 - 2K_2)(1 - x_1 - x_2)^2 = K_{-1}x_1^2. \quad (29)$$

Отсюда следует, что при $K_1 \leq 2K_2$ система (29) имеет единственное решение $\vec{x} = (0, 1)$ в G .

Лемма 5. Пусть $K_{-2} = 0$ и $K_1 > 2K_2$. Тогда все состояния равновесия системы (1) из области G , которые лежат выше прямой $x_2 = 1/\mu$, имеют индекс, равный -1 , а состояния равновесия, расположенные ниже этой прямой, имеют индекс, равный $+1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для вычисления индекса особой точки будем использовать следующий критерий [4]. Пусть \vec{x}_s — положение равновесия системы (1) и $A(x_s)$ — матрица линеаризованной в окрестности x_s системы (9). Если $\det A(\vec{x}_s) \neq 0$, то особая точка \vec{x}_s изолирована и ее индекс определяется равенством

$$\text{ind}(\vec{x}_s, \vec{f}) = \text{sign det } A(\vec{x}_s). \quad (30)$$

Утверждение леммы вытекает из (15) и критерия (30), так как в рассматриваемом случае для особых точек системы (1), лежащих в области G , имеет место равенство

$$\text{sign det } A(\vec{x}_s) = \text{sign}(1 - \mu x_{2S}). \quad (31)$$

Лемма доказана.

Теорема 10. Пусть $K_{-2} = 0$. Тогда в области G нет замкнутых траекторий системы (1). Кроме того, если $\vec{x}_s = (0, 1)$ — единственное состояние равновесия системы (1) в G , то особая точка асимптотически устойчива в целом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем сначала, что если выполняются условия теоремы, то в G^0 не существует замкнутых траекторий. Будем рассматривать значения $\mu > 9$, так как в противном случае в силу теоремы 5 система (1) не имеет периодических решений.

Допустим, в G^0 существует замкнутая траектория L . Поскольку индекс любой замкнутой траектории динамической системы равен $+1$, то сумма индексов особых точек, лежащих внутри L , равна $+1$. Так как при $K_1 \leq 2K_2$ система (1) не имеет особых точек, а следовательно, и замкнутых траекторий в G^0 , достаточно рассмотреть случай $K_1 > 2K_2$.

Учитывая, что $\vec{x} = (0, 1)$ является решением системы (29), исключим неизвестное x_1 , так что

$$e^{-\mu x_2}x_2 = \frac{K_2K_{-1}}{(K_1 - 2K_2)k_{30}}. \quad (32)$$

Посмотрим, что происходит с решениями уравнения (32) при изменении параметра u , где

$$u = \frac{K_2K_{-1}\mu e}{(K_1 - 2K_2)k_{30}}.$$

(а) При $u > 1$ уравнение (32) не имеет решений.

(б) Если $u = 1$, то существует единственное решение $x_2 = 1/\mu$. Ему соответствует состояние равновесия системы (1) в области G^0 , которое исчезает

при сколь угодно малом увеличении параметра u . По теореме Брауэра [6] это возможно, если и только если индекс этого состояния равновесия равен нулю.

(в) При $0 < u < 1$ уравнение (32) имеет два решения x_2^1, x_2^2 . Решению $0 < x_2^1 < 1/\mu$ соответствует состояние равновесия системы (1) в области G^0 с индексом, равным $+1$, в силу леммы 5. Второе решение $x_2^2 > 1/\mu$. Если $x_2^2 < 1$, то ему соответствует состояние равновесия системы (1) в области G^0 с индексом, равным -1 , в силу леммы 5.

Поскольку в случаях (а) и (б), т. е. при $u \geq 1$, система (1) не имеет замкнутых траекторий в G^0 , нашему предположению не противоречит только случай $0 < u < 1$.

Рассмотрим особые точки, лежащие внутри L . Так как сумма их индексов равна $+1$, то внутри L лежит лишь одна особая точка, а именно $\bar{x}_s^1 = (x_1(x_2^1), x_2^1)$ с индексом, равным $+1$.

Рассмотрим конус $K = \{\bar{x} \in G^0 : x_1 < x_1(x_2^1), x_2 < x_2^1\}$. Через \bar{K} обозначим замыкание K , а через ∂K — границу K . Главные изоклины (2) и (3) являются графиками монотонно убывающих функций переменной x_2 на интервале $0 \leq x_2 \leq 1/\mu$, поэтому на множестве $\bar{K} \setminus \bar{x}_s^1$ будет $f_1(\bar{x}) > 0$ и $f_2(\bar{x}) > 0$. Следовательно, множество точек строгого выхода из области K по отношению к системе (1) является объединением двух множеств, а именно $K_{se} = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, где

$$\Gamma_1 = \{\bar{x} \in G^0 : x_1 = x_1(x_2^1), x_2 < x_2^1\}, \quad \Gamma_2 = \{\bar{x} \in G^0 : x_1 < x_1(x_2^1), x_2 = x_2^1\}.$$

Пусть $S = \partial K \cap \partial G$. Через ∂S обозначим границу множества S , которая состоит из двух точек $\partial S = \{(x_1(x_2^1), 0), (0, x_2^1)\}$. Траектории системы (1) могут войти в область K только с множества $S \setminus \partial S$. Поэтому в силу леммы 4 существует такая точка $\bar{x}_0 \in S \setminus \partial S$, что решение $\bar{x}(t)$ системы (1), удовлетворяющее условию $\bar{x}(0) = \bar{x}_0$, лежит в K для всех $t > 0$ и $\lim_{t \rightarrow +\infty} \bar{x}(t) = \bar{x}_s^1$. Поскольку в области G нет больше особых точек с положительным индексом, можно применить теорему 4, из которой следует, что в G не существует замкнутых траекторий. Мы пришли к противоречию, следовательно, утверждение о том, что при $K_{-2} = 0$ в области G нет замкнутых траекторий системы (1), доказано.

Покажем теперь, что если $K_{-2} = 0$ и $\bar{x}_s = (0, 1)$ — единственная особая точка системы (1) в G , то она асимптотически устойчива в целом.

Рассмотрим изоклины (5) и (3). Кривую (3) запишем в виде

$$x_1 = \frac{\sqrt{K_2}(1-x_2)}{\sqrt{k_{30}e^{-\mu x_2}x_2 + \sqrt{K_2}}}. \quad (33)$$

Поскольку $\bar{x}_s = (0, 1)$ является единственной особой точкой, то изоклины (5) и (33) разделяют область G^0 на три подобласти $G_1 = \{\bar{x} \in G^0 : f_1(\bar{x}) < 0, f_2(\bar{x}) < 0\}$, $G_2 = \{\bar{x} \in G^0 : f_1(\bar{x}) < 0, f_2(\bar{x}) > 0\}$ и $G_3 = \{\bar{x} \in G^0 : f_1(\bar{x}) > 0, f_2(\bar{x}) > 0\}$. Кроме того, кривая (33) делит область G^0 на две части G_1 и $G_4 = \{\bar{x} \in G^0 : f_2(\bar{x}) > 0\}$ и в G^0 является кривой без контакта с траекториями системы (1). Следовательно, ни одна траектория системы (1) из области G_4 не выходит.

Нетрудно видеть, что в G_4 отрезки $x_2 = c$ являются отрезками без контакта. Отсюда следует, что в области G_4 не существует целых траекторий, в частности, предельных циклов. В самом деле, траектория, проходящая при некотором $t = t_0$ через произвольную точку $x_2 = c$ в области G_4 , не может возвращаться с ростом t на отрезок $x_2 = c$, а может только приближаться к точке $\bar{x}_s = (0, 1)$. Таким образом, все решения системы (1) с начальными данными из области

G_4 стремятся к состоянию равновесия \vec{x}_s , причем компонента $x_2(t)$ монотонно возрастает к единице.

Покажем теперь, что и в области G^0 нет целых траекторий системы (1). Предположим, что такая траектория L существует. Тогда существует точка $\vec{y} \in L$ такая, что $\vec{y} \in \overline{G_1} \cap G^0$. Рассмотрим множество $M = \{\vec{x} \in G^0 : x_1 > y_1, x_2 > y_2\}$ и область $D = M \cap G_1$. Поскольку в D имеем $f_1(\vec{x}) < 0$ и $f_2(\vec{x}) < 0$, множество D_{se} точек строгого выхода из D состоит из части границы ∂D области D , лежащей в G^0 , т. е. $D_{se} = \partial D \cap G^0$. Пусть $S = \partial D \cap \partial G$. Через ∂S обозначим границу множества S ; $\partial S = \{(y_1, 1 - y_1), (1 - y_2, y_2)\}$. Далее, в область D траектории системы (1) могут войти только через множество $S \setminus \partial S$. На множестве ∂S будет $f_1(\vec{x}) < 0, f_2(\vec{x}) < 0$. Проводя рассуждения, как при доказательстве леммы 4, можно показать, что существует точка $\vec{x}_0 \in S \setminus \partial S$, для которой график решения $\vec{x}(t)$ системы (1) с начальными данными $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ пересекает впервые $\partial D \cap G$ в точке \vec{y} . Существование такого решения противоречит тому, что траектория L при $t \rightarrow -\infty$ содержится в G^0 . Таким образом, доказано, что в области G не может существовать целой траектории.

Чтобы закончить доказательство, рассмотрим произвольное решение $\vec{x}(t)$ системы (1) в области G^0 . Поскольку в G^0 нет целых траекторий системы (1) и на границе ∂G только одна особая точка, множество ω -предельных точек траектории состоит из единственной точки $\vec{x}_s = (0, 1)$. Теорема 10 доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чумаков Г. А. Математические вопросы моделирования автоколебаний скорости гетерогенной каталитической реакции. I // Сиб. мат. журн. 2005. Т. 46, № 5. С. 1179–1189.
2. Красносельский М. А. Векторные поля на плоскости. М.: Физматгиз, 1963.
3. Андронов А. А., Леонтович Е. А., Гордон И. И., Майер А. Г. Качественная теория динамических систем. М.: Наука, 1966.
4. Андронов А. А., Леонтович Е. А., Гордон И. И., Майер А. Г. Теория бифуркаций динамических систем на плоскости. М.: Наука, 1967.
5. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир, 1970.
6. Зуланке Р., Винтген П. Дифференциальная геометрия и расслоения. М.: Мир, 1975.

Статья поступила 19 апреля 2006 г.

Чумаков Геннадий Александрович
 Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
 пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
 chumakov@math.nsc.ru