

О ФОРМАЦИЯХ, ПОРОЖДЕННЫХ ГРУППОЙ ЦОКОЛЬНОЙ ДЛИНЫ 2

В. П. Буриченко

Аннотация. Гашоц предположил, что формация, порожденная конечной группой, содержит лишь конечное число подформаций. В статье это предположение доказывается для групп цокольной длины не более 2. (Мы говорим, что группа имеет цокольную длину 1, если она совпадает со своим цоколем, и цокольную длину 2, если ее фактор-группа по цоколю имеет цокольную длину 1.) Ранее гипотеза Гашоца была доказана в нескольких частных случаях, включая разрешимые группы.

Ключевые слова: конечные группы, формация.

1. Введение

Все группы, рассматриваемые в данной статье, конечны. Под *классом* понимается семейство конечных групп, замкнутое относительно изоморфизма. Напомним, что *формация* есть класс \mathfrak{F} со следующими свойствами:

- (1) если $G \in \mathfrak{F}$ и $N \trianglelefteq G$, то $G/N \in \mathfrak{F}$;
- (2) если G — группа, $K, N \trianglelefteq G$, $K \cap N = 1$, $G/K \in \mathfrak{F}$ и $G/N \in \mathfrak{F}$, то $G \in \mathfrak{F}$.

Отметим, что условие (2) эквивалентно следующему: для любых $G_1, G_2 \in \mathfrak{F}$ любое их подпрямое произведение G также лежит в \mathfrak{F} .

Если \mathcal{A} — любое множество конечных групп, то через $\text{form}(\mathcal{A})$ обозначаем порожденную им формацию, т. е. наименьшую формацию, содержащую \mathcal{A} . Если $\mathcal{A} = \{G_1, \dots, G_m\}$ конечно, то вместо $\text{form}(\mathcal{A})$ будем писать $\text{form}(G_1, \dots, G_m)$ (опуская фигурные скобки).

Теории формаций посвящены книга [1] и значительная часть книги [2]. Одной из самых известных проблем теории формаций является следующая (см., например, [3, вопрос 9.59]).

Проблема (В. Гашоц). *Доказать, что для любой конечной группы G формация $\text{form}(G)$ содержит лишь конечное число подформаций.*

Эта проблема решена в следующих частных случаях:

- (1) когда G разрешима [4];
- (2) когда G является расширением разрешимой группы с помощью простой [5];
- (3) когда разрешимый корадикал $G^{\mathfrak{S}}$ группы G не содержит fraternal главных факторов группы G [6].

(Разрешимый корадикал $G^{\mathfrak{S}}$ есть наименьшая нормальная подгруппа в G такая, что $G/G^{\mathfrak{S}}$ разрешима. Условие в (3) означает, что если Y и X — нормальные

подгруппы в G , содержащиеся в $G^{\mathfrak{S}}$, причем Y/X — главный фактор группы G , то $Y/X \not\subseteq \Phi(G/X)$.)

Основная цель настоящей работы — доказать гипотезу Гашюца еще в одном частном случае.

Под *цоколем* $\text{Soc}(G)$ конечной группы G понимается, как обычно, подгруппа, порожденная всеми минимальными нормальными подгруппами в G . Определим *цокольную длину* $l_s(G)$ по индукции, полагая $l_s(1) = 0$ и $l_s(G) = 1 + l_s(G/\text{Soc}(G))$ при $G \neq 1$. В работе будет доказана

Теорема 1.1. *Если G — группа цокольной длины $l_s(G) \leq 2$, то $\text{form}(G)$ содержит лишь конечное число подформаций.*

Работа организована следующим образом. В разд. 2 каждая формация $\text{form}(G)$ вкладывается в некоторую более обозримую формацию, обозначаемую через $\mathfrak{F}(k, M)$. Теорема 1.1 сводится к доказательству того, что формация $\mathfrak{F}(2, M)$ содержит лишь конечное число формационно неразложимых групп (определение см. в разд. 2). В разд. 3 с использованием когомологий доказывается некоторый признак формационной разложимости. Наконец в разд. 4 анализируется строение формационно неразложимых групп цокольной длины 2, откуда следует доказательство теоремы 1.1.

Благодарности. Автор признателен В. Н. Тютянову за дружескую поддержку и А. Н. Скибе за полезное указание на [7].

2. Формация $\mathfrak{F}(k, M)$

Сначала мы докажем, что класс групп цокольной длины $\leq k$ является формацией. В [7, теорема 3.21] доказано аналогичное утверждение для алгебраических систем произвольной сигнатуры. Наше доказательство, по существу, является модификацией доказательства из [7].

Подпрямое произведение семейства групп G_1, \dots, G_m — это подгруппа $G \leq G_1 \times \dots \times G_m$ такая, что $\text{pr}_i G = G_i$ для всех i , где $\text{pr}_i : \prod_{j=1}^m G_j \rightarrow G_i$ — проекция на i -й сомножитель. Подпрямое произведение «ассоциативно»; например, если G — подпрямое произведение групп G_1 и G_2 , а G_2 — подпрямое произведение G_3 и G_4 , то G является подпрямым произведением семейства $\{G_1, G_3, G_4\}$.

Мы будем называть подпрямое произведение $G \leq \prod_{i=1}^m G_i$ *несократимым*, если для любого собственного подмножества $J \subset \{1, \dots, m\}$ проекция G на $G_J = \prod_{i \in J} G_i$ имеет нетривиальное ядро. (Иначе говоря, G не представляется как подпрямое произведение собственного подмножества $\{G_i \mid i \in J\}$.) Очевидно, подпрямое произведение несократимо тогда и только тогда, когда пересечение $G \cap G_i$ (где G_i понимается как естественным образом вложенное в $G_1 \times \dots \times G_m$) нетривиально для каждого i .

Напомним, что группа G называется *монолитической*, если она имеет ровно одну минимальную нормальную подгруппу K (называемую *монолитом* группы G).

Лемма 2.1. *Пусть G_1, \dots, G_m — монолитические группы с монолитами K_i и $G \leq G_1 \times \dots \times G_m$ — несократимое подпрямое произведение. Тогда $K = K_1 \times \dots \times K_m$ — нормальная подгруппа в G и G/K является подпрямым произведением (может быть, сократимым) групп G_i/K_i .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как произведение несократимо, то $N_i = G \cap G_i \neq 1$ для всех i . Если $n \in N_i$, $g \in G_i$ и $\tilde{g} \in G$ — элемент, i -я компонента которого есть g , то $\tilde{g}n\tilde{g}^{-1} = gng^{-1}$. Отсюда $N_i \trianglelefteq G_i$. Следовательно, $K_i \subseteq N_i$. Поэтому $K = K_1 \times \cdots \times K_m \subseteq G$.

Для данного $1 \leq i \leq m$ рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \prod_{j=1}^m G_j & \xrightarrow{\alpha} & \prod_{j=1}^m (G_j/K_j) \\ \beta \downarrow & & \gamma \downarrow \\ G_i & \xrightarrow{\delta} & G_i/K_i \end{array}$$

(стрелки определены очевидным образом). Она, очевидно, коммутативна. Ясно, что $\text{Ker}(\alpha) = K$, откуда $\alpha G \cong G/K$. Далее, $\gamma(\alpha G) = \delta\beta G = \delta G_i = G_i/K_i$. Так как это верно для любого i , то αG — подпрямое произведение групп G_i/K_i , что и требовалось. \square

Класс групп \mathfrak{F} называется *полуформацией* (или *гомоморфом*), если $G/N \in \mathfrak{F}$ для любых $G \in \mathfrak{F}$ и $N \trianglelefteq G$.

Лемма 2.2. Если \mathfrak{F} — полуформация, то любая группа $G \in \mathfrak{F}$ есть подпрямое произведение монолитических групп из \mathfrak{F} .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО проводится индукцией по порядку группы $G \in \mathfrak{F}$. Если G монолитическая, утверждение очевидно. Иначе существуют минимальные нормальные подгруппы $N, K \triangleleft G$ с $N \cap K = 1$. Тогда G есть подпрямое произведение групп G/N и G/K . Обе эти группы лежат в \mathfrak{F} и по индуктивному предположению являются подпрямыми произведениями монолитических групп из \mathfrak{F} , поэтому такова и G . \square

Пусть теперь \mathfrak{F} — произвольная формация. Через $\widehat{\mathfrak{F}}$ обозначим класс групп G таких, что $G/\text{Soc}(G) \in \mathfrak{F}$.

Предложение 2.3. $\widehat{\mathfrak{F}}$ — формация.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Сначала докажем, что $\widehat{\mathfrak{F}}$ — полуформация. Достаточно доказать, что если $G \in \widehat{\mathfrak{F}}$ и L — минимальная нормальная подгруппа в G , то $G/L \in \widehat{\mathfrak{F}}$. Если N — минимальная нормальная подгруппа в G , отличная от L , то NL/L — минимальная нормальная подгруппа в G/L . Отсюда следует, что $\text{Soc}(G)/L \subseteq \text{Soc}(G/L)$. Поэтому $A = (G/L)/\text{Soc}(G/L)$ является фактор-группой для $(G/L)/(\text{Soc}(G)/L) \cong G/\text{Soc}(G)$. Последняя группа лежит в \mathfrak{F} , поэтому A также лежит в \mathfrak{F} . Отсюда $G/L \in \widehat{\mathfrak{F}}$, что и требовалось.

Осталось доказать, что $\widehat{\mathfrak{F}}$ замкнуто относительно подпрямых произведений. Пусть $A, B \in \widehat{\mathfrak{F}}$ и G — некоторое их подпрямое произведение. Обе A и B представляются как подпрямые произведения некоторого семейства монолитических групп из $\widehat{\mathfrak{F}}$, поэтому то же верно и для G . Удаляя из этого произведения лишние сомножители, видим, что G является несократимым подпрямым произведением некоторого семейства G_1, \dots, G_m монолитических групп из $\widehat{\mathfrak{F}}$. Пусть K_i — их монолиты. Тогда $K = K_1 \times \cdots \times K_m$ — нормальная подгруппа в G . Все K_i суть минимальные нормальные подгруппы в G , следовательно, $K \subseteq \text{Soc}(G)$. С другой стороны, проекция любой минимальной нормальной подгруппы $N \triangleleft G$ на G_i есть либо 1, либо минимальная нормальная подгруппа в G_i , т. е. K_i . Отсюда $N \subseteq K$ и тем самым $\text{Soc}(G) \subseteq K$, откуда $\text{Soc}(G) = K$. Наконец, G/K

есть подпрямое произведение групп $G_i/K_i \in \mathfrak{F}$ и потому лежит в \mathfrak{F} . Значит, $G \in \widehat{\mathfrak{F}}$. \square

Для $k \geq 0$ пусть $\mathfrak{L}_k = \{G \mid l_s(G) \leq k\}$ — класс всех групп цокольной длины $\leq k$. Ясно, что $\mathfrak{L}_0 = \{1\}$ и $\mathfrak{L}_k = \mathfrak{L}_{k-1}$ при $k \geq 1$. Очевидной индукцией по k получается

Следствие 2.4 (Л. А. Шеметков, А. Н. Скиба). *Для любого $k \geq 0$ класс \mathfrak{L}_k является формацией.*

Пусть $M = \{X_1, \dots, X_m\}$ — конечное множество характеристически простых групп. Пусть $\mathfrak{F}(M)$ — класс всех групп G таких, что любой главный фактор группы G изоморфен группе из M . Следующее утверждение почти очевидно.

Лемма 2.5. *Класс $\mathfrak{F}(M)$ является формацией.*

Доказательство. Если $N \trianglelefteq G$, то любой главный фактор для G/N является главным фактором и для G . Поэтому $G \in \mathfrak{F}(M)$ влечет $G/N \in \mathfrak{F}(M)$. Остается доказать, что если $N, K \triangleleft G$, $N \cap K = 1$, $G/N \in \mathfrak{F}(M)$ и $G/K \in \mathfrak{F}(M)$, то $G \in \mathfrak{F}(M)$.

Очевидно, главные факторы для G суть в точности композиционные факторы для G , рассматриваемой как G -группа (т. е. как группа с областью операторов G ; действие G на себе есть действие внутренними автоморфизмами). Более того, G/N и G/K также являются G -группами, и их G -композиционные факторы суть в точности их главные факторы.

Поскольку $N \cap K = 1$, то N вкладывается как G -группа в G/K . Значит, любой главный фактор для G , лежащий в N , должен быть изоморфен (как G -группа и тем более как группа без операторов) некоторому главному фактору для G/K . Итак, любой главный фактор группы G изоморфен главному фактору для G/N или G/K . Отсюда следует, что $G \in \mathfrak{F}(M)$. \square

Обозначим $\mathfrak{F}(k, M) = \mathfrak{L}_k \cap \mathfrak{F}(M)$.

Предложение 2.6. $\mathfrak{F}(k, M)$ — формация.

Очевидное следствие двух предыдущих утверждений. \square

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Будем говорить, что группа G *формационно неразложима*, если существуют группы G_1, \dots, G_m порядка меньше, чем $|G|$, такие, что $\text{form}(G) = \text{form}(G_1, \dots, G_m)$. В противном случае G *формационно неразложима*.

Предложение 2.7. 1. *Любая формация \mathfrak{F} порождается содержащимися в ней формационно неразложимыми группами.*

2. \mathfrak{F} *содержит лишь конечное множество подформаций тогда и только тогда, когда она содержит лишь конечное (с точностью до изоморфизма) множество формационно неразложимых групп.*

Доказательство. 1. Пусть \mathcal{B} — множество всех формационно неразложимых групп из \mathfrak{F} и $\mathfrak{A} = \text{form}(\mathcal{B})$. Покажем, что любая группа $G \in \mathfrak{F}$ лежит в \mathfrak{A} . Используем индукцию по $|G|$. Если G формационно неразложима, то утверждение очевидно. Иначе существуют группы G_1, \dots, G_m такие, что $|G_i| < |G|$ и $\text{form}(G) = \text{form}(G_1, \dots, G_m)$. Все G_i суть группы из \mathfrak{F} порядка меньше $|G|$, значит, лежат в \mathfrak{A} по предположению индукции. Поэтому и $G \in \mathfrak{A}$. Утверждение 1 доказано.

2. Заметим, что если G_1 и G_2 формационно неразложимы и $|G_1| \neq |G_2|$, то $\text{form}(G_1) \neq \text{form}(G_2)$. Поэтому бесконечность \mathcal{B} влечет бесконечность числа подформаций в \mathfrak{F} . С другой стороны, если $\mathcal{C} \subseteq \mathfrak{F}$ — подформация, то $\mathcal{C} = \text{form}(\mathcal{B} \cap \mathcal{C})$. Если \mathcal{B} конечно, то для $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$, значит, и для \mathcal{C} есть лишь конечное число возможностей. \square

Теперь мы сформулируем предложение, которое будет доказано в разд. 4.

Предложение 2.8. Пусть M — конечное множество характеристически простых групп. Тогда класс $\mathfrak{F}(2, M)$ содержит лишь конечное число формационно неразложимых групп.

Теорема 1.1 является легким следствием этого предложения. Действительно, если $l_s(G) \leq 2$, то G лежит в $\mathfrak{F}(2, M)$, где M есть множество всех главных факторов для G . Последняя формация содержит лишь конечное множество формационно неразложимых групп и, следовательно, лишь конечное множество подформаций. Тем более $\text{form}(G)$ содержит лишь конечное множество подформаций.

ЗАМЕЧАНИЕ. В предыдущих работах [4–6] использовалось понятие формационной критичности, а не формационной неразложимости. Группа G формационно критическая, если не существует групп G_1, \dots, G_m таких, что $\text{form}(G) = \text{form}(G_1, \dots, G_m)$ и все G_i — собственные сечения группы G . Если группа неразложима, то она критична. Обратное, видимо, неверно. В рассуждениях из [4–6] формационно критические группы могут быть заменены формационно неразложимыми. С другой стороны, в настоящей работе неразложимые группы не могут быть заменены критическими.

3. Необходимые сведения о когомологиях

Пусть G — группа, M — G -модуль (т. е. $\mathbb{Z}G$ -модуль). Под расширением модуля M с помощью G мы понимаем короткую точную последовательность групп

$$E : 1 \rightarrow M \xrightarrow{i} \tilde{G} \xrightarrow{\rho} G \rightarrow 1,$$

согласованную со структурой G -модуля на M , т. е. такую, что $gi(m)g^{-1} = i(\rho(g)m)$ для любых $m \in M$, $g \in \tilde{G}$.

Отображение $c : G \times G \rightarrow M$ называется (нормализованным) 2-коциклом, если (а) $c(1, x) = c(x, 1) = 0$ для любого $x \in G$ и (б) $c(x, y) + c(xy, z) = xc(y, z) + c(x, yz)$ для любых $x, y, z \in G$, и (нормализованной) 2-кограницей, если оно представляется как $c(x, y) = xb(y) + b(x) - b(xy)$ для некоторого отображения $b : G \rightarrow M$ такого, что $b(1) = 0$. Всякая 2-кограница является 2-коциклом. Группа 2-когомологий есть фактор-группа $H^2(G, M) = Z^2(G, M)/B^2(G, M)$, где Z^2 и B^2 суть группы 2-коциклов и 2-кограниц соответственно. Для ненормализованных 2-коциклов и 2-кограниц (т. е. без условий $c(x, 1) = c(1, x) = b(1) = 0$) группы H^2 те же самые, что и для нормализованных. В дальнейшем рассматриваются лишь нормализованные 2-коциклы и 2-кограницы.

Пусть E — расширение, как выше. Для каждого $g \in G$ выберем прообраз $\tilde{g} \in \rho^{-1}(g)$, причем в качестве представителя для $1 \in G$ возьмем $1 \in \tilde{G}$. Тогда легко проверить, что формула $c(x, y) = i^{-1}(\tilde{x}\tilde{y}\tilde{x}y^{-1})$ определяет 2-коцикл на G . Два коцикла, отвечающие различным выборам системы представителей $\{\tilde{g}\}$, отличаются на кограницу. Таким образом, каждому расширению отвечает однозначно определенный класс 2-когомологий, который мы будем обозначать

через $[E]$. Обратно, если c есть 2-коцикл, то мы можем определить на множестве $\tilde{G} = M \times G$ структуру группы по правилу $(m, g)(l, h) = (m + gl + c(g, h), gh)$. Тогда

$$E : 1 \rightarrow M \xrightarrow{i} \tilde{G} \xrightarrow{\rho} G \rightarrow 1,$$

где i и ρ определены правилами $i(m) = (m, 1)$ и $\rho((m, x)) = x$, является расширением M с помощью G .

Любые два расширения, отвечающие одному и тому же классу когомологий, в определенном смысле эквивалентны, и множество $\mathcal{E}(G, M)$ классов этой эквивалентности находится в биекции с $H^2(G, M)$. Детали могут быть найдены в [8, гл. 4; 9, гл. 4; 10, § 2.7].

Для двух расширений

$$E_j : 1 \rightarrow M \xrightarrow{i_j} \tilde{G}_j \xrightarrow{\rho_j} G \rightarrow 1,$$

где $j = 1, 2$, определим их сумму Бэра E следующим образом. В прямом произведении $\tilde{G}_1 \times \tilde{G}_2$ рассмотрим подгруппу $L = \{(g_1, g_2) \mid \rho_1(g_1) = \rho_2(g_2)\}$. Далее, $N = \{(i_1(m), i_2(-m)) \mid m \in M\}$ является нормальной подгруппой в L . Положим $\tilde{G} = L/N$. Определим $\rho : \tilde{G} \rightarrow G$ и $i : M \rightarrow \tilde{G}$ правилами $\rho((x, y) \bmod N) = \rho_1(x)(= \rho_2(y))$, $i(m) = (i_1(m), 1) \bmod N$. Тогда несложно проверить, что

$$E : 1 \rightarrow M \xrightarrow{i} \tilde{G} \xrightarrow{\rho} G \rightarrow 1$$

является расширением и его класс $\theta = [E]$ совпадает с суммой классов $\theta_1 = [E_1]$ и $\theta_2 = [E_2]$.

Далее, для данного расширения E , как выше, определим $(-E)$ как

$$(-E) : 1 \rightarrow M \xrightarrow{i_1} \tilde{G} \xrightarrow{\rho} G \rightarrow 1,$$

где $i_1(m) = i(-m)$. Несложно видеть, что $[(-E)] = -[E]$.

Для данного класса $\theta \in H^2(G, M)$ пусть $\tilde{G}(\theta)$ есть группа \tilde{G} , появляющаяся в расширении E таком, что $[E] = \theta$. Очевидно, класс изоморфизма группы \tilde{G} зависит только от θ . Отметим, что для различных классов θ группы $\tilde{G}(\theta)$ могут быть изоморфны. В частности, как следует из определения расширения $(-E)$, всегда $\tilde{G}(-\theta) \cong \tilde{G}(\theta)$.

Через $\text{Aut}(G, M)$ обозначим множество всех пар $(\alpha, \beta) \in \text{Aut}(G) \times \text{Aut}(M)$, согласованных в том смысле, что $\alpha(g)\beta(m) = \beta(gm)$ для любых $g \in G, m \in M$. Очевидно, $\text{Aut}(G, M)$ есть группа относительно покомпонентного умножения. Определим действие $\text{Aut}(G, M)$ на $H^2(G, M)$ следующим образом. Пусть $\theta \in H^2(G, M)$ представлено коциклом c . Тогда $c_1 = (\alpha, \beta)c$, определенное тем, что $c_1(x, y) = \beta(c(\alpha^{-1}x, \alpha^{-1}y))$, является коциклом. Положим $(\alpha, \beta)\theta = \theta_1 = [c_1]$. Несложно видеть, что в терминах расширений θ_1 может быть описано следующим образом. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{j} & \tilde{G} & \xrightarrow{\rho} & G \longrightarrow 1 \\ & & \beta \downarrow & & \parallel & & \alpha \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{j_1} & \tilde{G} & \xrightarrow{\rho_1} & G \longrightarrow 1, \end{array}$$

где верхняя строка есть расширение, представляющее θ , а нижняя определяется из условия коммутативности диаграммы, т. е. $j_1 = j\beta^{-1}$, $\rho_1 = \alpha\rho$. Легко показать, что нижняя строка является расширением и его класс есть в точности θ_1 .

Из последнего описания следует, в частности, что $\tilde{G}(\theta_1) \cong \tilde{G}(\theta)$.

Полезность 2-когомологий для изучения формаций иллюстрируется следующей леммой.

Лемма 3.1. Пусть M есть G -модуль и \mathfrak{F} есть произвольная формация. Тогда

$$H^2(G, M)_{\mathfrak{F}} = \{\theta \in H^2(G, M) \mid \tilde{G}(\theta) \in \mathfrak{F}\}$$

либо пусто, либо является $\text{Aut}(G, M)$ -подмодулем в $H^2(G, M)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку всегда $\tilde{G}(-\theta) \cong \tilde{G}(\theta)$, то $\theta \in H^2(G, M)_{\mathfrak{F}}$ влечет $-\theta \in H^2(G, M)_{\mathfrak{F}}$. Кроме того, из описания сложения Бэра следует, что $\tilde{G}(\theta_1 + \theta_2)$ является фактор-группой подпрямого произведения групп $\tilde{G}(\theta_1)$ и $\tilde{G}(\theta_2)$. Поэтому $\tilde{G}(\theta_1), \tilde{G}(\theta_2) \in \mathfrak{F}$ влечет $\tilde{G}(\theta_1 + \theta_2) \in \mathfrak{F}$. Наконец, $\text{Aut}(G, M)$ -инвариантность $H^2(G, M)_{\mathfrak{F}}$ следует из того, что $\tilde{G}(\theta)$ и $\tilde{G}((\alpha, \beta)\theta)$ всегда изоморфны. \square

Теперь рассмотрим одну специальную ситуацию. Пусть $G = G_1 \times \dots \times G_m$, $K \cong Z_p$, K рассматривается как модуль с тривиальным действием над G и всеми G_i . Опишем отображение $\sigma : \bigoplus_{i=1}^m H^2(G_i, K) \rightarrow H^2(G, K)$. Пусть $\theta_i \in H^2(G_i, K)$ представляется коциклом $c_i \in Z^2(G_i, K)$. Определим $c : G \times G \rightarrow K$ формулой

$$c((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)) = \sum_{i=1}^m c_i(x_i, y_i). \quad (1)$$

Легко проверить, что c — коцикл и его класс $\theta = [c]$ зависит только от $\theta_1, \dots, \theta_m$. Положим $\sigma(\theta_1, \dots, \theta_m) = \theta$. Далее, легко видеть, что σ есть гомоморфизм групп.

Пусть $\theta = \sigma(\theta_1, \dots, \theta_m)$ и

$$E : 1 \rightarrow K \xrightarrow{j} \tilde{G} \xrightarrow{\rho} G \rightarrow 1 \quad (2)$$

— любое расширение с $[E] = \theta$. Пусть

$$E_i : 1 \rightarrow K \xrightarrow{j} \tilde{G}_i \xrightarrow{\rho_i} G_i \rightarrow 1 \quad (3)$$

суть ограничения E на подгруппы G_i ; здесь $\tilde{G}_i = \rho^{-1}(G_i)$ и $\rho_i = \rho|_{\tilde{G}_i}$. Легко видеть, что $[E_i] = \theta_i$. Кроме того, \tilde{G}_i и \tilde{G}_j коммутируют при $i \neq j$. Таким образом, \tilde{G} является центральным произведением групп \tilde{G}_i с отождествленной подгруппой K .

Обратно, допустим, что $\theta \in H^2(G, K)$ таково, что для соответствующего расширения вида (2) подгруппы $\tilde{G}_i = \rho^{-1}(G_i)$ попарно коммутируют. Тогда нетрудно проверить, что $\theta = \sigma(\theta_1, \dots, \theta_m)$, где $\theta_i = [E_i] = \theta|_{G_i}$. В самом деле, возьмем для элементов $g \in G_i$ какие-либо прообразы \tilde{g} . Пусть $c_i \in Z^2(G_i, K)$ — отвечающие данному выбору прообразов коциклы. Очевидно, $[c_i] = \theta_i$. Теперь определим прообраз для произвольного элемента $g = (g_1, \dots, g_m) \in G_1 \times \dots \times G_m$ как $\tilde{g} = \tilde{g}_1 \dots \tilde{g}_m$. Несложно вычислить, что коцикл c , соответствующий данному выбору прообразов, определяется формулой (1). Это и значит, что $\theta = \sigma(\theta_1, \dots, \theta_m)$.

Если среди $\theta_1, \dots, \theta_m$ есть нули, скажем $\theta_i = 0$, то соответствующее расширение E_i расщепимо, откуда $\tilde{G}_i = K \times \tilde{G}_i$, $\tilde{G}_i \cong G_i$. Легко видеть, что \tilde{G}_i выделяется прямым сомножителем в \tilde{G} .

Наконец, допустим, что среди G_1, \dots, G_m есть изоморфные группы. Пусть, например, $G = G_1 \times G_2 \times G_3$ и $G_2 \cong G_3$. Выберем и фиксируем изоморфизм между G_2 и G_3 , так что мы можем записать $G = G_1 \times G_2 \times G_2$. Далее, $H^2(G_2, K)$ отождествляется с $H^2(G_3, K)$. Пусть $\theta_1 \in H^2(G_1, K)$, $\theta_2, \theta_3 \in H^2(G_2, K)$, $\theta = \sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ и $\theta' = \sigma(\theta_1, \theta_3, \theta_2)$.

Лемма 3.2. В указанных выше предположениях $\tilde{G}(\theta)$ и $\tilde{G}(\theta')$ изоморфны.

Доказательство. Пусть c_i — коциклы, представляющие классы θ_i . Тогда коциклы c и c' , представляющие классы θ и θ' соответственно, могут быть определены формулами

$$\begin{aligned} c((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) &= c_1(x_1, y_1) + c_2(x_2, y_2) + c_3(x_3, y_3), \\ c'((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) &= c_1(x_1, y_1) + c_3(x_2, y_2) + c_2(x_3, y_3). \end{aligned}$$

Пусть $\pi : G \rightarrow G$ переставляет два последних сомножителя, т. е. $\pi((g_1, g_2, g_3)) = (g_1, g_3, g_2)$, и пусть $\hat{\pi} = (\pi, \text{id}_K)$. Тогда класс $\hat{\pi}\theta$ представлен коциклом $c_1 = \hat{\pi}c$, определенным тем, что $c_1(x, y) = c(\pi^{-1}x, \pi^{-1}y)$, т. е.

$$\begin{aligned} c_1((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) &= c((x_1, x_3, x_2), (y_1, y_3, y_2)) \\ &= c_1(x_1, y_1) + c_2(x_3, y_3) + c_3(x_2, y_2), \end{aligned}$$

что совпадает с $c'((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3))$. Значит, $\theta' = \hat{\pi}\theta$, откуда $\tilde{G}(\theta') \cong \tilde{G}(\theta)$. \square

Разумеется, подобное утверждение верно и для других случаев, когда среди G_i есть изоморфные сомножители.

Теперь мы готовы доказать ключевую лемму данной работы.

Лемма 3.3. Пусть G есть группа, $K \subseteq Z(G)$, $K \cong Z_p$, и $H = G/K$ разлагается как $H = A \times B_1 \times B_2$. Предположим далее, что это разложение обладает следующими свойствами: 1) $A, B_1, B_2 \neq 1$; 2) $B_1 \cong B_2$; 3) подгруппы $\tilde{A}, \tilde{B}_1, \tilde{B}_2 \subset G$, которые суть прообразы в G подгрупп A, B_1 и B_2 соответственно, попарно коммутируют. Тогда G формационно разложима.

Доказательство. Возьмем каноническую последовательность

$$1 \rightarrow K \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1,$$

и пусть θ — ее когомологический класс, так что $G \cong \tilde{H}(\theta)$. Предшествующие рассмотрения показывают, что $\theta = \sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ для некоторых $\theta_1 \in H^2(A, K)$, $\theta_2 \in H^2(B_1, K)$, $\theta_3 \in H^2(B_2, K)$.

Обозначим $B = B_1$ и фиксируем некоторый изоморфизм B_1 с B_2 , так что $H = A \times B \times B$. Далее, положим $H_1 = H \times B = A \times B \times B \times B$. Наконец, пусть $\mathfrak{F} = \text{form}(G)$. Тогда группа $\tilde{H}_1 = \tilde{H}_1(\eta_1)$, где $\eta_1 = \sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3, 0)$, изоморфна $G \times B$, поэтому лежит в \mathfrak{F} , т. е. $\sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3, 0) \in H^2(H_1, K)_{\mathfrak{F}}$.

Если $\xi_1 \in H^2(A, K)$, $\xi_2, \xi_3, \xi_4 \in H^2(B, K)$ и π — произвольная перестановка на множестве $\{2, 3, 4\}$, то, как следует из предыдущей леммы, группы $\tilde{H}_1(\sigma(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4))$ и $\tilde{H}_1(\sigma(\xi_1, \xi_{\pi(2)}, \xi_{\pi(3)}, \xi_{\pi(4)}))$ изоморфны. Отсюда вытекает, что класс $\eta_2 = \sigma(\theta_1, \theta_2, 0, \theta_3)$ также лежит в $H^2(H_1, K)_{\mathfrak{F}}$, которая содержит и

$$\sigma(0, 0, \theta_3, -\theta_3) = \sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3, 0) - \sigma(\theta_1, \theta_2, 0, \theta_3),$$

а следовательно, и $\eta_3 = \sigma(0, \theta_3, -\theta_3, 0)$, а потому и

$$\eta_4 = \sigma(\theta_1, \theta_2 + \theta_3, 0, 0) = \sigma(\theta_1, \theta_2, \theta_3, 0) + \sigma(0, \theta_3, -\theta_3, 0) = \eta_1 + \eta_3.$$

Заметим, что $\tilde{H}_1(\eta_3) \cong A \times \tilde{H}_2 \times B$, где $H_2 = B \times B$ и $\tilde{H}_2 = \tilde{H}_2(\sigma(\theta_3, -\theta_3))$. Аналогично $\tilde{H}_1(\eta_4) \cong \tilde{H}_3 \times B \times B$, где $H_3 = A \times B$ и $\tilde{H}_3 = \tilde{H}_3(\sigma(\theta_1, \theta_2 + \theta_3))$. Поскольку $\tilde{H}_1(\eta_3)$ и $\tilde{H}_1(\eta_4) \in \mathfrak{F}$, видим, что $\tilde{H}_2, \tilde{H}_3 \in \mathfrak{F}$. Таким образом, $A, B, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3 \in \mathfrak{F}$. С другой стороны, $\eta_1 = \eta_4 - \eta_3$, поэтому $\tilde{H}_1 = \tilde{H}_1(\eta_1)$ есть подпрямое произведение групп $\tilde{H}_1(\eta_3)$ и $\tilde{H}_1(\eta_4)$, значит, \tilde{H}_1 и G лежат в формации, порожденной A, B, \tilde{H}_2 и \tilde{H}_3 . Тем самым $\text{form}(G) = \text{form}(A, B, \tilde{H}_2, \tilde{H}_3)$. Поскольку все группы A, B, \tilde{H}_2 и \tilde{H}_3 имеют порядок меньше $|G|$, это и означает, что G формационно разложима. \square

4. Формационно неразложимые группы

Цель этого раздела — доказать предложение 2.8.

Следующая важная лемма почти очевидна.

Лемма 4.1. *Формационно неразложимая группа монолитична.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Допустим, G имеет две различные минимальные нормальные подгруппы K и L . Тогда $K \cap L = 1$. Отсюда тотчас следует $\text{form}(G) = \text{form}(G/K, G/L)$. Значит, G формационно разложима. \square

Хорошо известно, что группа совпадает со своим цоклем тогда и только тогда, когда она является полупростой, т. е. прямым произведением нескольких простых групп. Также известно, что в полупростой группе любая нормальная подгруппа дополняема (см., например, лемму 4.6 книги [2]).

Лемма 4.2. *Пусть G — монолитическая группа из $\mathfrak{F}(2, M)$. Тогда либо $l_s(G) = 1$ и G — простая группа из M , либо $l_s(G) = 2$, монолит K группы G лежит в M и фактор-группа G/K — прямое произведение нескольких (не обязательно различных) простых групп из M .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $l_s(G) = 1$, то G полупроста. Если при этом G монолитична, то она проста (и, очевидно, лежит в M). Пусть $l_s(G) = 2$. Так как G монолитична, цокль $\text{Soc}(G)$ совпадает с монолитом K . Фактор $G/\text{Soc}(G)$ — полупростая группа. Ее простые сомножители являются ее главными факторами и потому лежат в M . \square

Пусть G — формационно неразложимая группа из $\mathfrak{F}(2, M)$ и K — ее монолит. Возможны 3 случая: (1) K неабелев; (2) K абелев и $K \not\subseteq Z(G)$; (3) $K \subseteq Z(G)$. Мы покажем, что в каждом из этих случаев для G есть лишь конечное число возможностей.

Случай неабелева монолита. Нужное нам утверждение вытекает из следующего.

Лемма 4.3. *Пусть K — неабелева характеристически простая группа. Тогда существует лишь конечное число монолитических групп, монолит которых изоморфен K .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть G — монолитическая группа с монолитом K . Заметим, что $C_G(K)$ есть нормальная подгруппа в G . Поскольку K неабелева и характеристически проста, то $Z(K) = 1$. Отсюда $K \cap C_G(K) \subseteq Z(K) = 1$. Из монолитичности G следует $C_G(K) = 1$. Значит, G действует на K точно и поэтому изоморфна некоторой подгруппе в $\text{Aut}(K)$. \square

Случай, когда монолит абелев и нецентрален. В этом случае K — характеристически простая абелева группа, т. е. $K \cong Z_p^k$ для некоторых p и k . Нужное нам утверждение вытекает из следующего.

Предложение 4.4. *Для данных p, k существует лишь конечное число групп G таких, что G монолитична, ее монолит K изоморфен Z_p^k , $K \not\subseteq Z(G)$, и G/K — произведение нескольких простых групп.*

Для доказательства нам потребуется лемма. Ниже \mathbb{F}_p обозначает конечное поле из p элементов.

Лемма 4.5. Пусть H — группа и V — $\mathbb{F}_p H$ -модуль, имеющий единственный минимальный подмодуль. Тогда V изоморфен подмодулю регулярного модуля $\mathbb{F}_p H$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку V имеет единственный минимальный подмодуль, то двойственный модуль V^* имеет единственный максимальный подмодуль, который обозначим через L . Возьмем элемент $v \in V^* - L$. Тогда порожденный им подмодуль $\mathbb{F}_p H \langle v \rangle$ не является подмодулем в L , значит, должен совпадать со всем V^* . Тем самым V^* — фактор-модуль регулярного модуля. Поскольку регулярный модуль самодвойствен, видим, что V изоморфен подмодулю регулярного модуля. \square

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 4.4. Пусть G — группа, удовлетворяющая данным условиям. Тогда G/K действует на K . Пусть A — ядро этого действия. Поскольку G/K полупроста, то A дополняема, $G/K = A \times B$. Пусть \tilde{A} и \tilde{B} — прообразы A и B в G . Поскольку B действует на K точно, то B вкладывается в $\text{Aut}(K) \cong GL(k, p)$. Следовательно, для B есть лишь конечное число возможностей.

Покажем, что \tilde{A} — элементарная абелева p -группа. Если $a \in \tilde{A}$, $b \in \tilde{B}$, то $c = [a, b] \in K \subseteq Z(\tilde{A})$. Далее, пусть $a_1, a_2 \in \tilde{A}$, $c_1 = [b, a_1]$, $c_2 = [b, a_2]$. Тогда $a_1^b = ba_1b^{-1} = c_1a_1$ и $a_2^b = c_2a_2$. Поскольку оба c_1 и c_2 лежат в центре группы \tilde{A} , то $[c_1a_1, c_2a_2] = [a_1, a_2]$, значит, $[a_1, a_2]^b = [a_1^b, a_2^b] = [a_1, a_2]$. Таким образом, $[\tilde{A}, \tilde{A}]$ и \tilde{B} поэлементно коммутируют. Так как $[\tilde{A}, \tilde{A}]$ характеристична в \tilde{A} , она нормальна в G . Поскольку B действует на K точно и неприводимо, имеем $C_K(B) = 1$, откуда $K \cap [\tilde{A}, \tilde{A}] = 1$. Отсюда и из монолитичности следует $[\tilde{A}, \tilde{A}] = 1$, т. е. \tilde{A} абелева. Поэтому B действует на \tilde{A} .

Далее, p' -компонента в \tilde{A} является характеристической подгруппой, тривиально пересекающей K , поэтому сама тривиальна. Тогда A — произведение нескольких экземпляров Z_p . Отображение $\varphi : x \mapsto x^p$ на \tilde{A} является B -эндоморфизмом. Поскольку на K это отображение тривиально, получаем B -гомоморфизм из A в K . Но таких гомоморфизмов нет, так как на A группа B действует тривиально, а на K — нетривиально и неприводимо. Итак, $\varphi = 0$, т. е. \tilde{A} — элементарна абелева.

Очевидно, нормальные подгруппы в G , лежащие в \tilde{A} , — это в точности B -подмодули в \tilde{A} . Значит, K — единственный минимальный B -подмодуль в \tilde{A} . По лемме 4.5 \tilde{A} изоморфен подмодулю регулярного модуля $\mathbb{F}_p B$, поэтому для \tilde{A} также имеется лишь конечное число возможностей при каждом возможном B . \square

Случай, когда монолит централен. Если монолит K монолитической группы G лежит в центре, то он обязательно изоморфен Z_p , где p простое. Для любой подгруппы $X \subseteq G/K$ будем обозначать через \tilde{X} прообраз X в G .

Лемма 4.6. Если G — монолитическая группа из $\mathfrak{F}(2, M)$, K — ее монолит, $K \subseteq Z(G)$ и $K \cong Z_p$, то существует разложение $G/K = A_0 \times A_1 \times \dots \times A_m \times B_1 \times \dots \times B_l$ со следующими свойствами:

- 1) $A_0 = 1$ или $A_0 \cong Z_p$, $A_i \cong Z_p^2$ при $i \geq 1$, B_i — неабелева простая группа порядка, делящегося на p ;
- 2) $\tilde{A}_0 = K \cong Z_p$ или $\tilde{A}_0 \cong Z_{p^2}$, \tilde{A}_i экстраспециальна при $i \geq 1$ и \tilde{B}_i — нерасщепимое расширение K с помощью B_i ;

3) если N и L — любые две различные группы из $\{A_0, \dots, B_l\}$, то $[\tilde{N}, \tilde{L}] = 1$ (таким образом, G является центральным произведением $\tilde{A}_0 * \dots * \tilde{B}_l$ с отождествленным центром K).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Фактор-группа G/K есть произведение нескольких простых групп. Разложим $G/K = A \times B \times C$, где A содержит все сомножители Z_p , B — все неабелевы сомножители порядков, делящихся на p , и C — все сомножители, являющиеся p' -группами.

Покажем, что $C = 1$. По теореме Шура — Цассенхауза любое расширение p -группы с помощью p' -группы расщепимо. В частности, если это расширение центрально, то оно является прямым произведением подгруппы на фактор-группу. Значит, $\tilde{C} = K \times C_1$, где $C_1 \cong C$. Поскольку C_1 характеристична в \tilde{C} , монолитичность G влечет $C_1 = 1$, откуда $C = 1$.

Теперь разложим $B = B_1 \times \dots \times B_l$, B_i просты. Если \tilde{B}_i — расщепимое расширение K с помощью B_i , то $\tilde{B}_i = K \times B_i^1$, где $B_i^1 \cong B_i$, и потому характеристична в \tilde{B}_i ; противоречие. Значит, \tilde{B}_i нерасщепима. В частности, $[\tilde{B}_i, \tilde{B}_i] = \tilde{B}_i$.

Далее, для каждого $i = 1, \dots, l$ имеем $G/K = L_i \times B_i$, где $L_i = A \times \prod_{j \neq i} B_j$.

То же рассуждение, что применялось в случае нецентрального монолита, показывает, что если $g \in \tilde{L}_i$ и $b_1, b_2 \in \tilde{B}_i$, то g коммутирует с $[b_1, b_2]$. Следовательно, \tilde{L}_i поэлементно коммутирует с $[\tilde{B}_i, \tilde{B}_i] = \tilde{B}_i$. В частности, \tilde{B}_i коммутирует с \tilde{B}_j при $j \neq i$, а также с A .

Нам остается получить разложение $A = A_0 \times \dots \times A_m$, удовлетворяющее нужным условиям. Поскольку A — элементарная абелева p -группа, мы можем рассматривать ее как пространство над \mathbb{F}_p . Также отождествим K с \mathbb{F}_p посредством некоторого изоморфизма $\varphi : K \rightarrow \mathbb{F}_p$. Как обычно, коммутатор определяет кососимметрическую билинейную форму f на A (именно, для $a, b \in A$ положим $f(a, b) = \varphi([\tilde{a}, \tilde{b}])$, где \tilde{a}, \tilde{b} — какие-нибудь прообразы для a и b соответственно). Положим $A_0 = \text{Ker}(f)$. Очевидно, что $\tilde{A}_0 \subseteq Z(\tilde{A}) \subseteq Z(G)$ (и даже $\tilde{A}_0 = Z(G)$, но сейчас нам это не нужно). Поскольку центр монолитической группы имеет ранг ≤ 1 , то либо $\tilde{A}_0 = K$ и $A_0 = 1$, либо $\tilde{A}_0 \cong Z_{p^2}$ и $A_0 \cong Z_p$. Наконец, выберем дополнение A^+ к A_0 в A . Ограничение $f|_{A^+}$ невырожденно, и мы можем разложить A^+ в ортогональную прямую сумму двумерных невырожденных подпространств A_i : $A^+ = A_1 \dot{+} \dots \dot{+} A_m$. Тогда $A_i \cong Z_p^2$, \tilde{A}_i неабелева и \tilde{A}_i коммутирует с \tilde{A}_j при $i \neq j$. \square

Лемма 4.7. *Формация $\mathfrak{F}(2, M)$ содержит лишь конечное число формационно неразложимых групп G таких, что $K \subseteq Z(G)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Прежде всего $K \cong Z_p$ для некоторого простого p . Так как M содержит лишь конечное множество групп Z_p , для K имеется конечное число возможностей. Далее, для G/K имеет место разложение $G/K = A_0 \times \dots \times B_l$ со свойствами, описанными в предыдущей лемме. Наконец, из леммы 3.3 следует, что если G формационно неразложима, то либо среди групп A_0, \dots, B_l нет двух изоморфных, либо в этом наборе групп ровно две неединичных и они изоморфны. В каждом из этих случаев, очевидно, имеется лишь конечное число возможностей для G/K . \square

Доказательства предложения 2.8 и теоремы 1.1 закончены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шеметков Л. А. Формации конечных групп. М.: Наука, 1978.
2. Doerk K., Hawkes T. Finite soluble groups. Berlin: Walter de Gruyter, 1993.
3. Коуровская тетрадь. Решенные вопросы теории групп. 13-е изд. Новосибирск: Ин-т математики СО РАН, 1995.
4. Bryant R. M., Bryce R. A., Hartley B. The formation generated by a finite group // Bull. Austral. Math. Soc. 1970. V. 2. P. 347–357.
5. Bryant R. M., Foy P. D. The formation generated by a finite group // Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. 1995. V. 94. P. 215–225.
6. Скиба А. Н. О формациях, порожденных классами групп // Вести АН БССР, сер. физ.-мат. наук. 1981. Т. 140. С. 33–38.
7. Шеметков Л. А., Скиба А. Н. Формации алгебраических систем. М.: Наука, 1989.
8. Браун К. С. Когомологии групп. М.: Наука, 1987.
9. Маклейн С. Гомология. М.: Мир, 1966.
10. Suzuki M. Group theory. I. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl., 1983.

Статья поступила 11 июля 2007 г.

Буриченко Владимир Петрович
Институт математики НАН Беларуси,
ул. Кирова, 32а, Гомель 246000, Беларусь
goim@nauka.belpak.gomel.by, vpburich@gmail.com