

ЕМКОСТНЫЕ ОЦЕНКИ, ТЕОРЕМЫ  
ЛИУВИЛЛЯ И ОБ УСТРАНЕНИИ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМ  $(p, q)$ -ИСКАЖЕНИЕМ

А. Н. Байкин, С. К. Водопьянов

**Аннотация.** Отображения с ограниченным весовым  $(p, q)$ -искажением представляют собой естественное обобщение известного в литературе класса отображений с ограниченным искажением, входящего в двухиндексную шкалу при  $p = q = n$  и отсутствия весовых функций. В случае  $n - 1 < q \leq p = n$  отображения с ограниченным  $(p, q)$ -искажением исследовались ранее в ряде работ при дополнительном предположении  $\mathcal{N}$ -свойства Лузина данного отображения. В данной работе изложены первоначальные сведения теории отображений с ограниченным  $(p, q)$ -искажением, полученные без дополнительных аналитических предположений. Основу теории составляют новые аналитические свойства перенесенных функций: в частности, доказано, что на образе точек ветвления градиент перенесенной функции равен нулю почти всюду. Выведены оценки на емкости образов конденсаторов для отображений с ограниченным  $(p, q)$ -искажением. Получены теоремы типа Лиувилля, теоремы о затирании особенностей для отображений данного класса и дано их применение к классификации многообразий.

**Ключевые слова:** отображение с ограниченным весовым  $(p, q)$ -искажением, емкостная оценка, теорема типа Лиувилля, теорема о затирании особенностей.

Введение

Напомним основные определения и обозначения теории пространств Соболева, необходимые для введения исследуемых в работе объектов.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1** [1]. Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — произвольное открытое множество,  $n \geq 2$ . Пусть  $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  — функция класса  $L_{1, \text{loc}}(\Omega)$ . Предположим, что существует функция  $g_i \in L_{1, \text{loc}}(\Omega)$  такая, что выполнено равенство

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) u(x) dx = - \int_{\Omega} \varphi(x) g_i(x) dx$$

для всякой тестовой функции  $\varphi \in C_0^1(\Omega)$ ,  $i = 1, \dots, n$ . В этом случае говорят, что  $g_i$  есть *обобщенная частная производная*  $\frac{\partial u}{\partial x_i}$  функции  $u$ :  $\frac{\partial u}{\partial x_i} = g_i$ . Набор частных производных функции  $u$  называется ее *обобщенным градиентом*  $\nabla u = \left( \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$ .

---

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 14-01-00552) и Совета по грантам Президента Российской Федерации (проект НШ-2263.2014.1).

Пусть  $p \geq 1$ . Будем говорить, что функция  $u \in L_{1,\text{loc}}(\Omega)$  принадлежит (однородному) классу Соболева  $L_p^1(\Omega)$ , если она имеет в  $\Omega$  первые обобщенные производные по всем переменным и модуль  $|\nabla u|(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)\right)^2}$  ее обобщенного градиента принадлежит  $L_p(\Omega)$ . Функция  $u \in L_{1,\text{loc}}(\Omega)$  принадлежит классу Соболева  $W_p^1(\Omega)$ , если  $u \in L_p(\Omega) \cap L_p^1(\Omega)$ .

В пространстве  $L_p^1(\Omega)$  ( $W_p^1(\Omega)$ ) введем полуnormу (normу)

$$\|u\|_{L_p^1(\Omega)} = \|\nabla u\|_{L_p(\Omega)} \quad (\|u\|_{W_p^1(\Omega)} = \|u\|_{L_p(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L_p(\Omega)}).$$

Отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  принадлежит классу  $W_p^1(\Omega)$  ( $W_{p,\text{loc}}^1(\Omega)$ ), если все координатные функции  $f$  принадлежат  $W_p^1(\Omega)$  (если  $f$  принадлежит  $W_p^1(D)$  для любой области  $D \Subset \Omega$ , т. е. для области, у которой замыкание  $\bar{D}$  компактно и  $\bar{D} \subset \Omega$ ).

В 60-е гг. прошлого века Ю. Г. Решетняк заложил основы теории отображений с ограниченным искажением, которую можно рассматривать как естественное обобщение теории аналитических функций на евклидовы пространства произвольной размерности (см. [2]).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — открытое множество в  $\mathbb{R}^n$ ,  $n \geq 2$ . Отображение  $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  класса Соболева  $W_{n,\text{loc}}^1(\Omega)$  называется *отображением с ограниченным искажением*, если

$$|Df(x)|^n \leq KJ(x, f) \quad \text{для почти всех } x \in \Omega,$$

где  $K$  — константа,  $J(x, f) = \det Df(x)$ . Здесь  $|Df(x)|$  — норма матрицы Якоби  $Df(x) = \left\{ \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right\}_{i,j=1,2,\dots,n}$ .

Ю. Г. Решетняк установил основные топологические свойства этих отображений, доказав, что всякое непостоянное отображение с ограниченным искажением непрерывно, открыто и дискретно [2]. Заметим, что для  $n = 2$  аналитические функции удовлетворяют этому определению при  $K = 1$ .

Основная задача данной работы — исследовать геометрические и аналитические свойства более общего класса отображений с ограниченным искажением, определяемых ниже.

Далее будем рассматривать неотрицательные измеримые функции (называемые *весовыми*)  $\theta, \sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  такие, что  $0 < \theta < \infty$  и  $0 < \sigma < \infty$  почти всюду. Все весовые функции предполагаются локально суммируемыми, их дополнительные свойства каждый раз оговариваются специально.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.** Отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  называется *отображением с ограниченным  $(\theta, \sigma)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением*,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , если

- 1)  $f$  непрерывно, открыто и дискретно;
- 2)  $f$  принадлежит классу Соболева  $W_{q,\text{loc}}^1(\Omega)$ ;
- 3)  $J(x, f) \geq 0$  для почти всех  $x \in \Omega$ ;
- 4) отображение  $f$  имеет *конечное искажение*:  $Df(x) = 0$ , тогда и только тогда, когда  $J(x, f) = 0$ , за исключением, быть может, множества точек нулевой меры;
- 5) функция локального  $(\theta, \sigma)$ -весового  $q$ -искажения:

$$\Omega \ni x \mapsto K_q^{\theta, \sigma}(x, f) = \begin{cases} \frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x)|Df(x)|}{\sigma^{\frac{1}{p}}(f(x))J(x, f)^{\frac{1}{p}}}, & \text{если } J(x, f) \neq 0, \\ 0 & \text{иначе,} \end{cases} \quad (1)$$

принадлежит классу  $L_{\varkappa}(\Omega)$ , где  $\varkappa$  находится из условия  $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$  ( $\varkappa = \infty$  при  $q = p$ ).

Введем следующее обозначение:  $K_{q,p}^{\theta,\sigma}(f; \Omega) = \|K_q^{\theta,\sigma}(y, f) | L_{\varkappa}(\Omega)\|$ .

В случае  $\theta(x) \equiv \sigma(y) \equiv 1$  отображение  $f$  будем называть просто *отображением с ограниченным  $(p, q)$ -искажением*.

Заметим, что отображение с ограниченным  $(n, n)$ -искажением — это известное в литературе непостоянное отображение с ограниченным искажением (см. определение 2).

Из условия (1) выводим

**Предложение 1.** Совокупность точек  $x \in \Omega$ , в которых знаменатель  $\sigma^{\frac{1}{p}}(f(x))J(x, f)^{\frac{1}{p}}$  в формуле (1) равен нулю, с точностью до множества нулевой меры совпадает с множеством точек, в которых  $J(x, f) = 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Включение

$$\{x \in \Omega : J(x, f) = 0\} \subset \{x \in \Omega : \sigma^{\frac{1}{p}}(f(x))J(x, f)^{\frac{1}{p}} = 0\}$$

очевидно.

Для доказательства обратного включения надо лишь убедиться в том, что якобиан  $J(x, f)$  обращается в нуль почти всюду на множестве  $A = f^{-1}(\{y \in \mathbb{R}^n : \sigma(y) = 0\})$ , или, другими словами, мера дополнения  $A \setminus Z$  равна нулю, где  $Z = \{x \in \Omega : J(x, f) = 0\}$ . Возьмем в формуле (2) замены переменной в интеграле Лебега (формулировка приведена ниже после доказательства предложения) в качестве функции  $u(x)$  композицию  $\chi(f(x))$ , где  $\chi(y)$  — характеристическая функция множества  $E = \{y \in \mathbb{R}^n : \sigma(y) = 0\}$  нулей функции  $\sigma$ . Тогда

$$\int_{A \setminus \Sigma_f} |J(x, f)| dx = \int_{\Omega \setminus \Sigma_f} \chi(f(x)) |J(x, f)| dx = \int_E \chi(y) \mathcal{N}(\Omega \setminus \Sigma_f; y, f) dy = 0,$$

так как мера множества  $E$  равна нулю (здесь  $\Sigma_f \subset \Omega$  — некоторое множество нулевой меры,  $\mathcal{N}(\Omega \setminus \Sigma_f; y, f) = \#\{x \in \Omega \setminus \Sigma_f : f(x) = y\}$  — функция кратности, или индикатриса Банаха, отображения  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ). Отсюда выводим, что  $J(x, f) = 0$  почти всюду на множестве  $A$ .  $\square$

Здесь и ниже мы применяем следующий вариант формулы замены переменной.

**Предложение 2** [3–6]. Пусть  $A \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество. Предположим, что отображение  $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$  имеет аппроксимативные частные производные на  $A$ . Тогда существует множество  $\Sigma_f \subset A$  нулевой меры такое, что для любой неотрицательной измеримой функции  $u : A \rightarrow \mathbb{R}$  верна формула замены переменной:

$$\int_A u(x) |J(x, f)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left( \sum_{x \in f^{-1}(y) \cap (A \setminus \Sigma_f)} u(x) \right) dy. \quad (2)$$

Если  $f$  удовлетворяет  $\mathcal{N}$ -свойству Лузина, то  $\Sigma_f = \emptyset$ .

Напомним основные факты теории весовых соболевских пространств. Весовое пространство Соболева  $L_q^1(\Omega, \theta)$ ,  $1 \leq q < \infty$ , состоит из локально суммируемых функций  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ , имеющих обобщенный градиент и конечную полунорму

$$\|f | L_q^1(\Omega, \theta)\| = \left( \int_{\Omega} |\nabla f|^q(x) \theta(x) dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Одно из важнейших свойств отображений с ограниченным  $(\theta, \sigma)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением сформулировано в следующем утверждении. Это утверждение является одной из мотиваций для изучения введенного в данной работе класса отображений.

Заметим, что функция искажения (1) может быть определена для всех  $1 \leq q \leq p \leq \infty$ . Напомним, что непрерывное отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  принадлежит классу  $\text{ACL}(\Omega)$ , если на почти всех линиях  $L_i$ , параллельных координатной оси  $x_i$ , отображение  $f$  абсолютно непрерывно на каждом компактном промежутке  $[\alpha, \beta] \subset L_i \cap \Omega$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

**Теорема 1.** *Гомеоморфизм  $f : (\Omega, \theta) \rightarrow (\Omega', \sigma)$  индуцирует ограниченный оператор*

$$f^* : L_p^1(\Omega', \sigma) \cap W_{\infty, \text{loc}}^1(\Omega') \rightarrow L_q^1(\Omega, \theta), \quad 1 \leq q \leq p < \infty, \quad (3)$$

однородных весовых пространств Соболева по правилу  $f^*(g) = g \circ f$  тогда и только тогда, когда

- 1)  $f \in \text{ACL}(\Omega)$ ;
- 2)  $f$  имеет конечное искажение;
- 3) функция локального  $(\theta, \sigma)$ -весового  $q$ -искажения:

$$\Omega \ni x \mapsto K_q^{\theta, \sigma}(x, f) = \begin{cases} \frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x)|Df(x)|}{\sigma^{\frac{1}{p}}(f(x))|J(x, f)|^{\frac{1}{p}}}, & \text{если } J(x, f) \neq 0, \\ 0 & \text{иначе,} \end{cases} \quad (4)$$

принадлежит классу  $L_{\varkappa}(\Omega)$ , где  $\varkappa$  находится из условия  $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$  ( $\varkappa = \infty$  при  $q = p$ ).

При этом норма  $\|f^*\|$  оператора (3) эквивалентна величине  $K_{q,p}^{\theta, \sigma}(f; \Omega) = \|K_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\|$  в следующем смысле:

$$\alpha_{p,q} \|K_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\| \leq \|f^*\| \leq \|K_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\|,$$

где  $\alpha_{p,q}$  — положительная постоянная.

Заметим, что в отличие от определения 3 отображение  $f$  в теореме 1 может иметь отрицательный якобиан.

Для доказательства теоремы 1 потребуются формулируемые ниже понятия и вспомогательные утверждения.

Для  $k \geq 0$ ,  $\delta \in (0, \infty]$  и  $A \subset \mathbb{R}^n$  определим величину

$$\mathcal{H}_\delta^k(A) = \frac{\omega_k}{2^k} \inf \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}} (\text{diam } S_i)^k : \text{diam } S_i < \delta, A \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i \right\},$$

где  $\omega_k = \frac{\pi^{\frac{k}{2}}}{\Gamma(\frac{k}{2} + 1)}$ , а нижняя грань берется по всем счетным покрытиям  $\{S_i\}$  множества  $A$ . Если множество  $A$  нельзя покрыть счетной совокупностью множеств указанного вида, то полагаем  $\mathcal{H}_\delta^k(A) = \infty$ . Предел  $\mathcal{H}^k(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^k(A)$  называется  $k$ -мерной мерой Хаусдорфа множества  $A$ . В пространстве  $\mathbb{R}^n$   $n$ -мерная мера Хаусдорфа множества  $A \subset \mathbb{R}^n$  совпадает с  $n$ -мерной мерой Лебега.

Отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  называется *аппроксимативно дифференцируемым* в точке  $x \in \Omega$ , если существует линейное отображение  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  такое, что

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{H}^n(\{y \in B(x, r) : |f(y) - f(x) - L(y - x)| > \varepsilon\})}{r^n} = 0$$

для любого  $\varepsilon > 0$ .

Известно [3, 7], что всякое отображение класса  $W_{1,\text{loc}}^1(\Omega)$  аппроксимативно дифференцируемо почти всюду.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.** Покажем, как из результатов работы [8], обобщающей более раннюю работу [9], получить теорему 1. В [8, утверждение 2.1] доказано, что если оператор (3) ограничен, то  $f \in \text{ACL}(\Omega)$ . Кроме того, в [8, теорема 2.3] установлено, что для ограниченности оператора (3) однородных весовых пространств Соболева, действующего по правилу  $f^*(g) = g \circ f$ , где  $f : \Omega \rightarrow \Omega'$  — произвольное непрерывное отображение, необходимо и достаточно, чтобы  $f$  принадлежало  $\text{ACL}(\Omega)$ , имело конечное искажение и величина

$$\Omega' \ni y \mapsto H_q^{\theta, \sigma}(y, f) = \begin{cases} \sigma^{-\frac{1}{p}}(y) \left( \sum_{x \in f^{-1}(y) \setminus (\Sigma_f \cup Z)} \frac{|Df|^q(x) \theta(x)}{|J(x, f)|} \right)^{\frac{1}{q}}, \\ 0, \quad \text{если } f^{-1}(y) \setminus (\Sigma_f \cup Z) = \emptyset, \end{cases} \quad (5)$$

принадлежала  $L_{\varkappa}(\Omega')$ , где  $\varkappa$  находится из условия  $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$  ( $\varkappa = \infty$  при  $q = p$ ). При этом  $\beta_{p,q} \|H_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\| \leq \|f^*\| \leq \|H_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\|$ , где  $\beta_{p,q}$  — положительная константа.

Если  $f$  — гомеоморфизм, то выражение для функции искажения  $H_q^{\theta, \sigma}(\cdot)$  упрощается, что позволяет сделать в интеграле замену переменной:

$$\begin{aligned} \|H_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\|^{\varkappa} &= \int_{\Omega' \setminus f(\Sigma_f)} \sigma^{-\frac{\varkappa}{p}}(y) \left( \frac{|Df|^q(f^{-1}(y)) \theta(f^{-1}(y))}{|J(f^{-1}(y), f)|} \right)^{\frac{\varkappa}{q}} dy \\ &= \int_{\Omega \setminus Z} \sigma^{-\frac{\varkappa}{p}}(f(x)) \left( \frac{|Df|^q(x) \theta(x)}{|J(x, f)|} \right)^{\frac{\varkappa}{q}} |J(x, f)| dx \\ &= \int_{\Omega \setminus Z} \left( \frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df|(x)}{\sigma^{\frac{1}{p}}(f(x)) |J(x, f)|^{\frac{1}{p}}} \right)^{\varkappa} dx = \|K_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega')\|^{\varkappa}. \quad (6) \end{aligned}$$

Последнее равенство доказывает теорему.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.** Говорят, что весовая функция  $\theta : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  удовлетворяет  $A_q$ -условию Макенхаупта,  $q \in (1, \infty)$ , если

$$\sup_{B \subset \mathbb{R}^n} \left( \frac{1}{|B|} \int_B \theta \right) \left( \frac{1}{|B|} \int_B \theta^{\frac{1}{1-q}} \right)^{q-1} < \infty,$$

где верхняя грань берется по всем шарам  $B \subset \mathbb{R}^n$ .

Если  $\theta \in A_q$ , то  $L_q^1(\Omega, \theta)$  — полное полунормированное пространство и в этом случае гладкие функции плотны в нем относительно соответствующей полунормы [10].

Если в условиях теоремы 1 весовая функция  $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$  ( $\theta : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ ) удовлетворяет  $A_p$ - ( $A_q$ )-условию Макенхаупта, то в силу [8] гомеоморфизм  $f : (\Omega, \theta) \rightarrow (\Omega', \sigma)$  индуцирует ограниченный оператор

$$f^* : L_p^1(\Omega', \sigma) \rightarrow L_q^1(\Omega, \theta), \quad 1 < q \leq p < \infty, \quad (7)$$

однородных весовых пространств Соболева по правилу  $f^*(g) = g \circ f$  тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:

- 1)  $f \in \text{ACL}(\Omega)$ ,
- 2)  $f$  имеет конечное искажение,
- 3) величина  $H_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f)$  принадлежит  $L_{\infty}(\Omega')$ .

В силу равенств (6) последние условия эквивалентны условиям 1 и 2 теоремы 1. Отметим, что условия Макенхаупта на весовую функцию нужны только для того, чтобы распространить по непрерывности оператор (3) до оператора (7) при  $1 < q \leq p < \infty$ .

В теории аналитических функций на комплексной плоскости известна следующая теорема Лиувилля: *ограниченная аналитическая функция на комплексной плоскости является константой*. Ю. Г. Решетняк доказал следующее ее обобщение: *ограниченное отображение с ограниченным искажением постоянно*.

В [11] доказано следующее обобщение теоремы Решетняка.

**Теорема 2** [11, следствие 2.12]. Пусть  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным искажением и  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n); W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$ . Тогда  $f$  — постоянное отображение.

Сформулируем еще несколько результатов из [11] о свойствах отображений с ограниченным искажением, обобщающих результаты классической теории функций. Первый из них — это теорема о затирании особенностей.

**Теорема 3** [11, теорема 2.9]. Пусть  $f : \Omega \setminus F \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным искажением,  $F \subset \Omega$  — замкнутое подмножество в  $\Omega$  такое, что  $\text{cap}(F; W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$ . Если  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus F); W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$ , то отображение  $f$  продолжается до непрерывного отображения  $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$ .

Здесь  $\overline{\mathbb{R}^n}$  — одноточечная компактификация пространства  $\mathbb{R}^n$ .

Второе утверждение представляет собой обобщение классической теоремы Сохоцкого — Вейерштрасса.

**Предложение 3** [11, 2.11]. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непостоянное отображение с ограниченным искажением и  $b$  — изолированная точка  $\partial\Omega$ . Также предположим, что  $f$  не имеет предела в точке  $b$ . Тогда

1)  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(U \setminus \{b\}); W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$  для любой окрестности  $U \subset \Omega \cup \{b\}$  точки  $b$ ;

2) существует  $\sigma$ -множество  $E \subset \overline{\mathbb{R}^n}$  емкости  $\text{cap}(E; W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$  такое, что  $N(z, f, U \setminus \{b\}) = \infty$  для любой точки  $z \in \overline{\mathbb{R}^n} \setminus E$  и любой окрестности  $U \subset \Omega \cup \{b\}$  точки  $b$ .

Заметим, что сформулированные выше результаты обобщались для невесовых отображений с ограниченным  $(p, q)$ -искажением в [12, 13] при  $n - 1 < p = q < n$  и в [14] при  $n - 1 < q \leq p \leq n$  в предположении, что отображение  $f$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина: образ множества меры нуль имеет нулевую меру.

Одна из целей настоящей работы — привести доказательство этих теорем для одновесовых отображений с ограниченным  $(p, q)$ -искажением без предположения об  $\mathcal{N}$ -свойстве Лузина для отображения  $f$ . Метод, позволяющий это сделать, основан на результатах из [15–18].

В §1 мы исследуем свойства двух перенесенных функций. Произвольной финитной функции  $u \in C_0^1(\Omega)$  сопоставляем две функции, определенные на

образе  $f(\Omega)$ : функцию

$$f(\Omega) \ni y \mapsto v(y) = \begin{cases} \sum_{x \in f^{-1}(y)} i(x, f)u(x), & y \in f(\text{supp } u), \\ 0, & y \notin f(\text{supp } u), \end{cases}$$

где  $i(x, f)$  — локальный индекс отображения  $f$  в точке  $x$ , и функцию

$$f(\Omega) \ni y \mapsto w(y) = \begin{cases} \sup_{x \in f^{-1}(y)} u(x), & y \in f(\text{supp } u), \\ 0, & y \notin f(\text{supp } u). \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что если  $f$  — квазиконформное отображение, то  $v(y) = w(y) = u(f^{-1}(y))$  и  $v, w \in L_n^1(f(\Omega))$ . Известно [11], что если  $f$  — отображение с ограниченным искажением, то функции  $v$  и  $w$  также принадлежат классу Соболева  $L_n^1(f(\Omega))$  и  $L_n^1$ -нормы функций  $v$  и  $w$  оцениваются через  $L_n^1$ -нормы функции  $u$ . Доказательство этого результата в [11] основывается в конечном итоге на классическом подходе к доказательству абсолютной непрерывности на почти всех линиях, установленном Д. Е. Меньшовым [19], и его обобщении в [20], а получение оценки в  $L_n^1(f(\Omega))$  для функций  $v$  и  $w$  существенно базируется на том, что мера образа точек ветвления нулевая [11, 21]. Следует отметить, что этот способ рассуждений и его модификации неоднократно применялись в различных работах (см., например, [12–14, 22–25]) при доказательствах абсолютной непрерывности функций и отображений и оценок на норму Соболева. Заметим, что возникающее в этих и других работах требование на отображение  $f$  обладать  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина обусловлено техническим ограничением, а именно необходимостью обеспечения того, чтобы образ множества точек ветвления имел нулевую меру.

В лемме 2 (лемме 8) следующего раздела мы доказываем, что функция  $v$  (соответственно  $w$ ) абсолютно непрерывна в области  $f(\Omega)$  на почти всех линиях, параллельных координатным осям, и  $\nabla v = 0$  ( $\nabla w = 0$ ) почти всюду на образе точек ветвления при условии, что  $f \in W_{q, \text{loc}}^1(\Omega)$ ,  $q > n - 1$ , — непрерывное открытое и дискретное отображение с конечным искажением:  $Df(x) = 0$  почти всюду на множестве  $Z = \{x \in \Omega : J(x, f) = 0\}$  нулей якобина. Доказательство лемм 2 и 8 базируется на работах [15–18] и не имеет ничего общего с описанным выше классическим подходом.

Заметим, что при  $q \in (n - 1, n)$  отображение  $f$  может и не обладать  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина (см. примеры в [26]).

Понятно, что обращение в нуль градиентов функций  $v$  и  $w$  на образе множества точек ветвления приводит к тому, что при оценке их нормы в пространстве Соболева интегрирование по образу точек ветвления можно не учитывать. Это наблюдение позволяет получить для функций  $v$  и  $w$  оценки их нормы в подходящих классах Соболева и вывести отсюда емкостные неравенства. Полученное в теореме 6 новое соотношение для емкости образа конденсатора применяется затем в § 2, 3 при обобщении теорем 2, 3 и предложения 3 на одновесовые отображения с ограниченным  $(p, q)$ -искажением.

Приведем емкостное неравенство теоремы 6 для случая, когда весовые функции  $\theta$  и  $\sigma$  тождественно равны единице. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ . Для конденсатора  $E = (A, C)$  в  $\Omega$ , у которого открытое множество  $A$  компактно вложено в  $\Omega$ , а  $C \subset A$  — компакт, имеем

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq K_{p,q}^{1,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r E)^{\frac{1}{r}}, \quad (8)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$  и  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ . Если  $n \leq q \leq p < \infty$ , то  $n-1 < s \leq r \leq n$  и получаем возможность изучать локальное поведение отображения  $f$ , выбирая подходящие конденсаторы. Например, полагая  $E = (B(x, R), B(x, \rho))$ , для  $\rho < n$  имеем  $\text{cap}_r E \leq \alpha|x-y|^{n-r}$  при  $|y-x| = \rho \leq R/2$ , а  $\text{cap}_s f(E) \geq \beta|f(x) - f(y)|^{n-s}$ , где  $\alpha, \beta > 0$  — некоторые постоянные, не зависящие от  $f$ . Отсюда возникает возможность оценить локальное поведение отображения  $f$ . Если, наоборот, устремить  $R \rightarrow \infty$ , то возникает возможность доказывать теоремы типа теоремы Лиувилля при условии, что  $\text{cap}_r E \rightarrow \infty$  при  $R \rightarrow \infty$ .

Далее рассматриваем только случай отображения с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением, т. е. когда  $\sigma \equiv 1$ . Для таких отображений в правой части формулы (8) вместо емкости  $\text{cap}_r E$  конденсатора  $E$  будет стоять весовая емкость  $\text{cap}_r^\omega E$ , где  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ , т. е. весовая функция  $\omega$  определяется по весовой функции  $\theta$  и, естественно, предполагается локально суммируемой. Отметим, что в случае  $n = 2$  данному условию удовлетворяет, например, весовая функция, удовлетворяющая  $A_q$ -условию Макенхаупта. Поэтому весовые функции  $\theta \in L_{1,\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ , для которых веса  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируемы, можно рассматривать как естественное обобщение класса Макенхаупта.

Заметим, что в ряде работ (см. библиографию в [25]) изучаются классы отображений, в которых соотношение вида  $\text{cap}_n f(E) \leq K \text{cap}_n^Q E$  для кольцевых конденсаторов  $E = (B(x, R), B(x, r)) \Subset \Omega$  и некоторой специальной весовой функции  $Q$  берется в качестве определения.

В § 2 мы применяем полученные емкостные оценки для вывода теорем типа теоремы Лиувилля, обобщающих сформулированную выше теорему 2.

В § 3 полученные емкостные оценки применяются для изучения свойств затираемости исследуемого класса отображений. Доказанные результаты обобщают сформулированные выше теорему 3 и предложение 3.

В § 4 полученные емкостные оценки применяются для вывода классифицирующих признаков римановых многообразий. Результаты этого параграфа обобщают результаты работы [13].

Постановку задачи и метод ее решения сформулировал С. К. Водопьянов, § 1, 2 написаны при участии А. Н. Байкина.

## § 1. Емкостные оценки

Далее полагаем весовую функцию  $\sigma$  тождественно равной единице. В данном параграфе доказаны оценки на емкость образов конденсаторов при действии отображений с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением.

**1.1. Свойства перенесенных функций.** Символом  $\Omega$  будем обозначать произвольную область (т. е. открытое связное множество) в  $\mathbb{R}^n$ . Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное отображение, а область  $U \Subset \Omega$  компактно вложена (т. е. область  $U$  ограничена и  $\bar{U} \subset \Omega$ ). Для  $y \notin f(\partial U)$  обозначим символом  $\mu(y, f, U)$  степень отображения  $f$  в точке  $y$  относительно  $U$ .

Определим локальный индекс отображения.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.** Рассмотрим непрерывное открытое и дискретное отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  и точку  $x \in \Omega$ . Тогда существует область  $V$ , содержащая точку  $x$ , такая, что  $\bar{V} \cap f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$ . Локальным индексом отображения  $f$  в точке  $x$  называется величина  $i(x, f) = \mu(f(x), f, V)$ .

Локальный индекс определен корректно и не зависит от рассматриваемой области  $V$  (см., например, [2, 11]).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное отображение. Будем говорить, что  $f$  сохраняет ориентацию, если  $\mu(y, f, D) > 0$  для любой области  $D \Subset \Omega$  и для любой точки  $y \in f(D) \setminus f(\partial D)$ .

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  с ограниченным  $(\theta, \sigma)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением сохраняет ориентацию, если  $q > n - 1$ . Действительно, если  $f$  — гомеоморфизм, то не может быть такого, чтобы  $J(x, f) = 0$  почти всюду в  $\Omega$ , так как в этом случае  $Df(x) = 0$  почти всюду и отображение  $f$  не могло бы быть открытым. Следовательно,  $J(x, f) > 0$  на множестве положительной меры и существует (см., например, [27, предложение 1]) точка  $x \in \Omega$  дифференцируемости отображения  $f$ , в которой дифференциал будет невырожденным, а якобиан положительным. Из известных свойств степени отображения вытекает, что  $f$  сохраняет ориентацию. Общий случай сводится к предыдущему, так как образ множества точек ветвления замкнут в  $f(\Omega)$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное открытое и дискретное отображение, сохраняющее ориентацию,  $\Lambda$  — произвольное положительное число. Для произвольной гладкой финитной функции  $u \in C_0^1(\Omega)$  определим перенесенную функцию  $v = f_*u : f(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  по правилу

$$f(\Omega) \ni y \mapsto v(y) = \begin{cases} \Lambda \sum_{x \in f^{-1}(y)} i(x, f)u(x), & y \in f(\text{supp } u), \\ 0, & y \notin f(\text{supp } u). \end{cases} \quad (9)$$

Здесь  $\Lambda$  — положительная постоянная, которая фиксируется позже.

Так как  $\text{supp } u$  — компактное множество в  $\Omega$ , а отображение  $f$  непрерывно и дискретно, сумма в (9) содержит лишь конечное число слагаемых, что обеспечивает корректность определения функции  $v$ .

В следующей лемме сформулируем топологические свойства перенесенной функции  $v$ , доказательство которых не зависит от дифференциальных свойств отображения  $f$ .

**Лемма 1** [11, 21]. *Функция  $v$  обладает следующими свойствами:*

- 1)  $\text{supp } v = f(\text{supp } u)$  — компактное множество;
- 2) функция  $v$  непрерывна.

Докажем основные дифференциальные свойства функции  $v$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8. Рассмотрим непрерывное отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Точка  $x \in \Omega$  называется *точкой ветвления* отображения  $f$ , если  $f$  не является гомеоморфизмом ни в какой окрестности точки  $x$ . Совокупность всех точек ветвления отображения  $f$  обозначается символом  $B_f$ .

**Лемма 2.** *Предположим, что  $f \in W_{q, \text{loc}}^1(\Omega)$ ,  $q > n - 1$ , — непрерывное, открытое и дискретное отображение с конечным искажением:  $Df(x) = 0$  почти всюду на  $Z = \{x \in \Omega : J(x, f) = 0\}$ . Тогда перенесенная функция  $v$  обладает свойством АСЛ на множестве  $f(\Omega)$ . Более того,  $\nabla v = 0$  почти всюду на множестве  $f(B_f)$ .*

Для доказательства леммы 2 потребуются формулируемые ниже понятия и вспомогательные утверждения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное, открытое и дискретное отображение. Область  $D \Subset \Omega$  называется *нормальной*, если  $f(\partial D) = \partial f(D)$ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10. *Нормальной окрестностью точки  $x \in \Omega$  называется нормальная область  $U \subset \Omega$  такая, что  $U \cap f^{-1}(f(x)) = \{x\}$ .*

Для непрерывного, открытого и дискретного отображения  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  и точки  $x \in \Omega$  обозначим символом  $U(x, r)$  компоненту связности  $f^{-1}(B(f(x), r))$ , содержащую  $x$ .

Для произвольного множества  $A \subset \overline{\mathbb{R}^n}$  введем обозначение  $\mathbf{C}A = \overline{\mathbb{R}^n} \setminus A$ , где  $\overline{\mathbb{R}^n} = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$  — одноточечная компактификация  $\mathbb{R}^n$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.** Область  $D \subset \mathbb{R}^n$  называется *кольцом*, если  $\mathbf{C}D$  имеет ровно две компоненты связности.

**Лемма 3** [11, лемма 4.1]. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное открытое и дискретное отображение. Тогда для любой точки  $x \in \Omega$  существует число  $\sigma_x > 0$  такое, что для всякого  $0 < r \leq \sigma_x$  верны следующие утверждения:

- 1)  $U(x, r)$  — нормальная окрестность точки  $x$ ;
- 2)  $U(x, r) = U(x, \sigma_x) \cap f^{-1}(B(f(x), r))$ ;
- 3) если  $r < \sigma_x$ , то  $\partial U(x, r) = U(x, \sigma_x) \cap f^{-1}(S(f(x), r))$ ;
- 4) множества  $\mathbf{C}U(x, r)$  и  $\mathbf{C}\overline{U}(x, r)$  связны;
- 5) область  $U(x, r) \setminus \overline{U}(x, t)$  — кольцо для любых  $0 < t < r \leq \sigma_x$ .

**ЗАМЕЧАНИЕ 2** [2]. Если  $x$  — точка дифференцируемости  $f$  и  $J(x, f) = 0$ , то  $x \in B_f$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.** Рассмотрим непрерывное отображение  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ . *Функцией кратности* называется отображение  $\mathbb{R}^n \ni y \mapsto N(y, f, D) = \#\{f^{-1}(y) \cap D\}$ ,  $D \subset \Omega$ . Кроме того, введем обозначение  $N(f, D) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} N(y, f, D)$ .

**Лемма 4** [11, предложение 4.10]. Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное, открытое и дискретное отображение, сохраняющее ориентацию. Тогда

- 1) если  $A \Subset \Omega$  — компакт в области  $\Omega$ , то  $N(f, A) < \infty$ ;
- 2) если  $U \Subset \Omega$  — область, то  $N(y, f, U) \leq \mu(y, f, U)$  для всех точек  $y \in \mathbf{C}f(\partial U)$  и  $N(y, f, U) = \mu(y, f, U)$  для всех точек  $y \in \mathbf{C}f(\partial U \cup (U \cap B_f))$ ;
- 3) если  $U$  — нормальная область, то  $N(f, U) = \mu(x, f, U)$  для всех точек  $x \in f(U)$ ;
- 4) если  $U$  — нормальная область, то для всех точек  $y \in f(U)$  выполняется  $\mu(y, f, U) = \sum_{j=1}^k i(x_j, f)$ , где  $k = N(y, f, U)$ , а  $\{x_1, \dots, x_k\} = f^{-1}(y) \cap U$ ;
- 5) для любой точки  $x \in \Omega$  существует окрестность  $V$  такая, что для любой точки  $x$  окрестности  $V \subset U$  выполняется  $i(x, f) = N(f, U)$ ;
- 6) точка  $x$  принадлежит  $B_f$ , если и только если  $i(x, f) \geq 2$ .

Отметим, что величину  $\mu(f, U) = \mu(x, f, U)$  для всех точек  $x \in f(U)$  в утверждении 3 последней теоремы можно определить только для нормальных областей.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное, открытое и дискретное отображение, сохраняющее ориентацию. Для  $x \in \Omega$  рассмотрим кривую  $\beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  такую, что  $\beta(a) = f(x)$ . Кривую  $\alpha : \Delta_c \rightarrow \Omega$ , где  $c \leq b$  и  $\Delta_c = [a, c]$  или  $\Delta_c = [a, b]$ , назовем *поднятием кривой  $\beta$  с началом в точке  $x$* , если  $\alpha(a) = x$  и  $f \circ \alpha = \beta|_{\Delta_c}$ . Кривая  $\alpha$  называется *максимальным поднятием кривой  $\beta$* , если область определения  $\alpha$  совпадает с  $[a, b]$ .

**Лемма 5** [11, следствие 3.4]. Пусть  $D$  — нормальная область для непрерывного, открытого и дискретного отображения  $f$ , сохраняющего ориентацию, и  $y \in f(D)$ . Обозначим  $f^{-1}(y) \cap D = \{x_1, \dots, x_k\}$ , где  $k = N(f, D)$ , причем каждая точка считается с кратностью, равной ее индексу  $i(x, f)$ . Если  $\beta : [a, b] \rightarrow f(D)$  — кривая такая, что  $\beta(a) = y$ , то

- 1) существуют максимальные поднятия  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  кривой  $\beta$  с началом в точках  $x_i, i = 1, \dots, k$ ;  
 2)  $\#\{l : a_l(t) = a_j(t)\} = i(a_j(t), f)$  для всех точек  $t \in [a, b]$  и любого  $j \in \{1, \dots, k\}$ ;  
 3)  $f^{-1}(\beta(t)) \cap D = \{\alpha_1(t), \dots, \alpha_k(t)\}$  для всех  $t \in [a, b]$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 2. Свойство непрерывности функции  $v$  сформулировано в лемме 1.

ШАГ 1. Достаточно доказать, что  $v$  — АСЛ-функция в некоторой окрестности каждой точки из  $\text{supp } v$ . Фиксируем  $y_0 \in \text{supp } v$ . Поскольку отображение  $f$  непрерывно и дискретно, а  $\text{supp } u$  — компакт, то пересечение  $f^{-1}(y_0) \cap \text{supp } u = \{q_1, \dots, q_s\}$  — конечное множество.

По леммам 3 и 4 существует  $r_0 > 0$  такое, что нормальные окрестности  $U(q_i, f, r_0), i = 1, \dots, s$ , не пересекаются. Выберем  $r_1 \leq r_0$  так, чтобы  $B(y_0, r_1) \cap f\left(D \setminus \bigcup_{i=1}^s U(q_i, f, r_0)\right) = \emptyset, D = \text{supp } u$ . Тогда компоненты связности  $f^{-1}(B(y_0, r_1))$ , пересекающие  $\text{supp } u$ , суть множества  $U(q_i, f, r_1), i = 1, \dots, s$ . Положим

$$U = \bigcup_{i=1}^s U(q_i, f, r_1) = \bigcup_{i=1}^s U_i, \quad \text{где } U_i = U(q_i, f, r_1).$$

Введем отображения  $\text{Pr}_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  и  $\text{pr}_j : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, i, j = 1, \dots, n$ , по следующим правилам:

$$\text{Pr}_i(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n), \quad \text{pr}_j(x_1, \dots, x_n) = x_j.$$

С помощью сдвига пространства можно добиться того, что  $y_0 = 0$ . Выделим  $j$ -ю координатную ось в пространстве  $\mathbb{R}^n$ . Рассмотрим  $n$ -мерный куб

$$Q = \{x = (x_1, \dots, x_n) : |x_l| \leq M, l = 1, \dots, n\} \subset B(y_0, r_1)$$

и проекцию

$$S = \text{Pr}_j Q = \{(x = (x_1, \dots, x_n) : x_j = 0, |x_l| \leq M, l = 1, \dots, n, l \neq j)\}.$$

Для любого  $z \in S$  зададим отрезок  $|\beta_z| = \{\beta_z(t) = z + te_j \mid t \in [-M, M]\}$ .

Рассмотрим множество  $f^{-1}(z - Me_j) \cap U_i = \{x_{i,1}, \dots, x_{i,k(i)}\}$ . По лемме 5 существуют максимальные поднятия  $\alpha_{i,k}$  кривой  $\beta_z$  с началом в точках  $x_{i,p}, i = 1, \dots, s, p = 1, \dots, k(i)$ .

Далее фиксируем произвольное  $i = 1, \dots, s$ .

Заметим, что отображение  $f$  имеет частные производные почти всюду. Следовательно, оно аппроксимативно дифференцируемо почти всюду [7]. Тогда в силу известного результата работ (см., например, [7; 3, теорема 3.1.8]) существует борелевское множество  $\Sigma \subset U_i$  нулевой  $\mathcal{H}^n$ -меры, вне которого  $f$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина. Пусть  $Z = \{x \in U_i \setminus \Sigma : J(x, f) = 0\}$ . С точностью до множества нулевой меры множество  $Z$  можно считать борелевским. При этом можно сделать так, что  $U_i \cap B_f \subset \Sigma \cup Z$ , поскольку в точке  $x \in B_f$  дифференцируемости отображения  $f$  дифференциал вырождается.

Дополнение  $U_i \setminus \Sigma$  можно представить в виде счетной совокупности дизъюнктивных измеримых множеств  $F_k, k \in \mathbb{N}$ , таких, что  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k = U_i \setminus \Sigma$  и отображение  $f|_{F_k} : F_k \rightarrow \mathbb{R}^n$  липшицево для всех  $k \in \mathbb{N}$  (см. [7; 3, теорема 3.1.8]). Каждое

множество  $F_k \setminus Z$  представимо в виде объединения счетной совокупности дизъюнктивных измеримых множеств  $F_{km}$ ,  $m \in \mathbb{N}$ , таких, что  $f|_{F_{km}} : F_{km} \rightarrow \mathbb{R}^n$  билипшицево [3, лемма 3.2.2]. В силу теоремы Радемахера [3, теорема 3.1.6] и теоремы Лебега о дифференцировании аддитивной функции [28, 29] множества  $F_{km}$  можно считать состоящими только из точек дифференцируемости отображения  $f|_{F_{km}} : F_{km} \rightarrow \mathbb{R}^n$  и точек плотности 1. Переобозначим  $\{F_{km}\}_{k,m \in \mathbb{N}}$  через  $\{E_l\}_{l \in \mathbb{N}}$ . Таким образом, имеем разложение

$$U_i = \Sigma \cup Z \cup \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l,$$

в котором все множества правой части дизъюнктивны. Ему соответствует разложение в образе  $f(U_i) = Z' \cup \Sigma' \cup \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E'_l$ , где  $Z' = f(Z)$ ,  $\Sigma' = f(\Sigma)$ ,  $E'_l = f(E_l)$ .

При этом очевидно имеем  $f(U_i \cap B_f) \subset \Sigma' \cup Z'$ .

ШАГ 2. Так как  $f$  — отображение с конечным искажением,  $Df(x) = 0$  для почти всех  $x \in Z$ . Применяя формулу коплощади [3, теорема 3.2.3] для липшицева отображения  $\text{Pr}_j \circ f : F_k \rightarrow \mathbb{R}^n$  и производя суммирование по  $k \in \mathbb{N}$ , получаем

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{Z \cap F_k} \mathcal{J}(x, \text{Pr}_j \circ f) dx = \sum_{k \in \mathbb{N}} \int_{\text{Pr}_j \circ f(Z \cap F_k)} \mathcal{H}^1(\{x \in Z \cap F_k : \text{Pr}_j \circ f(x) = z\}) dz \\ &= \int_{\text{Pr}_j(\Sigma')} \left( \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{H}^1(\{x \in Z \cap F_k : \text{Pr}_j \circ f(x) = z\}) \right) dz \\ &= \int_{\text{Pr}_j(\Sigma')} \mathcal{H}^1(\{x \in Z : \text{Pr}_j \circ f(x) = z\}) dz = \int_{\text{Pr}_j(\Sigma')} \mathcal{H}^1 \left( \bigcup_{p=1}^{k(i)} \alpha_{i,p}^{z}(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap \Sigma') \right) dz \\ &= \sum_{p=1}^{k(i)} \int_{\text{Pr}_j(\Sigma')} \mathcal{H}^1(\alpha_{i,p}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap \Sigma')) dz, \end{aligned}$$

так как  $f^{-1}(|\beta_z|) = \bigcup_{p=1}^{k(i)} |\alpha_{i,p}^z|$ , где  $\alpha_{i,p}^z$  — одно из поднятий кривой  $\beta_z$  в нормальной окрестности  $U_i$ . Отсюда выводим, что

$$\mathcal{H}^1(\text{pr}_m \circ \alpha_{i,p}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap \Sigma')) = 0, \quad m = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, k(i), \quad (10)$$

для  $\mathcal{H}^{n-1}$ -почти любого  $z \in \text{Pr}_j(\Sigma')$ .

ШАГ 3. Для фиксированных  $m, j = 1, \dots, n$  рассмотрим измеримое множество

$$\begin{aligned} T &= \{(t, z) : t \in \text{pr}_m(\Sigma), z \in (\text{Pr}_j \circ f)(\text{pr}_m^{-1}(t) \cap \Sigma)\} \\ &= \left\{ (t, z) : z \in (\text{Pr}_j \circ f)(\Sigma), t \in \text{pr}_m \left( \bigcup_{l=1}^{k(i)} \alpha_{i,l}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap \Sigma') \right) \right\}, \end{aligned}$$

$m = 1, \dots, n$ . Так как  $f \in W_{q, \text{loc}}^1(\Omega)$  при  $q > n - 1$ , для  $\mathcal{H}^1$ -почти всех  $x_j \in \text{pr}_j(\Omega)$  ограничение  $f$  на  $\text{pr}_j^{-1}(x_j) \cap \Omega$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина относительно  $\mathcal{H}^{n-1}$ -меры Хаусдорфа:  $\mathcal{H}^{n-1}(f(A)) = 0$ , если  $\mathcal{H}^{n-1}(A) = 0$ , где

$A \subset \text{pr}_j^{-1}(x_j) \cap \Omega$  (см. [6, 30]). По теореме Тоннели выводим

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\text{pr}_m(\Sigma)} d\mathcal{H}^1(t) \int_{\text{Pr}_j \circ f(\text{pr}_m^{-1}(t) \cap \Sigma)} d\mathcal{H}^{n-1}(z) \\ &= \int_{\text{Pr}_j \circ f(\Sigma)} d\mathcal{H}^{n-1}(z) \int_{\text{pr}_m\left(\bigcup_{p=1}^{k(i)} \alpha_{i,p}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap Z')\right)} d\mathcal{H}^1(t) \\ &\geq \int_{\text{Pr}_j \circ f(\Sigma)} d\mathcal{H}^{n-1}(z) \int_{\text{pr}_m(\alpha_{i,l}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap Z'))} d\mathcal{H}^1(t). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\mathcal{H}^1(\text{pr}_m(\alpha_{i,l}^z(\text{Pr}_j^{-1}(z) \cap Z'))) = 0, \quad m = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, k(i), \quad (11)$$

для  $\mathcal{H}^{n-1}$ -почти любого  $z \in \text{Pr}_j(Z')$ .

Обозначим символом  $\psi_l : E'_l \rightarrow E_l$  отображение, обратное к  $f : E_l \rightarrow E'_l$ . Заметим, что на пересечении  $E'_l \cap (\{z\} \times [-M, M])$  функция  $\text{pr}_m \circ \alpha_{i,p}^z$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина, так как  $\psi_l \in \text{Lip}(E'_l)$ . Применяя соотношение между частной производной и полным дифференциалом, выводим

$$\begin{aligned} &\int_{\{z\} \times [-M, M] \setminus (Z' \cup \Sigma')} \left| \frac{\partial}{\partial y_j} (\text{pr}_m \circ \alpha_{i,p}^z)(y_j) \right| dy_j \\ &\leq \sum_{l \in \mathbb{N}} \int_{\{z\} \times [-M, M] \cap E'_l} |D(\text{pr}_m \circ \psi_l)(y_j)| dy_j \\ &\leq C \sum_{l \in \mathbb{N}} \int_{\{z\} \times [-M, M] \cap E'_l} |D\psi_l(y_j)| dy_j. \quad (12) \end{aligned}$$

С другой стороны, поскольку  $f \in W_{q, \text{loc}}^1(\Omega)$ ,  $q > n - 1$ , имеем

$$\begin{aligned} \sum_{l \in \mathbb{N}} \int_{E'_l} |D\psi_l(y)| dy &\leq \sum_{l \in \mathbb{N}} \int_{E'_l} |\text{adj } Df(\psi_l(y))| J(y, \psi_l) dy \\ &\leq \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l} |\text{adj } Df(x)| dx \leq \int_{U_i} |\text{adj } Df(x)| dx < \infty. \quad (13) \end{aligned}$$

Из (12) и (13) по теореме Фубини получаем, что

$$\sum_{l \in \mathbb{N}} \int_{\{z\} \times [-M, M] \cap E'_l} |D\psi_l(y_j)| dy_j < \infty \quad (14)$$

для почти всех  $z \in S$ .

ШАГ 4. Фиксируем точку  $z \in S$ , для которой выполнены условия (10), (11) и (14). Положим

$$A = \{z\} \times [-M, M] \setminus (Z' \cup \Sigma'), \quad B = \{z\} \times [-M, M] \cap (Z' \cup \Sigma')$$

и применим к функции  $\text{pr}_m \circ \alpha_{i,l}^z$  следующее утверждение, альтернативное теореме Бари и теореме Банаха — Зарецкого.

**Лемма 6** [15, 16]. Пусть функция  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и  $[a, b] = A \cup B$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , где  $A$  и  $B$  — борелевские множества такие, что

- 1)  $\mathcal{H}^1(\psi(B)) = 0$  и функция  $\psi : A \rightarrow \mathbb{R}$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина на множестве  $A$ :  $\mathcal{H}^1(\psi(E)) = 0$  для любого множества  $E \subset A$  нулевой  $\mathcal{H}^1$ -меры;
- 2)  $\psi(t)$  имеет аппроксимативную производную  $\text{ар } \psi'(t)$  почти всюду на  $A$ ;
- 3)  $\text{ар } \psi'(t) \in L_1(A)$ .

Тогда функция  $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  абсолютно непрерывна, а ее обычная производная  $\psi'(t)$  равна  $\text{ар } \psi'(t)$  для почти всех  $t \in A$  и  $\psi'(t) = 0$  для почти всех  $t \in B$ .

Таким образом, функция  $\text{rg}_m \circ \alpha_{i,l}^z$ , а следовательно, и  $\alpha_{i,l}^z$  абсолютно непрерывны на  $\{z\} \times [-M, M]$ , при этом

$$\frac{d}{dt} \alpha_{i,l}^z(t) = 0 \quad \text{для почти всех } t \in (\{z\} \times [-M, M]) \cap (Z' \cup \Sigma'). \quad (15)$$

Для доказательства того, что  $v \in \text{ACL}$ , достаточно показать, что  $v$  абсолютно непрерывна на отрезке  $|\beta_z|$  для почти всех  $z \in S$ . Применяя последовательно пп. 1–3 леммы 5, убеждаемся, что в каждой точке  $x = \alpha_{i,l}^z(t) \in f^{-1}(|\beta_z|)$  пересекается ровно  $i(x, f)$  кривых  $\alpha_{i,l}^z(t)$ . Поэтому для  $y \in \beta_z$  имеем

$$v(y) = \Lambda \sum_{x \in f^{-1}(y)} i(x, f) u(x) = \Lambda \sum_{i=1}^s \sum_{l=1}^{k(i)} u \circ \alpha_{i,l}^z \circ \beta_z^{-1}(y). \quad (16)$$

Так как для почти всех  $z$  кривая  $\alpha_{i,l}^z \circ \beta_z^{-1}(y)$  абсолютно непрерывна относительно  $y \in \beta_z$ , то и функция  $v(y)$  абсолютно непрерывна относительно  $y \in \beta_z$  для почти всех  $z$ .

Более того, ввиду  $f(B_f) \subset \Sigma' \cup Z'$  из (15) имеем  $\nabla v(y) = 0$  для почти всех  $y \in f(B_f)$ .  $\square$

**Замечание 3.** Абсолютная непрерывность функции  $\alpha_{i,l}^z$  в доказательстве леммы 2 при  $q = p = n$ ,  $\theta \equiv 1$  другим методом, использующим результаты работы [31], установлена в [20].

Изложенную конструкцию можно применять для описания свойств более широкого класса перенесенных объектов. Рассмотрим, например, наряду с (9) другую перенесенную функцию.

**Определение 14.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непрерывное открытое и дискретное отображение, сохраняющее ориентацию. Для произвольной гладкой финитной функции  $u \in C_0^1(\Omega)$  определим *перенесенную функцию*  $w : f(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  по правилу

$$f(\Omega) \ni y \mapsto w(y) = \begin{cases} \sup_{x \in f^{-1}(y)} u(x), & y \in f(\text{supp } u), \\ 0, & y \notin f(\text{supp } u). \end{cases} \quad (17)$$

В следующей лемме сформулирован аналог леммы 1 о топологических свойствах перенесенной функции  $w$ , доказательство которых не зависит от дифференциальных свойств отображения  $f$ .

**Лемма 7** [31]. Функция  $w$  обладает следующими свойствами:

- 1)  $\text{supp } w = f(\text{supp } u)$  — компактное множество;
- 2) она непрерывна.

Основные дифференциальные свойства функции  $w$  сформулированы в следующем утверждении.

**Лемма 8.** Предположим, что  $f \in W_{q,\text{loc}}^1(\Omega)$ ,  $q > n - 1$ , — непрерывное, открытое и дискретное отображение с конечным искажением:  $Df(x) = 0$  почти всюду на  $Z = \{x \in \Omega : J(x, f) = 0\}$ . Тогда перенесенная функция  $w$  обладает свойством ACL на множестве  $f(\Omega)$ . Более того,  $\nabla w = 0$  почти всюду на множестве  $f(B_f)$ .

**Доказательство.** Доказательство этого утверждения основано на рассуждениях леммы 7 и представлении (16), с помощью которого значение функции  $w$  для  $y \in \beta_z$  можно записать следующим образом:

$$w(y) = \max_{x \in f^{-1}(y)} u(x) = \max_{i,l} u \circ \alpha_{i,l}^z \circ \beta^{-1}(y). \quad \square \quad (18)$$

Так как для почти всех  $z \in S$  кривая  $\beta_z \ni y \mapsto \alpha_{i,l}^z \circ \beta^{-1}(y)$  абсолютно непрерывна для всех значений  $i$  и  $l$ , функция  $w$  абсолютно непрерывна на почти всех линиях. Кроме того,  $\nabla w = 0$  почти всюду на множестве  $f(B_f)$ .

**1.2. Оценки для перенесенных функций.** Сформулируем одно из основных свойств  $(p, q)$ -квазиконформных гомеоморфизмов.

**Лемма 9.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \Omega'$  — гомеоморфизм с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Тогда обратный гомеоморфизм  $f^{-1}$  индуцирует по правилу замены переменных ограниченный оператор

$$(f^{-1})^* : L_r^1(\Omega, \omega) \cap W_{\infty,\text{loc}}^1(\Omega) \rightarrow L_s^1(\Omega'),$$

где  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ . Более того,  $\|(f^{-1})^*\| \leq (K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega))^{n-1}$ .

**Доказательство.** В силу [17, теорема 4] отображение  $f^{-1}$  принадлежит  $W_{1,\text{loc}}^1(\Omega')$  и имеет конечное искажение. Для доказательства леммы применим теорему 1: остается проверить, что  $K_s^{1,\omega}(\cdot, f^{-1}) \in L_{\varkappa'}(\Omega')$ , где  $\frac{1}{\varkappa'} = \frac{1}{s} - \frac{1}{r}$ . Используя формулу замены переменной, а также учитывая соотношения

$$Df^{-1}(y) = \frac{\text{adj } Df(f^{-1}(y))}{J(f^{-1}(y), f)}, \quad |\text{adj } Df|(x) \leq |Df|^{n-1}(x)$$

и  $\varkappa'(n-1) = \varkappa$ , выводим

$$\begin{aligned} \|K_s^{1,\omega}(\cdot, f^{-1}) | L_{\varkappa'}(\Omega')\|^{\varkappa'} &= \int_{\Omega' \setminus (\Sigma' \cup Z')} \left( \omega^{-\frac{1}{r}}(f^{-1}(y)) \frac{|Df^{-1}|(y)}{|J(y, f^{-1})|^{\frac{1}{r}}} \right)^{\varkappa'} dy \\ &\leq \int_{\Omega \setminus Z} \left( \omega^{-\frac{1}{r}}(x) \frac{|Df|^{n-1}(x)}{|J(x, f)|^{1-\frac{1}{r}}} \right)^{\varkappa'} |J(x, f)| dx \\ &= \int_{\Omega \setminus (\Sigma \cup Z)} \left( \frac{|Df|(x) \omega^{-\frac{1}{r(n-1)}}(x)}{|J(x, f)|^{\frac{r-1}{r(n-1)}}} \right)^{\varkappa'(n-1)} |J(x, f)| dx \\ &= \int_{\Omega \setminus (\Sigma \cup Z)} \left( \frac{|Df|(x) \theta^{\frac{1}{q}}(x)}{|J(x, f)|^{\frac{1}{p}}} \right)^{\varkappa} dx = (K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega))^{\varkappa'(n-1)} < \infty. \quad \square \end{aligned}$$

**Лемма 10.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , и  $y_0 \in \text{supp } v \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$ . Тогда существует окрестность  $V_0$  точки  $y_0$  такая, что для любой связной окрестности  $V \subset V_0$  точки  $y_0$  выполнено

- 1)  $V \cap f(\text{supp } u \cap B_f) = \emptyset$ ;
- 2) число компонент связности  $f^{-1}(V)$ , пересекающих  $\text{supp } u$ , конечно; обозначим их через  $D_1, \dots, D_k$ ;
- 3) сужение  $f|_{D_i} = f_i : D_i \rightarrow V$ ,  $i = 1, \dots, k$ , — гомеоморфизм; при этом обратный гомеоморфизм  $g_i = f_i^{-1} : V \rightarrow D_i$  индуцирует ограниченный оператор  $(g_i)^* : L_r^1(D_i, \omega) \rightarrow L_s^1(V)$ , где  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x) \in L_{1,\text{loc}}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В силу дискретности отображения  $f$  выберем окрестности  $U_1, U_2, \dots, U_k$  точек  $f^{-1}(y_0) \cap \text{supp } u$  такие, что  $\bar{U}_i \Subset \Omega$  и сужение  $f|_{\bar{U}_i}$  инъективно.

Покажем, что

$$V_0 = \left( \bigcap_{i=1}^k f(U_i) \right) \setminus f \left( \text{supp } u \setminus \bigcup_{i=1}^k U_i \right)$$

— требуемая окрестность.

Пусть  $V \subset V_0$  — связная окрестность точки  $x_0$ . Утверждение п. 1 следует из того, что  $U_i$  не пересекает  $B_f$  для всех  $i = 1, \dots, k$ .

Если компонента связности  $D$  прообраза  $f^{-1}(V)$  пересекает  $\text{supp } u$ , то она пересекает одну из окрестностей  $U_i$ . В силу инъективности сужения  $f|_{\bar{U}_i}$  имеем  $V_0 \cap f(\partial U_i) = \emptyset$ , а значит,  $D \cap \partial U_i = \emptyset$ . Отсюда получаем, что  $D \subset U_i$ . Кроме того, ровно одна  $D$  лежит в  $U_i$ ,  $i = 1, \dots, k$ , откуда следуют утверждения п. 2. Применяя лемму 9 к  $g_i : V \rightarrow D_i$ , получаем п. 3.  $\square$

**Теорема 4.** Пусть  $\Omega$  — область в  $\mathbb{R}^n$  и  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Для перенесенной функции  $v = f_* u : f(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  и любой области  $D \Subset \Omega$  такой, что  $\text{supp } u \subset D$ , верна оценка

$$\|f_* u \mid L_s^1(f(D))\| \leq \Lambda N(f, D)^{\frac{s-1}{s}} (K_{q,p}^{\theta,1}(f; D))^{n-1} \|u \mid L_r^1(D, \omega)\|, \quad (19)$$

где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $u \in C_0^1(\Omega)$  — произвольная гладкая финитная функция. Построим по ней перенесенную функцию (9):  $v = f_* u$ . Заметим, что  $\nabla v = 0$  вне  $\text{supp } v$ , а также  $\nabla v = 0$  на  $f(B_f)$  почти всюду в силу леммы 2. Поэтому интегрирование по  $f(D)$  в левой части (19) сводится к интегрированию по  $(f(D) \cap \text{supp } v) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$ .

Для произвольной точки  $y \in \text{supp } v \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$  найдем окрестность  $V_0(y)$ , определенную в лемме 10. Рассмотрим семейство шаров

$$\{B(y, r) \mid B(y, r) \subset V_0(y), y \in (f(D) \cap \text{supp } v) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)\},$$

образующее покрытие Витали множества  $(f(D) \cap \text{supp } v) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$ . Тогда по теореме Витали можно выделить не более чем счетное семейство  $\{B_1, B_2, \dots\}$



дизъюнктных шаров, покрывающее  $(f(D) \cap \text{supp } v) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$  с точностью до множества нулевой меры. Следовательно,

$$\int_{f(D)} |\nabla v|^s dz = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{B_j} |\nabla v|^s dz, \quad (20)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ .

Рассмотрим отдельный шар  $B_j$ , и пусть  $g_i : B_j \rightarrow W_i$ ,  $i = 1, \dots, k(j)$ , обозначает обратное отображение, определенное свойством 3 леммы 10. По определению перенесенной функции  $v$  для точек  $y \in B_j$  выводим

$$v(y) = \sum_{i=1}^{k(j)} u(g_i(y)) = \sum_{i=1}^{k(j)} g_i^*(u)(y).$$

На основании вышесказанного, применяя лемму 9 при  $p = q$ , с учетом  $k(j) \leq N(f, D)$  получаем

$$\begin{aligned} \|v\|_{L_s^1(B_j)}^s &= \int_{B_j} |\nabla v|^s(y) dy \leq \Lambda^s \int_{B_j} \left( \sum_{i=1}^{k(j)} |\nabla(g_i^*(u))|(y) \right)^s dy \\ &= \Lambda^s k(j)^{s-1} \sum_{i=1}^{k(j)} \int_{B_j} |\nabla(g_i^*(u))|^s(y) dy \quad (21) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \Lambda^s N(f, D)^{s-1} \sum_{i=1}^{k(j)} K_{p,p}^{\theta,1}(f; g_i(B_j))^{s(n-1)} \int_{g_i(B_j)} |\nabla u|^s(x) \omega(x) dx \\ &\leq \Lambda^s N(f, D)^{s-1} K_{p,p}^{\theta,1}(f; f^{-1}(B_j))^{s(n-1)} \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^s(x) \omega(x) dx. \quad (22) \end{aligned}$$

Если  $q < p$ , то, применяя дважды неравенство Гёльдера, из (21) с учетом леммы 9 последовательно выводим

$$\begin{aligned} &\left( \int_{B_j} |\nabla v|^s dy \right)^{\frac{1}{s}} \\ &\leq \Lambda N(f, D)^{\frac{s-1}{s}} \left[ \sum_{i=1}^{k(j)} \left( \int_{g_i(B_j)} K_q^{\theta,1}(x; f)^{\frac{pq}{p-q}} dx \right)^{\frac{r-s}{r}} \left( \int_{g_i(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \right]^{\frac{1}{s}} \\ &\leq \Lambda N(f, D)^{\frac{s-1}{s}} \left[ \left( \sum_{i=1}^{k(j)} \int_{g_i(B_j)} K_q^{\theta,1}(x; f)^{\frac{pq}{p-q}} dx \right)^{\frac{r-s}{r}} \right. \\ &\quad \left. \times \left( \sum_{i=1}^{k(j)} \int_{g_i(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \right]^{\frac{1}{s}} \\ &\leq \Lambda N(f, D)^{\frac{s-1}{s}} \|K_q^{\theta,1}(\cdot; f) \| L_{\frac{pq}{p-q}}(f^{-1}(B_j))\|^{n-1} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{r}}, \quad (23) \end{aligned}$$

где  $\frac{rs}{r-s} = \frac{pq}{(p-q)(n-1)}$ .

Из (20), (22) и (23) имеем

$$\begin{aligned} \int_{f(D)} |\nabla v|^s(y) dy &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_{B_j} |\nabla v|^s dz \\ &\leq \Lambda^s N(f, D)^{s-1} \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(\cdot; f) | L_{\frac{pq}{p-q}}(f^{-1}(B_j))\|^{s(n-1)} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}}. \end{aligned}$$

Применяя неравенство Гёльдера, окончательно получаем

$$\begin{aligned} \int_{f(D)} |\nabla v|^s dz &\leq \Lambda^s (N(f, D))^{s-1} \\ &\times \left( \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(\cdot; f) | L_{\frac{pq}{p-q}}(f^{-1}(B_j))\|^{\frac{rs}{r-s}(n-1)} \right)^{\frac{r-s}{r}} \left( \sum_{j=1}^{\infty} \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \\ &= \Lambda^s (N(f, D))^{s-1} \left( \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(\cdot; f) | L_{\frac{pq}{p-q}}(f^{-1}(B_j))\|^{\frac{pq}{p-q}} \right)^{\frac{r-s}{r}} \\ &\quad \times \left( \sum_{j=1}^{\infty} \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \leq \Lambda^s (N(f, D))^{s-1} \\ &\quad \times \left\| K_q^{\theta,1}(\cdot; f) | L_{\frac{pq}{p-q}} \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} f^{-1}(B_j) \right) \right\|^{\frac{pq}{p-q} \frac{r-s}{r}} \left( \int_{\bigcup_{j=1}^{\infty} f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \\ &\leq \Lambda^s (N(f, D))^{s-1} (K_{q,p}^{\theta,1}(f; D))^{s(n-1)} \left( \int_D |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}}. \quad \square \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Теорема 4 при  $q = p = n$ ,  $\theta \equiv 1$  другим способом доказана в [21, 32].

**Теорема 5.** Пусть  $\Omega$  — область в  $\mathbb{R}^n$  и  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Для перенесенной функции  $w : f(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  (заданной формулой (17)) и для любой области  $D \in \Omega$  такой, что  $\text{supp } u \subset D$ , верна оценка

$$\left( \int_{f(D)} |\nabla w|^s dy \right)^{\frac{1}{s}} \leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} \left( \int_D |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{r}}, \quad (24)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x) \in L_{1,\text{loc}}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приведем основные отличия сравнительно с доказательством теоремы 4. Отметим прежде всего, что теперь мы базируемся на леммах 7 и 8, в которых сформулированы необходимые дифференциальные свойства функции  $w$ .

Докажем соотношение (24). Заметим, что  $\nabla w = 0$  вне  $\text{supp } w$ , а также  $\nabla w = 0$  на  $f(B_f)$  почти всюду в силу леммы 8. Поэтому ниже интегрирование по  $f(D)$  сводится к интегрированию по  $(f(D) \cap \text{supp } w) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$ .

Для произвольной точки  $x \in \text{supp } w \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$  найдем окрестность  $V_0(x)$ , определенную в лемме 10. Рассмотрим семейство шаров  $\{B(z, r) : B(z, r) \subset V_0(x), z \in (f(D) \cap \text{supp } w) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)\}$ , образующее покрытие Витали множества  $(f(D) \cap \text{supp } w) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$ . Тогда по теореме Витали можно выделить счетное семейство дизъюнктивных шаров  $\{B_1, B_2, \dots\}$ , покрывающее  $(f(D) \cap \text{supp } w) \setminus f(\text{supp } u \cap B_f)$  с точностью до множества нулевой меры. Отсюда получаем

$$\int_{f(D)} |\nabla w|^s dy = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{B_j} |\nabla w|^s dy,$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ .

Рассмотрим отдельный шар  $B_j$ , и пусть  $g_i : B_j \rightarrow W_i$ ,  $i = 1, \dots, k(j)$ , обозначает обратное отображение, определенное свойством 3 леммы 10. Используя ограниченность оператора  $(g_i)^* : L_r^1(W_i) \rightarrow L_s^1(B_j)$ , получаем

$$\begin{aligned} & \left( \int_{B_j} |\nabla w|^s dy \right)^{\frac{1}{s}} \\ & \leq \begin{cases} K_p^{\theta,1}(f; f^{-1}(B_j))^{n-1} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{r}} & \text{при } q = p, \\ \|K_q^{\theta,1}(x; f) \mid L_{\varkappa}(f^{-1}(B_j))\|^{n-1} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{r}} & \text{при } q < p. \end{cases} \end{aligned}$$

Также можно предполагать, что  $W_i \Subset D$ . Поэтому

$$\begin{aligned} \int_{f(D)} |\nabla w|^s dy &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_{B_j} |\nabla w|^s dy \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(x; f) \mid L_{\varkappa}(f^{-1}(B_j))\|^{s(n-1)} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}}. \end{aligned}$$

Применяя неравенство Гёльдера при  $q < p$ , имеем

$$\begin{aligned} & \int_{f(D)} |\nabla w|^s dy \\ & \leq \left( \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(x; f) \mid L_{\varkappa}(f^{-1}(B_j))\|^{\frac{r \cdot s}{r-s}(n-1)} \right)^{\frac{r-s}{s}} \left( \sum_{j=1}^{\infty} \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \\ & \leq \left( \sum_{j=1}^{\infty} \|K_q^{\theta,1}(x; f) \mid L_{\varkappa}(f^{-1}(B_j))\|^{\frac{pq}{p-q}} \right)^{\frac{r-s}{r}} \left( \sum_{j=1}^{\infty} \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \\ & \leq \|K_q^{\theta,1}(x; f) \mid L_{\varkappa}(D \setminus B_f)\|^{\frac{pq}{p-q} \frac{r-s}{r}} \left( \int_{D \setminus B_f} |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}} \end{aligned}$$

$$\leq (K_{q,p}^{\theta,1}(f; D))^{s(n-1)} \left( \int_D |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{s}{r}}.$$

Заметим, что результат предыдущих неравенств справедлив также и при  $q = p$ .  $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Теорема 5 при  $q = p = n$ ,  $\theta \equiv 1$  другим способом доказана в [31].

**1.3. Оценки для емкости.** В весовом пространстве Соболева можно определить емкость конденсатора следующим образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 15. Упорядоченная тройка  $E = (F_0, F_1; D)$  непустых множеств, где  $D$  — открытое множество в  $\mathbb{R}^n$ , а  $F_1$  и  $F_0$  — замкнутые подмножества  $\bar{D}$ , называется конденсатором в  $D \subset \mathbb{R}^n$ . Величина

$$\text{cap}_p^\omega(E) = \text{cap}_p^\omega(F_0, F_1; D) = \inf \int_D |\nabla v|^p(x) \omega(x) dx,$$

где инфимум берется по всем функциям  $v \in C(D) \cap W_\infty^1(D) \cap L_p^1(D, \omega)$  таким, что  $v \geq 1$  ( $v \leq 0$ ) в некоторой окрестности множества  $F_1$  ( $F_0$ ), называется  $\omega$ -весовой  $p$ -емкостью конденсатора  $E = (F_0, F_1; D)$ .

Если  $U$  — открытое множество,  $C$  — компакт в  $U$ , то конденсатор  $E = (\partial U, C; U)$  будем обозначать символом  $E = (U, C)$ .

Если  $\omega \equiv 1$ , то допустимыми для определения емкости мы рассматриваем функции из более широкого класса:  $v \in C(D) \cap L_p^1(D)$ .

Из теоремы 4 выводим

**Следствие 1.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Если

1)  $E = (A, C)$  — конденсатор в  $\Omega$  такой, что  $A \Subset \Omega$ ,  $C$  — компакт в  $A$ , то

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq \frac{(K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega))^{n-1} (N(f, A))^{(s-1)/s}}{M(f, C)} (\text{cap}_r^\omega E)^{\frac{1}{r}}, \quad (25)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$  и  $M(f, C) = \inf_{x \in f(C)} \sum_{z \in f^{-1}(x) \cap C} i(z, f)$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ ;

2)  $E = (A, C)$  — конденсатор в  $\Omega$  такой, что  $A \Subset \Omega$  — нормальная область, а  $C$  — компакт в  $A$ , то

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq \frac{(K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega))^{n-1}}{(N(f, A))^{\frac{1}{s}}} (\text{cap}_r^\omega E)^{\frac{1}{r}}, \quad (26)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ , и  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1. В силу леммы 4 имеем  $N(f, A) < \infty$ . В определении перенесенной функции положим  $\Lambda = \frac{1}{M(f, C)}$ . Возьмем произвольную допустимую функцию  $u$  для конденсатора  $E = (A, C)$ . Тогда для перенесенной

функции имеем  $v(x) \geq 1$  в точках  $x \in f(C)$ . Действительно, пусть  $x \in f(C)$  и  $f^{-1}(x) \cap C = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ . Тогда

$$\begin{aligned} v(x) &= \frac{1}{M(f, C)} \sum_{z \in f^{-1}(x)} i(z, f)u(z) \geq \frac{1}{M(f, C)} \sum_{l=1}^k i(z_l, f)u(z_l) \\ &\geq \frac{1}{M(f, C)} \sum_{l=1}^k i(z_l, f) \geq 1, \end{aligned}$$

так как  $u(z_l) \geq 1$ .

Из теоремы 4 выводим, что  $v(x)$  — допустимая функция для конденсатора  $f(E) = (f(A), f(C))$ . Отсюда получаем

$$\begin{aligned} (\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} &\leq \left( \int_{f(A)} |\nabla v|^s dx \right)^{\frac{1}{s}} \\ &\leq \frac{(K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega))^{n-1} (N(f, A))^{(s-1)/s}}{M(f, C)} \left( \int_A |\nabla u|^r \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{r}}. \end{aligned}$$

Функция  $u$  — произвольная допустимая, поэтому следствие доказано (см. определение 15).

2. Если дополнительно  $A$  — нормальная область, то в силу леммы 4 для всех точек  $y \in f(A)$  имеем  $N(f, A) = \mu(y, f, A) = \sum_{j=1}^k i(x_j, f)$ , где  $\{x_1, \dots, x_k\} = f^{-1}(y) \cap A$ . Неравенство (26) элементарно выводится из неравенства (25).  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ 6.** Неравенство (25) (соответственно (26)) при  $p = q = n$ ,  $\omega \equiv 1$  другим способом доказано в [11, теорема 10.11] (вытекает из модульного неравенства Полецкого [20, теорема 2] или модульного неравенства Вайсяля [11, следствие 9.2]).

**Теорема 6.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Если  $E = (A, C)$  — конденсатор в  $\Omega$ , причем  $A \Subset \Omega$ , а  $C \subset A$  — компакт, то

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega E)^{\frac{1}{r}}, \quad (27)$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$  и  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Возьмем функцию  $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$  такую, что  $u = 1$  в некоторой окрестности  $C$ ,  $\text{supp } u \subset A$  и  $\int_A |\nabla u|^r(x) \theta(x) dx \leq \text{cap}_r^\theta(A, C) + \varepsilon$ , где  $\varepsilon > 0$  — произвольное число. Далее положим  $w = f_* u$ . Заметим, что  $w \geq 1$  на  $f(C)$  и  $\text{supp } w \subset f(\text{supp } u) \subset f(A)$ . Тогда на основании соотношения (24) имеем

$$\begin{aligned} (\text{cap}_s(f(A), f(C)))^{\frac{1}{s}} &\leq \int_{f(A)} |\nabla w|^s dy \leq (K_{q,p}^{\theta,1}(f; f(\Omega)))^{n-1} \int_A |\nabla u|^r(x) \omega(x) dx \\ &\leq (K_{q,p}^{\theta,1}(f; f(\Omega)))^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(A, C) + \varepsilon)^{\frac{1}{r}}. \quad \square \end{aligned}$$

**Следствие 2.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ . Если  $E = (A, C)$  — конденсатор в  $\Omega$ , причем множества  $\bar{A} \subset \Omega$  и  $C \subset A$  компактны, то

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq K_{q,p}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r E)^{\frac{1}{r}}, \quad (28)$$

где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$  и  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В качестве весовой функции  $\omega$  берем  $\omega(x) \equiv 1$  в области  $\Omega$  и применяем теорему 6.  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ 7.** Неравенство (28) при  $p = q = n$  вытекает из модульного неравенства Полецкого [20, теорема 1] (см. также [11, теорема 10.10]).

## § 2. Теоремы типа Лиувилля

Из следующего результата выведем обобщения известной теоремы Лиувилля.

**Теорема 7.** Пусть  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема. Если существуют континуум  $C \subset \mathbb{R}^n$  с непустой внутренностью и последовательность ограниченных открытых множеств  $A_k \supset C$ , исчерпывающих  $\mathbb{R}^n$  (другими словами,  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \mathbb{R}^n$ ), такая, что  $\text{cap}_r^\omega(A_k, C) \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ , то

$$\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n), f(C); \mathbb{R}^n) = 0,$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Для конденсатора  $E_k = (A_k, C)$  верна оценка теоремы 6:

$$(\text{cap}_s(f(E_k)))^{\frac{1}{s}} \leq K_{p,q}^{\theta,1}(f; \mathbb{R}^n)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(E_k))^{\frac{1}{r}}.$$

По условию  $\text{cap}_r^\omega(E_k) \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Далее выводим оценку на емкость:

$$\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n), f(C); \mathbb{R}^n) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \text{cap}_s(f(E_k)) = 0.$$

Отсюда имеем  $\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n), f(C); \mathbb{R}^n) = 0$ , и теорема доказана.  $\square$

**Следствие 3.** Пусть выполнены условия теоремы 7 и  $q, p \in (n - 1, n)$ . Тогда  $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n) \neq \emptyset$ . Заметим, что  $s = \frac{p}{p-(n-1)} > n$ . Пусть  $f(\mathbb{R}^n) \neq \mathbb{R}^n$ . Непустое дополнение  $\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n)$  содержит точку  $y$ , а  $f(C)$  — точку  $x$ , которые находятся на конечном расстоянии.  $s$ -Емкость пары одноточечных множеств  $F_0 = \{x\}$  и  $F_1 = \{y\}$  в пространстве  $L_s^1(\mathbb{R}^n)$  сравнима с положительной величиной  $|x - y|^{n-s}$  (как известно [33], оценка снизу для  $s$ -емкости вытекает из ограниченности оператора вложения  $L_s^1(\mathbb{R}^n)$  в пространство гёльдеровых функций с показателем  $1 - \frac{n}{s}$ ). Таким образом,  $\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n), f(C); \mathbb{R}^n) > 0$ . Последнее противоречит теореме 7.  $\square$

**Следствие 4.** Пусть выполнены условия теоремы 7 и  $n - 1 < q \leq p = n$ . Если  $\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus f(\mathbb{R}^n), f(C); \mathbb{R}^n) > 0$ , то совокупность отображений  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(n, q)$ -искажением пуста.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Действительно, предполагая противное, имеем отображение  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(n, q)$ -искажением. Тогда для этого отображения справедливо заключение теоремы 7, противоречащее условию следствия.  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ 8.** Таким образом, при  $\theta \equiv 1$ ,  $q = n$  получаем сформулированный во введении результат из [11, следствие 2.12].

### § 3. Устранимые множества

Пространство  $w_s^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $s \in (1, n)$ , определяется как пополнение по норме  $\|u\| = \| \nabla u \|_{L_s(\mathbb{R}^n)}$  пространства  $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$  финитных функций. Известно, что это пространство изоморфно пространству риссовых потенциалов [33, 34]:  $u \in w_s^1(\mathbb{R}^n)$  тогда и только тогда, когда  $u = |x|^{1-n} * f$ , где  $f \in L_s(\mathbb{R}^n)$ ,  $s \in (1, n)$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 16.** Пусть  $\omega$  — весовая функция на  $\mathbb{R}^n$ , а  $D \subset \mathbb{R}^n$  — область. Весовой  $s$ -емкостью компакта  $K \subset D$  в пространстве  $W_s^1(D, \omega)$ ,  $s \in [1, \infty)$  ( $w_s^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $s \in (1, n)$ ), называется величина

$$\text{cap}(K; W_s^1(D; \omega)) = \inf \{ \|u\|_{L_s(D; \omega)}^s + \|\nabla u\|_{L_s(D; \omega)}^s \},$$

$$(\text{cap}(K; w_s^1(\mathbb{R}^n)) = \inf \|\nabla u\|_{L_s(\mathbb{R}^n)}^s),$$

где нижняя грань берется по всем функциям  $u \in \text{ACL}(D) \cap C(D)$  таким, что  $u \geq 1$  на  $K$ .

Заметим, что, рассматривая вместо  $u$  срезки  $\max(0, \min(1, u))$ , тестовые функции в определении 16 емкостей можно считать ограниченными снизу нулем, а сверху — единицей.

На произвольные множества определение емкости для весовой функции  $\omega \equiv 1$  распространяется стандартным образом (см., например, [21, 33, 34]).

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17.** Пусть  $x_0 \in \Omega$  — изолированная точка границы области  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . Будем говорить, что  $x_0$  — точка нулевой весовой  $s$ -емкости в  $\Omega$ , если существует шар  $B(x_0, R) \subset \Omega \cup \{x_0\}$  такой, что

$$\lim_{r \rightarrow 0} \text{cap}(B(x_0, r); W_s^1(B(x_0, R); \omega)) = 0. \quad (29)$$

Нетрудно проверить, что условие (29) выполняется тогда и только тогда, когда

$$\text{cap}(\{x_0\}; W_s^1(B(x_0, R); \omega)) = 0.$$

Сформулируем два вспомогательных утверждения.

**Лемма 11** [11]. Пусть  $C$  — континуум в  $\mathbb{R}^n$  и  $\text{diam } C \geq \alpha > 0$ . Тогда если  $E \subset \mathbb{R}^n$  — компакт положительной емкости  $\text{cap}(E; W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$ , то для любого  $\alpha > 0$  и  $d > 0$  существует  $\delta > 0$  такое, что  $\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus E, C) > \delta$  при условии  $\text{diam } C \geq \alpha > 0$  и  $\text{dist}(C, E_0) \leq d$ .

**Лемма 12.** Пусть  $n - 1 < s < n$ ,  $A$  — ограниченное открытое множество в  $\mathbb{R}^n$ , а  $C$  — континуум в  $A$ . Тогда для любого  $\alpha > 0$  существует число  $\varepsilon > 0$  такое, что если  $\text{diam } C \geq \alpha$ , то  $\text{cap}_s(A, C) \geq \varepsilon$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Заметим, что  $\text{cap}_s(A, C; \mathbb{R}^n) \geq \text{cap}(C; w_s^1(\mathbb{R}^n))$ . Поэтому сформулированное свойство емкости вытекает из известного соотношения

между емкостью компакта в  $w_s^1(\mathbb{R}^n)$  и вместимостью Хаусдорфа этого компакта [33, 34]:

$$(\text{diam } C)^{n-s} \leq \mathcal{H}_{n-s}^\infty(C) \leq \gamma \text{cap}(C; w_p^1(\mathbb{R}^n)). \quad \square \quad (30)$$

**Лемма 13.** *Если в открытом множестве  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  компактное подмножество  $F \subset \Omega$  таково, что  $\text{cap}(F; W_s^1(\Omega, \omega)) = 0$ ,  $s \in (1, \infty)$ , то для любого шара  $B(x_0, R) \subset \Omega$ ,  $x_0 \in F$ , и континуума  $C \subset B(x_0, R) \setminus F$  выполняется равенство*

$$\text{cap}_s^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C) = \text{cap}_s^\omega(B(x_0, R), C).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Неравенство

$$\text{cap}_s^\omega(B(x_0, R), C) \leq \text{cap}_s^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C)$$

очевидно. Докажем обратное соотношение.

В соответствии с определением 16 рассмотрим последовательность ограниченных в совокупности тестовых функций  $u_k \in \text{ACL}(\Omega) \cap C(\Omega)$  таких, что  $u_k \geq 1$  на  $C$  и

$$\|u_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s + \|\nabla u_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s \rightarrow 0 \quad (31)$$

при  $k \rightarrow \infty$ . Если  $\psi$  — липшицева ограниченная функция в  $\Omega$ , удовлетворяющая условиям  $\psi = 1$  на  $F$  и  $\psi = 0$  на  $C$ , то последовательность  $v_k = \psi u_k$  обладает следующими свойствами:  $v_k = 1$  на  $F$  и  $v_k = 0$  на  $C$  для всех  $k \in \mathbb{N}$ . Переходя к подпоследовательности, можно подразумевать, что

$$\|v_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s + \|\nabla v_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s \rightarrow 0$$

при  $k \rightarrow \infty$ . Для последнего перехода последовательность  $u_k$  в (31) можно считать такой, что обе последовательности  $u_k(x)\omega(x)$  и  $\nabla u_k(x)\omega(x)$  сходятся в  $\Omega$  к 0 почти всюду. Тогда  $\|v_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s = \|\psi u_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s \rightarrow 0$  и

$$\|\nabla v_k | L_s(\Omega; \omega)\| \leq \|\psi \cdot \nabla u_k | L_s(\Omega; \omega)\| + \|u_k \cdot \nabla \psi | L_s(\Omega; \omega)\| \rightarrow 0$$

при  $k \rightarrow \infty$  по теореме Лебега о мажорируемой сходимости.

Пусть  $w_k$  — ограниченная в совокупности последовательность тестовых функций для емкости  $\text{cap}_s^\omega(B(x_0, R), C)$  такая, что

$$\|w_k \cdot \nabla v_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s = \int_{B(x_0, R)} |\nabla w_k|^s(x)\omega(x) dx \leq \text{cap}_s^\omega(B(x_0, R), C) + \frac{1}{k}.$$

Тогда последовательность функций  $g_k(x) = w_k(x) \cdot (1 - v_k(x))$  является тестовой для емкости  $\text{cap}_s^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C)$ , так как  $g_k(x) = 0$  на  $\partial B(x_0, R) \cup (F \cap B(x_0, R))$  и  $g_k(x) = 1$  на  $C$ . Кроме того,

$$\begin{aligned} \|\nabla g_k | L_s(\Omega; \omega)\| &\leq \|(1 - v_k) \cdot \nabla w_k | L_s(\Omega; \omega)\| + \|w_k \cdot \nabla v_k | L_s(\Omega; \omega)\| \\ &\leq \|\nabla w_k | L_s(\Omega; \omega)\| + \|v_k \cdot \nabla w_k | L_s(\Omega; \omega)\| + \|w_k \cdot \nabla v_k | L_s(\Omega; \omega)\|. \end{aligned}$$

Последние два слагаемых по теореме Лебега о мажорируемой сходимости стремятся к нулю при  $k \rightarrow \infty$ . Отсюда выводим

$$\begin{aligned} \text{cap}_s^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C) &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla g_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|\nabla w_k | L_s(\Omega; \omega)\|^s = \text{cap}_s^\omega(B(x_0, R), C). \quad \square \end{aligned}$$



**Лемма 14.** Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — открытое множество, компактное подмножество  $F \subset \Omega$  имеет нулевую  $\omega$ -весовую  $s$ -емкость:  $\text{cap}(F; W_s^1(\mathbb{R}^n; \omega)) = 0$ ,  $s \in (1, \infty)$ , где  $\omega$  — произвольная локально суммируемая функция. Если функция  $\omega^{\frac{1}{1-s}}$  локально суммируема, то для любого шара  $B(x, r) \subset \Omega$  множество  $B(x, r) \setminus F$  связно.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Так как по условию  $\text{cap}(F; W_s^1(\Omega, \omega)) = 0$ , в силу условий на весовую функцию имеем  $\text{cap}(F; W_1^1(\Omega)) = 0$ . Действительно, для функции  $u$  из определения 16, которую можно брать с компактным носителем, одним и тем же для всех тестовых функций, имеем

$$\int_{\Omega} |u| dx = \int_{\Omega} |u| \omega^{\frac{1}{s}} \omega^{-\frac{1}{s}} dx \leq \left( \int_{\Omega \cap \text{supp } u} |u|^s \omega dx \right)^{\frac{1}{s}} \left( \int_{\Omega \cap \text{supp } u} \omega^{\frac{1}{1-s}} dx \right)^{\frac{s-1}{s}} < \infty.$$

Аналогичное неравенство справедливо и для градиента функции  $u$ . Из выведенных неравенств получаем  $\text{cap}(F; W_1^1(\Omega)) = 0$ .

Учитывая соотношения между емкостью в пространстве  $W_1^1$  и  $(n-1)$ -мерой Хаусдорфа [33], выводим, что

$$\mathcal{H}^{n-1}(\text{Pr}_j F) = 0 \quad \text{для любого } j = 1, \dots, n.$$

Из последнего условия вытекает, что дополнение  $B(x, r) \setminus F$  связно для любого  $r > 0$ .  $\square$

**Теорема 8.** Пусть  $f : \Omega \setminus F \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n-1 < q < n \leq p < \frac{(n-1)^2}{(n-2)}$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  локально суммируема на  $\mathbb{R}^n$ . Пусть изолированная точка  $x_0 \in \partial\Omega$  границы области  $\Omega$  является точкой нулевой  $\omega$ -весовой  $r$ -емкости в  $\Omega$ , где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ .

Если при  $p = n$  выполняется дополнительное условие

$$\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus \{x_0\}); W_n^1(\mathbb{R}^n)) \geq \varepsilon > 0,$$

то отображение  $f$  можно продолжить до непрерывного отображения  $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  при  $n < p$  ( $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$  при  $n = p$ ).

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Случай  $n-1 < q < n < p$ . Рассмотрим произвольную последовательность точек  $\{x_i\}$  в проколотом шаре  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\} \subset \Omega$ , сходящуюся к точке  $x_0$ . Фиксируем  $i$  и соединяем  $x_i$  и  $x_j$ ,  $i \leq j$ , непрерывной кривой  $C_{ij}$ , лежащей в проколотом шаре  $B(x_0, r_i) \setminus \{x_0\}$  для всех номеров  $j \geq i$ . Заметим, что  $r_i \rightarrow 0$  при  $i \rightarrow \infty$ . Рассмотрим открытые множества  $A_k$ , компактно вложенные в  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  и исчерпывающие изнутри  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  при  $k \rightarrow \infty$ , т. е.  $A_k \Subset B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  и  $\bigcup_k A_k = B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$ . Тогда в силу теоремы 6 для фиксированных  $i, j$  и достаточно большого  $k$  получаем

$$(\text{cap}_s(f(A_k), f(C_{ij})))^{\frac{1}{s}} \leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(A_k, C_{ij}))^{\frac{1}{r}},$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ . Переходя к пределу при  $k \rightarrow \infty$ , приходим к соотношениям

$$\begin{aligned} \text{cap}(f(C_{ij}); w_s^1(\mathbb{R}^n))^{\frac{1}{s}} &\leq (\text{cap}_s(f(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}), f(C_{ij})))^{\frac{1}{s}} \\ &\leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}, C_{ij}))^{\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_{ij}))^{\frac{1}{r}} \\
 &\leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), B(x_0, r_i)))^{\frac{1}{r}}. \quad (32)
 \end{aligned}$$

Здесь для одного перехода в приведенных соотношениях применили равенство

$$\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}, C_{ij}) = \text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_{ij})$$

для любых  $j \geq i$ , справедливость которого вытекает из леммы 13 при  $F = \{x_0\}$ ,  $C = C_{ij}$ .

Заметим, что правая часть (32) может быть сделана сколь угодно малой, откуда в силу соотношений (30) выводим  $|f(x_i) - f(x_j)| \rightarrow 0$  при  $i, j \rightarrow \infty$ . В силу критерия Коши существует конечный предел  $\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i)$ . Из критерия Гейне сходимости выводим существование конечного предела  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

СЛУЧАЙ  $n = p$ . Предположим, что  $f$  не имеет предела в точке  $x_0$ . Тогда в некотором выколоте шаре  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\} \subset \Omega$  существуют две последовательности точек  $\{x_i\}$  и  $\{x'_i\}$ , сходящиеся к точке  $x_0$ , но при этом  $d(f(x_i), f(x'_i)) \geq \alpha > 0$  для любого индекса  $i$ .

Из вышесказанного вытекает, что точки  $x_i$  и  $x'_i$  можно соединить кривой  $C_i$ , лежащей в выколоте шаре  $B(x_0, r_i) \setminus \{x_0\}$ , при этом  $r_i \rightarrow 0$  при  $i \rightarrow \infty$ .

Далее исключим из рассмотрения ситуацию, когда

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |f(x_i)| < \infty, \quad \overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} |f(x'_i)| = \infty. \quad (33)$$

Основная ситуация дальнейших рассуждений состоит в том, что первую последовательность можно считать ограниченной, а вторую — неограниченной. Так как  $\text{diam}(f(C_i)) \geq \alpha$ , по лемме 11 имеем  $\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus \{x_0\}), f(C_i)) \geq \varepsilon > 0$  для всех  $i$ . Рассмотрим открытые множества  $A_j$ , компактно вложенные в  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  и исчерпывающие изнутри  $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  при  $j \rightarrow \infty$ , т. е.  $A_j \Subset B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$  и  $\bigcup_j A_j = B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$ . Тогда в силу теоремы 6 для фиксированного  $i$  и достаточно большого  $j$  получаем

$$(\text{cap}_n(f(A_j), f(C_i)))^{\frac{1}{n}} \leq K_{q,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(A_j, C_i))^{\frac{1}{r}}.$$

Переходя к пределу при  $j \rightarrow \infty$ , приходим к соотношениям

$$\begin{aligned}
 \varepsilon &\leq (\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus \{x_0\}), f(C_i)))^{\frac{1}{n}} \leq (\text{cap}_n(\mathbb{R}^n \setminus f(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}), f(C_i)))^{\frac{1}{n}} \\
 &\leq K_{q,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}, C_i))^{\frac{1}{r}} \\
 &= K_{q,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_i))^{\frac{1}{r}}. \quad (34)
 \end{aligned}$$

Для последнего перехода мы применили равенство  $\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus \{x_0\}, C_i) = \text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_i)$  для любого  $i$ , справедливость которого вытекает из леммы 13.

С другой стороны,  $\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), C_i) \leq \text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), B(x_0, r_i)) \rightarrow 0$ . Получаем противоречие с отграниченностью от нуля левой части (34).

Таким образом, либо обе последовательности  $\{f(x_i)\}$  и  $\{f(x'_i)\}$  стремятся к  $\infty$  при  $i \rightarrow \infty$  и тогда  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ , либо обе они ограничены и тогда существует конечный предел  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}^n$ . Последний вывод основан на том, что левая часть (34) стремится к нулю и тогда  $|f(x_i) - f(x'_i)| \rightarrow 0$  при  $i \rightarrow \infty$  в силу леммы 11.  $\square$

**Теорема 9.** Пусть  $f : \Omega \setminus F \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением,  $n < q \leq p < \frac{(n-1)^2}{(n-2)}$ , а весовые функции  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$  и  $\theta^{\frac{p-(n-1)}{q-(n-1)}}$  локально суммируемы на  $\mathbb{R}^n$ . Пусть компактное множество  $F \subset \Omega$  имеет нулевую  $\omega$ -весовую  $r$ -емкость в пространстве  $W_r^1(\mathbb{R}^n; \omega)$ , где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ .

Тогда отображение  $f$  можно продолжить до непрерывного отображения  $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

**Доказательство.** Рассмотрим произвольную последовательность точек  $\{x_i\}$  дополнения  $B(x_0, R) \setminus F \subset \Omega$ , сходящуюся к точке  $x_0$ . Фиксируем  $i$  и соединяем  $x_i$  и  $x_j$ ,  $i \leq j$ , непрерывной кривой  $C_{ij} \subset B(x_0, r_i) \setminus F$  (это можно сделать по лемме 14, в которой по условию весовая функция  $\omega^{\frac{1}{1-s}} = \theta^{\frac{p-(n-1)}{q-(n-1)}}$  локально суммируема, где  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ).

Заметим, что  $r_i \rightarrow 0$  при  $i \rightarrow \infty$ . Рассмотрим открытые множества  $A_k$ , компактно вложенные в  $B(x_0, R) \setminus F$  и исчерпывающие изнутри  $B(x_0, R) \setminus F$  при  $k \rightarrow \infty$ , т. е.  $A_k \Subset B(x_0, R) \setminus F$  и  $\bigcup_k A_k = B(x_0, R) \setminus F$ . Тогда в силу теоремы 6 для фиксированных  $i, j$  и достаточно большого  $k$  получаем

$$(\text{cap}_s(f(A_k), f(C_{ij})))^{\frac{1}{s}} \leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(A_k, C_{ij}))^{\frac{1}{r}},$$

где  $s = \frac{p}{p-(n-1)} \in (n-1, n)$ . Переходя к пределу при  $k \rightarrow \infty$ , приходим к соотношениям

$$\begin{aligned} \text{cap}(f(C_{ij}); w_s^1(\mathbb{R}^n))^{\frac{1}{s}} &\leq (\text{cap}_s(f(B(x_0, R) \setminus F), f(C_{ij})))^{\frac{1}{s}} \\ &\leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C_{ij}))^{\frac{1}{r}} \\ &= K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_{ij}))^{\frac{1}{r}} \\ &\leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), B(x_0, r_i)))^{\frac{1}{r}}. \end{aligned} \quad (35)$$

В третьем переходе в (35) применили равенство

$$\text{cap}_r^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C_{ij}) = \text{cap}_r^\omega(B(x_0, R), C_{ij})$$

для любых  $j \geq i$ , справедливость которого вытекает из леммы 13 при  $C = C_{ij}$ .

Заметим, что правая часть (35) может быть сделана сколь угодно малой, откуда в силу соотношений (30) выводим  $|f(x_i) - f(x_j)| \rightarrow 0$  при  $i, j \rightarrow \infty$ . В силу критерия Коши существует конечный предел  $\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i)$ . Из критерия Гейне сходимости выводим существование конечного предела  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}^n$ .  $\square$

**Теорема 10.** Пусть  $F \subset \Omega$  — компактное множество,  $f : \Omega \setminus F \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, n)$ -искажением,  $n \leq p < \frac{(n-1)^2}{(n-2)}$ , а весовая функция  $\omega(x) = \theta^{1-n}(x)$  локально суммируема на  $\mathbb{R}^n$ . Пусть еще компактное подмножество  $F \subset \Omega$  таково, что  $\text{cap}(F; W_n^1(\Omega, \omega)) = 0$ .

Если дополнительно  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus F); W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$  при  $p = n$ , то отображение  $f$  продолжимо до непрерывного отображения  $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$ .

**Доказательство.** Пусть  $x_0 \in F$ . Предположим, что  $f$  не имеет предела в точке  $x_0$ . Тогда в некотором шаре  $B(x_0, R) \Subset \Omega$  существуют две последовательности точек  $\{x_i\}$  и  $\{x'_i\}$ , сходящиеся к точке  $x_0$ , но при этом  $d(f(x_i), f(x'_i)) \geq \alpha > 0$  для любого индекса  $i$ .

Из леммы 14 вытекает, что точки  $x_i$  и  $x'_i$  можно соединить кривой  $C_i$ , лежащей в множестве  $B(x_0, r_i) \setminus F$ .

Пусть далее одна из последовательностей, например  $\{x'_i\}$ , ограничена. Так как  $\text{diam}(f(C_i)) \geq \alpha$ , по леммам 11 и 12 имеем  $\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus F), f(C_i)) \geq \varepsilon > 0$  для всех  $i$  (из условий на показатели суммируемости имеем  $n-1 < s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ). Рассмотрим открытые множества  $A_j$ , компактно вложенные в  $B(x_0, R) \setminus F$  и исчерпывающие изнутри  $B(x_0, R) \setminus F$  при  $j \rightarrow \infty$ . Тогда в силу теоремы 6 получаем

$$(\text{cap}_s(f(A_j), f(C_i)))^{\frac{1}{s}} \leq K_{p,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_n^\omega(A_j, C_i))^{\frac{1}{n}}.$$

Переходя к пределу при  $j \rightarrow \infty$ , приходим к соотношениям

$$\begin{aligned} \varepsilon &\leq (\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus F), f(C_i)))^{\frac{1}{s}} \leq (\text{cap}_s(\mathbb{R}^n \setminus f(B(x_0, R) \setminus F), f(C_i)))^{\frac{1}{s}} \\ &\leq K_{p,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C_i))^{\frac{1}{n}} \\ &\leq K_{p,n}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), C_i))^{\frac{1}{n}}. \end{aligned} \quad (36)$$

Для последнего перехода мы применили равенство  $\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R) \setminus F, C_i) = \text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), C_i)$  для любого  $i$ , справедливость которого в силу леммы 13 вытекает из соотношения  $\text{cap}(F; W_n^1(\Omega, \omega)) = 0$ .

С другой стороны,  $\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), C_i) \leq \text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), B(x_0, r_i)) \rightarrow 0$ , так как  $\text{cap}_n^\omega(B(x_0, R), \{x_0\}) = 0$ . Получаем противоречие с отделенностью от нуля левой части (36).

Таким образом, либо обе последовательности  $\{f(x_i)\}$  и  $\{f(x'_i)\}$  стремятся к  $\infty$  при  $i \rightarrow \infty$  и тогда  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ , либо обе они ограничены и тогда так же, как и в предыдущих теоремах, существует конечный предел  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}^n$ .  $\square$

Из доказанной теоремы непосредственно выводим

**Следствие 5.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — отображение с  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, n)$ -искажением,  $n \leq p < \frac{(n-1)^2}{(n-2)}$  и  $b$  — изолированная точка  $\partial\Omega$  такая, что

$$\text{cap}^\omega(\{b\}; W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0, \quad \omega(x) = \theta^{1-n}(x).$$

Если  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(\Omega \setminus \{b\}); W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$  при  $p = n$ , то отображение  $f$  продолжимо до непрерывного отображения  $\tilde{f} : \Omega \cup \{b\} \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$ , которое будет отображением с  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением.

Для доказательства следствия надо лишь проверить, что в некоторой окрестности точки  $b$  отображение  $f$  конечнократно. Это проверится так же, как и в доказательстве следствия 2.10 из [11].

**Следствие 6.** Пусть  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  — непостоянное отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(n, n)$ -искажением и  $b$  — изолированная точка  $\partial\Omega$  такая, что  $\text{cap}^\omega(\{b\}; W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$ . Также предположим, что  $f$  не имеет предела в точке  $b$ . Тогда

1)  $\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(U \setminus \{b\}); W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$  для любой окрестности  $U \subset \Omega \cup \{b\}$  точки  $b$ ;

2) существует  $\sigma$ -множество  $E \subset \overline{\mathbb{R}^n}$  нулевой емкости:  $\text{cap}(E; W_n^1(\mathbb{R}^n)) = 0$ , такое, что  $N(z, f, U \setminus \{b\}) = \infty$  для любой точки  $z \in \overline{\mathbb{R}^n} \setminus E$  и любой окрестности  $U \subset \Omega \cup \{b\}$  точки  $b$ .

**Доказательство.** Предположим, что первое утверждение не выполняется, т. е.

$$\text{cap}(\mathbb{R}^n \setminus f(U \setminus \{b\}); W_n^1(\mathbb{R}^n)) > 0$$

для некоторой окрестности  $U$  точки  $b$ . Тогда по следствию 5 отображение  $f$  имеет предел в точке  $b$ , что противоречит условию следствия.

Выберем  $k_0$  такое, что  $\frac{1}{k_0} < \text{dist}(b, \partial U \setminus \{b\})$ . Множество  $\mathbb{R}^n \setminus f(B(b, \frac{1}{k}) \setminus \{b\})$  имеет емкость нуль в пространстве  $W_n^1(\mathbb{R}^n)$  для любого  $k \geq k_0$ . Тогда множество

$$E = \bigcup_{k=k_0}^{\infty} \mathbb{R}^n \setminus f(B(b, 1/k) \setminus \{b\})$$

в силу субаддитивности емкости также имеет емкость нуль в пространстве  $W_n^1(\mathbb{R}^n)$ . Кроме того, прообраз любой точки  $z \in \mathbb{R}^n \setminus E$  принадлежит шарам  $B(b, \frac{1}{k})$  для  $k \geq k_0$ . Поэтому существует последовательность различных точек  $x_i \in B(b, \frac{1}{k_i})$  таких, что  $f(x_i) = z$  для любого  $i \in \mathbb{N}$ .  $\square$

#### § 4. Классификация римановых многообразий

Следуя [35], введем определение классов отображений  $W_{p,\text{loc}}^1(\mathbb{M}, \mathbb{N})$  для римановых многообразий  $\mathbb{M}$  и  $\mathbb{N}$ .

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 18.** Пусть  $f : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{N}$  — отображение между римановыми пространствами  $\mathbb{M}$  и  $\mathbb{N}$ . Тогда  $f$  принадлежит классу  $W_{p,\text{loc}}^1(\mathbb{M}, \mathbb{N})$ , если функция  $[f]_y : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{R}$ , определенная по правилу  $[f]_y(x) = \text{dist}(f(x), y)$ , принадлежит  $L_{p,\text{loc}}(\mathbb{M}, \mathbb{R})$  для всех  $y \in \mathbb{N}$ , и существует функция  $g \in L_{p,\text{loc}}(\mathbb{M}, \mathbb{R})$  такая, что  $|\nabla[f]_y|(x) \leq g(x)$  почти всюду на  $\mathbb{M}$  для всех  $y \in \mathbb{N}$ .

Для отображения класса  $W_{p,\text{loc}}^1(\mathbb{M}, \mathbb{N})$  определен почти всюду формальный дифференциал  $Df(x) : T_x \mathbb{M} \rightarrow T_{f(x)} \mathbb{N}$ .

Далее предполагаем, что многообразия ориентированы и имеют одинаковую размерность  $n$ . Условие ориентированности многообразий позволяет определить класс отображений с ограниченным весовым  $(p, q)$ -искажением аналогично определению 3, при этом интегрирование будет производиться по соответствующей мере Хаусдорфа на многообразиях, порожденных соответствующими римановыми метриками.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 19.** Отображение  $f : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{N}$  называется *отображением с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением*,  $n - 1 < q \leq p < \infty$ , если

- 1)  $f$  непрерывно, открыто и дискретно;
- 2)  $f$  принадлежит классу Соболева  $W_{q,\text{loc}}^1(\mathbb{M})$ ;
- 3)  $J(x, f) \geq 0$  для почти всех  $x \in \mathbb{M}$ ;
- 4)  $f$  имеет конечное искажение;
- 5) функция локального  $(\theta, 1)$ -веса  $q$ -искажения:

$$\Omega \ni x \mapsto K_q^{\theta, \sigma}(x, f) = \begin{cases} \frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df|(x)}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}}, & \text{если } J(x, f) \neq 0, \\ 0 & \text{иначе,} \end{cases} \quad (37)$$

принадлежит классу  $L_{\varkappa}(\mathbb{M})$ , где  $\varkappa$  находится из условия  $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$  ( $\varkappa = \infty$  при  $q = p$ ). (При  $p = q$ ,  $\omega \equiv 1$  и некоторых дополнительных предположениях введенный класс отображений исследовался в [13].)

Введем обозначение  $K_{q,p}^{\theta, \sigma}(f; \mathbb{M}) = \|K_q^{\theta, \sigma}(y, f) \mid L_{\varkappa}(\mathbb{M})\|$ .

Аналогично предыдущим рассмотрениям для произвольной гладкой функции  $u : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u \in C_0^1(\mathbb{M})$ , определяем перенесенную функцию  $w : f(\mathbb{M}) \rightarrow \mathbb{R}$  (см. определение 17). Аналогично рассуждениям доказательства леммы 2 выводим, что  $w \in \text{ACL}(f(\mathbb{M}))$ : так как свойство  $\text{ACL}(f(\mathbb{M}))$  локальное, для любой

точки  $y \in f(M)$ , выбирая достаточно малую ее окрестность, покрываемую одной картой, сводим задачу к случаю евклидовых пространств. При этом также можно вывести следующую оценку:

$$\left( \int_{B_j} |\nabla v|^s d\nu(y) \right)^{\frac{1}{s}} \leq \|K_q^{\theta,1}(x; f) | L_{\varkappa}(f^{-1}(B_j))\|^{(n-1)} \left( \int_{f^{-1}(B_j)} |\nabla u|^r \omega(x) d\mu(x) \right)^{\frac{1}{r}},$$

где  $d\mu(x)$  и  $d\nu(x)$  — меры Хаусдорфа соответственно на  $\mathbb{M}$  и  $\mathbb{N}$ ,  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ . Далее с помощью метода, примененного в доказательстве теоремы 6, получаем емкостную оценку

$$(\text{cap}_s f(E))^{\frac{1}{s}} \leq K_{q,p}^{\omega,1}(f; \mathbb{M})^{n-1} (\text{cap}_r^\omega E)^{\frac{1}{r}},$$

где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$  и  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $E = (A, C)$  — конденсатор.

Полученные результаты можно применить к классификации многообразий.

Как известно, римановы пространства можно классифицировать в зависимости от поведения  $s$ -емкости их компактов.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 20.** Многообразие  $\mathbb{M}$  называется  $r$ -параболическим ( $\theta$ - $r$ -параболическим), если  $\text{cap}_p(D, \mathbb{M}) = 0$  ( $\text{cap}_r^\omega(D, \mathbb{M}) = 0$ ) для любого компакта  $D \subset \mathbb{M}$  с непустой внутренностью. В противном случае  $\mathbb{M}$   $r$ -гиперболично ( $\omega$ - $r$ -гиперболично).

Докажем теорему о поведении свойства параболичности при действии отображений с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением.

**Теорема 11.** Пусть  $f : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{N}$  — отображение с ограниченным  $(\theta, 1)$ -весовым  $(p, q)$ -искажением. Тогда если  $\mathbb{M}$   $\omega$ - $r$ -параболично,  $\mathbb{N}$   $s$ -параболично, где  $r = \frac{q}{q-(n-1)}$ ,  $s = \frac{p}{p-(n-1)}$ ,  $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $D \subset \mathbb{M}$  — компактное множество с непустой внутренностью. Так как  $f$  непрерывно и открыто,  $f(D) \subset \mathbb{N}$  также компактное множество с непустой внутренностью. Тогда

$$\text{cap}_s(f(D), \mathbb{N}) \leq \text{cap}_s(f(D), f(\mathbb{M})) \leq K_{q,p}^{\theta,1}(f; \mathbb{M})^{n-1} \text{cap}_r^\omega(D, \mathbb{M}).$$

Поэтому если  $\mathbb{M}$   $\omega$ - $r$ -параболично, то  $\mathbb{N}$  будет  $s$ -параболическим.  $\square$

**ЗАМЕЧАНИЕ 9.** В теореме 11 обобщаем аналогичный результат из [13, теорема А], доказанный при условии, что отображение  $f : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{N}$  обладает  $\mathcal{N}$ -свойством Лузина,  $q = p$ , а  $\omega \equiv 1$ .

### ЛИТЕРАТУРА

1. Соболев С. Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука, 1988.
2. Решетняк Ю. Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. Новосибирск: Наука, 1982.
3. Федерер Г. Геометрическая теория меры. М.: Наука, 1987.
4. Nałlasz P. Change of variables formula under minimal assumptions // Colloq. Math. 1993. V. 64, N 1. P. 93–101.

5. Vodop'yanov S. K.  $\mathcal{P}$ -differentiability on Carnot groups in different topologies and related topics // Тр. по анализу и геометрии. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2000. С. 603–670.
6. Водопьянов С. К. О дифференцируемости отображений классов Соболева на группе Карно // Мат. сб. 2003. Т. 194, № 6. С. 67–86.
7. Whitney H. On totally differentiable and smooth functions // Pacif. J. Math. 1951. V. 1, N 1. P. 143–159.
8. Ukhlov A., Vodop'yanov S. K. Mappings associated with weighted Sobolev spaces // Complex Analysis and Dynamical Systems. III: Contemporary Mathematics AMS. 2008. V. 455. P. 363–382.
9. Водопьянов С. К., Ухлов А. Д. Операторы суперпозиции в пространствах Соболева // Изв. вузов. Математика. 2002. № 10. С. 11–33.
10. Kilpeläinen T. Weighted Sobolev spaces and capacity // Ann. Acad. Sci. Fenn., AI. Math. 1994. V. 19. P. 95–113.
11. Rickman S. Quasiregular mappings. Berlin: Springer-Verl., 1993.
12. Водопьянов С. К., Маркина И. Г. Локальные оценки изменения отображений с ограниченным  $s$ -искажением на группах Карно // Алгебра, геометрия, анализ и математическая физика / Тр. 12-й Сибирской математической школы: Новосибирск, 18–23 июля 1998 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та математики СО РАН, 1999. С. 28–53.
13. Troyanov M., Vodop'yanov S. K. Liouville type theorems for mappings with bounded (co)-distortion // Ann. Inst. Fourier, Grenoble. 2002. V. 52, N 6. P. 1753–1784.
14. Vodop'yanov S. K., Ukhlov A. Mappings with bounded  $(P, Q)$ -distortion on Carnot groups // Bull. Sci. Math. 2010. V. 134, N 6. P. 605–634.
15. Водопьянов С. К. О регулярности отображений, обратных к соболевским // Докл. АН. 2008. Т. 423, № 5. С. 592–596.
16. Водопьянов С. К. Отображения с конечным коискажением и классы функций Соболева // Докл. АН. 2011. Т. 440, № 3. С. 301–305.
17. Водопьянов С. К. О регулярности отображений, обратных к соболевским // Мат. сб. 2012. Т. 203, № 10. С. 3–32.
18. Водопьянов С. К. О регулярности функции Полецкого при слабых аналитических предположениях исходного отображения // Докл. АН. 2014. Т. 455, № 2. С. 130–134.
19. MENCHOFF D. E. Sur une generalization d'un theoreme de M. H. Bohr // Мат. сб. 1937. Т. 2, № 2. С. 339–356.
20. Полецкий Е. А. Метод модулей для негомеоморфных квазиконформных отображений // Мат. сб. 1970. Т. 83, № 2. С. 261–272.
21. Heinonen J., Kilpeläinen T., Martio O. Nonlinear potential theory of degenerate elliptic equations. Oxford: Clarendon Press, 1993.
22. Кругликов В. И. Емкости конденсаторов и пространственные отображения, квазиконформные в среднем // Мат. сб. 1986. Т. 130, № 2. С. 185–206.
23. Ухлов А. Д. Отображения, порождающие вложения пространств Соболева // Сиб. мат. журн. 1993. Т. 34, № 1. С. 185–192.
24. Водопьянов С. К., Ухлов А. Д. Классы Соболева и  $(P, Q)$ -квазиконформные отображения // Сиб. мат. журн. 1998. Т. 39, № 4. С. 776–795.
25. Севостьянов Е. А. Исследование пространственных отображений геометрическим методом. Киев: Наук. думка, 2014.
26. Пономарев С. П. Об  $N$ -свойстве гомеоморфизмов класса  $W_p^1$  // Сиб. мат. журн. 1987. Т. 28, № 2. С. 140–148.
27. Водопьянов С. К. Топологические и геометрические свойства отображений классов Соболева с суммируемым якобианом // Сиб. мат. журн. 2000. Т. 41, № 1. С. 23–48.
28. Radó N., Reichelderfer P. V. Continuous transformation in analysis. Berlin: Springer-Verl., 1955.
29. Vodop'yanov S. K., Ukhlov A. D. Set functions and their applications in the theory of Lebesgue and Sobolev spaces. I // Sib. Adv. Math. 2004. V. 14, N 4. P. 78–125.
30. Решетняк Ю. Г. Некоторые геометрические свойства функций и отображений с первыми обобщенными производными // Сиб. мат. журн. 1966. Т. 7, № 4. С. 886–919.
31. Martio O., Rickman S., Väisälä J. Definitions for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. AI. 1969. V. 448. P. 1–40.
32. Martio O. A capacity inequality for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. AI. 1970. V. 474. P. 1–18.

- 
- 33.** Мазья В. Г. Пространства С. Л. Соболева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1985.
- 34.** Мазья В. Г., Хавин В. П. Нелинейная теория потенциала // Успехи мат. наук. 1972. Т. 27, № 6. С. 67–138.
- 35.** Решетняк Ю. Г. Соболевские классы функций со значениями в метрическом пространстве // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 3. С. 567–583.

*Статья поступила 6 октября 2014*

Байкин Алексей Николаевич    Водопьянов Сергей Константинович  
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,  
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090;  
Новосибирский гос. университет,  
ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090  
vodopis@math.nsc.ru,    alexey.baykin@gmail.com