

## Serie 10

1. Für

$$\mathbf{a}_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} := \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und  $A := (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$  gelten welche der folgenden Aussagen?

- a)  $\det(A) = 0$ .
  - richtig
  - falsch
- b) Der Rang von  $A$  ist 3.
  - richtig
  - falsch
- c) Das Gleichungssystem  $A\mathbf{x} = 0$  hat nichttriviale Lösungen.
  - richtig
  - falsch
- d) Das Gleichungssystem  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  hat genau eine Lösung.
  - richtig
  - falsch
- e) Die Lösbarkeit von  $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$  hängt von der Wahl von  $\mathbf{v}$  ab.
  - richtig
  - falsch
- f) Die Matrix  $A$  hat eine Inverse.
  - richtig
  - falsch

## 2. Prüfungsaufgabe, Frühling '07

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 7 & -1 & c \\ 5 & 1 & d & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Berechnen Sie  $\det A$ .
- Für welche Werte der Parameter  $a, b, c, d$  ist die Matrix  $A$  singulär?

## 3. Cramersche Regel, 1750

Sei  $A$  eine reguläre  $n \times n$ -Matrix,  $b \in \mathbb{R}^n$  ein Spaltenvektor. Ersetzt man die  $k$ -te Spalte von  $A$  durch  $b$ , erhält man eine Matrix  $A_k$ . Beweisen Sie, dass die Lösung von  $Ax = b$  durch

$$x_k = \frac{\det A_k}{\det A}$$


gegeben ist.

*Bemerkung:* Bezüglich des Rechenaufwandes ist die Cramersche Regel eine im Vergleich zum Gaussverfahren ineffiziente Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme.

- Ein Graph  $G$  mit den Knoten  $1, 2, \dots, n$  wird vollständig durch seine Adjazenzmatrix  $A^G$  beschrieben:

$$(A^G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } i \text{ mit } j \text{ durch eine Kante verbunden ist;} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beispielsweise gehört zum Graph  $G$  :



die Adjazenzmatrix

$$A^G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sei  $d_i$  der Grad des Knotens  $i$ , d.h. die Anzahl seiner Nachbarn, und

$$D^G = \text{diag}(d_1 \ d_2 \ \dots \ d_n).$$

Dann heisst  $L^G := D^G - A^G$  Laplace-Operator auf  $G$ .

- a) Zeigen Sie für beliebige  $G$ , dass  $\det L^G = 0$  gilt.
- b) Kirchhoffs Matrix-Tree-Theorem besagt, dass jeder Kofaktor von  $L^G$  die Anzahl der  $G$  aufspannenden Teilbäume ist. Man berechne diese Anzahl für das obige Beispiel.